

FOR THE PEOPLE
FOR EDVCATION
FOR SCIENCE

LIBRARY
OF
THE AMERICAN MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Bound
A.M.

ТРУДЫ
РУССКАГО
Энтомологическаго Общества

ВЪ
ПЕТРОГРАДѢ

59.57:06(47)

Н О Р А Е
SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE
ROSSICAE

VARIIS
SERMONIBUS IN ROSSIA USITATIS EDITAE.

Подъ редакціей В. В. Редикорцева.

Т. XLII. № 1.

G. Sumakov (Juriev).

Les espèces paléarctiques du genre *Mylabris* Fabr.

(Coleoptera, Meloïdae).

(Avec 9 figures dans le texte).

Г. Сумаковъ (Юрьевъ).

Палеарктическіе виды рода *Mylabris* Fabr.

(Coleoptera, Meloïdae).

(Съ 9 фигурами въ текстѣ).

ПЕТРОГРАДЪ.

1915.

Въ Обществѣ находятся въ настоящее время для продажи слѣдующія изданія:

- Труды Русскаго Энтомологическаго Общества*: Т. II, съ 1 портр. и 17 табл. ц. 2 р. 50 к. Т. III, ц. 2 р. Т. IV, съ 2 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. V, съ карт. ц. 2 р. Т. VI, съ картою и 1 табл., ц. 3 р. 50 к. Т. VII, съ 2 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. VIII, съ 8 табл., ц. 4 р. 60 к. Т. X, съ 3 табл., ц. 4 р. Т. XI, съ 10 табл., ц. 4 р. Т. XIII, съ 2 табл. ц. 3 р.
- Horae Societatis Entomologicae Rossicae*: Т. I, съ 4 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. II, съ 1 портр. и 17 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. III, съ 6 табл., ц. 3 р. 50 к. Т. IV, съ 2 табл., ц. 2 р. 25 к. Т. V, съ 2 табл., ц. 3 р. Т. VI, съ 11 табл., ц. 7 р. Т. VII, съ 3 табл., ц. 5 р. Т. VIII, съ 7 табл., ц. 6 р. Т. IX, съ 9 табл., ц. 7 р. Т. X, съ 2 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. XI, съ 5 табл., ц. 6 р. Т. XII, съ 8 табл., ц. 6 р. 50 к. Т. XIII, съ 6 табл., ц. 9 р. Т. XIV, съ 4 табл., ц. 8 р. Т. XV, съ 20 табл., ц. 11 р. Т. XVI, съ 15 табл., ц. 8 р. Т. XVII, съ 9 табл., ц. 9 р. Т. XVIII, съ 2 табл., ц. 6 р. Т. XIX, съ 12 табл., ц. 7 р. Т. XX, съ 21 табл., ц. 8 р. Т. XXI, съ 9 табл., ц. 8 р. Т. XXII, съ 15 табл., ц. 6 р. 50 к. Т. XXIII, съ 21 табл., ц. 8 р. Т. XXIV, съ 1 картою и 3 табл., ц. 7 р. Т. XXV, съ 3 табл., ц. 5 р. 50 к. Т. XXVI, съ 3 табл., ц. 6 р. Т. XXVII, съ портретомъ и 7 табл., ц. 9 р. Т. XXVIII, съ 5 табл., ц. 6 р. 50 к. Т. XXIX, съ 3 табл., ц. 6 р. Т. XXX, съ 2 портретами и 10 табл., ц. 10 р. Т. XXXI, съ 2 портр. и 13 табл., ц. 10 р. Т. XXXII, ц. 5 р. 50 к. Т. XXXIII, ц. 6 р. 50 к. Т. XXXIV, съ 1 табл., ц. 6 р. Т. XXXV, съ 3 табл., ц. 6 р. Т. XXXVI, съ 4 табл., ц. 5 р. 50 к. Т. XXXVII, съ 3 табл., ц. 5 р. 50 к. Т. XXXIX, съ 2 портр. и 26 табл., ц. 12 р. Т. XL, съ 3 табл., ц. 4 р. 50 к. Т. XLI, ц. 3 р. 45 к.
- Русское Энтомологическое Обозрѣніе (Revue Russe d'Entomologie)*: Т. I—V, (1901—1906) по 3 р. за томъ; Т. VII—XV (1907—1915) по 4 р.
- Записки Русскаго Энтомологическаго Общества*: I. 1861. Ц. 20 к.
- Приложеніе къ X тому „Horae“: B. N. Dybowski, Beiträge zur näheren Kenntnis der in dem Baikal-See vorkommenden Gammariden. 1874. 4^o. Съ 3 раскраш. и 11 черн. табл. Ц. 7 р. 50 к.
- Genres et espèces d'insectes publiés dans différents ouvrages par V. Motschoulsky. Ц. 75 к.
- Указатель сообщеній, сдѣланныхъ на общихъ собраніяхъ Русскаго Энтомологическаго Общества за 35 лѣтъ его существованія (1859—1894 гг.). Составилъ В. Мазаракій. Ц. 40 к.
- Естественноисторическія изслѣдованія С.-Петербургской губерніи, производимыя членами Русскаго Энтомологическаго Общества въ С.-Петербургѣ. Т. I. 1864. Съ 20 табл. Ц. 2 р. 50 к.
- Verzeichnis der im St. Petersburger Gouvernement gefundenen Schmetterlinge (Catalogus Lepidopterorum gubernii Petropolitani). Zusammengestellt von W. N. Kawrigin. 1894. Ц. 40 к.
- Tables générales des publications de la Société Entomologique de Russie ainsi que des articles, des synopsis et des formes nouvelles y contenues. 1859—1908. Dressées par B. Oshanin. 1910. 1 р. 50 к.
- Кодексы международныхъ правилъ систематической номенклатуры. Перевелъ В. О. Ошанинъ. 1911. Ц. 40 к. (для членовъ Общ. 30 к.).
- Отдѣльные томы „Трудовъ“ и „Horae“, Dybowski, Мазаракій, „Естеств. истор. изсл.“, Oshanin „Tabl. génér.“ члены Общества получаютъ за половину объявленной цѣны. Томы II и XI „Трудовъ“ и XXXVII „Horae“ выдаются за полную цѣну и лишь при покупкѣ полной серіи журнала.

G. Sumakov (Juriev).

Les espèces paléarctiques du genre *Mylabris* Fabr.

(Coleoptera, Meloïdae).

(Avec 9 figures dans le texte).

Г. Сумаковъ (Юрьевъ).

Палеарктическіе виды рода *Mylabris* Fabr.

(Coleoptera, Meloïdae).

(Съ 9 фигурами въ текстѣ).

N'ayant pas la possibilité de finir mon travail: „Les Mylabrides de la Russie et des pays limitrophes“, je me suis décidé de publier préalablement un tableau dichotomique de ces espèces avec l'indication courte des limites de leur distribution géographique. Dans ce tableau dichotomique assigné sont entrées toutes les espèces palaearctiques, excepté celles qui ne me sont pas connues en nature et dont les descriptions sont insatisfaisantes. J'allègue les dernières dans la remarque. Mon tableau contient aussi les synonymes constitués par moi.

Le travail proposé est accompli par moi d'après le matériel qui m'avait été offert par le Musée Zoologique de l'Académie des Sciences de Petrograd, par le Musée du Caucase, par A. P. Semenov-Tjanshanskij, par le professeur Dr. L. v. Heyden et par A. G. Lebedev. Je profite de l'occasion pour exprimer ma plus profonde reconnaissance à ces institutions et à mes honorés collègues-entomologistes pour leur aimable secours. Je profite du cas bien agréable pour moi pour exprimer ma reconnaissance sincère à très honoré G. G. Jacobson pour ses conseils et ses désignations très précieux pour moi.

Tableau dichotomique des groupes, des sous-genres et des espèces.

Genre *Mylabris* Fabr.

Entom. System., Tab. I, Pars II, 1792, p. 87, n. 63.

I (II). Antennes de 11 ou 10 articles.

1-er groupe.

II (I). Antennes de 9 ou 8 articles; dernier article ovoïde allongé et renflé.

2-e groupe.

1-er groupe.

- 1 (6). Antennes de 11 articles, articles toujours bien séparés.
- 2 (3). Antennes sont plus épaisses dans leur première moitié.

Sous-genre **Lydoceras** Mars.

- 3 (2). Antennes plus étroites dans leur première moitié, rarement presque linéaires.
- 4 (5). Antennes dentées en scie à partir du 5-e article jusqu'au 8-e ou antennes ne sont pas dentées.

Sous-genre **Mylabris** in sp.

- 5 (4). Antennes dentés en scie à partir du 3-e ou 4-e article et grossissants peu à peu jusqu'au 10-e.

Sous-genre **Ceroctis** Mars.

- 6 (1). Antennes de 10 articles.

Sous-genre **Decatoma** Mars.

2-e groupe.


- 1 (2). Antennes de 9 articles.

Sous-genre **Coryna** Mars.

- 2 (1). Antennes de 8 articles.

Sous-genre **Actenodia** Cast.

Les dessins des épines des tib. post., des derniers articles des antennes et des élytres.



- fig. 1. L'épine des tib. post. en forme de baton.
 " 2. " " " " " aiguë.
 " 3. " " " " " en forme de cuiller.
 " 4. Les 10^e et 11^e articles ne sont pas serrés.
 " 5. " " " " " sont serrés.
 " 6. Le élytres de *M. diversipilis*, sp. n.
 " 7. " " de *M. quadripunctata angustata*, subsp. n.
 " 8. " " de *M. polymorpha* m. *karateginensis* ab. α .
 " 9. " " " " " " ab. β .

Groupe I.

Sous-genre **Lydoceras** Mars.

Corps noir, opaque, peu garni de petits poils noirs dressés. Pronotum noir, orné d'une large tache d'un rouge-carmin, fortement étranglé et très rétréci en devant, avec une fine carène médiane en devant. Élytres

noires, densément chagrinées et finement granuleuses, avec les nervures bien marquées, ornées d'une large fascie médiane, entière, d'un jaune-pâle, finement pointillées. Long. 30—40 mm. — Égypte, Arabie, India (?).

fasciata F.

Syst. Ent., 1775, 261, 1.

Sous-genre **Mylabris** in sp.

1 (304). Épine des tibias postérieures aiguë ou en forme de baton (ff. 1 et 2).

2 (49). Corps d'un bleu, vert, noir-bleuâtre ou verdâtre métallique.

3 (4). Élytres sans poils.—Corps assez court, bleu-verdâtre, luisant. Antennes assez longues, à peine plus épaisses au bout. Pronotum plus large que long, densément ponctué, marqué de 5 tubercules lisses sur la ligne transversale au milieu, étranglé et peu rétréci en avant. Élytres d'un jaune-pâle, base, côtés et bouts d'un rouge testacé. Long. 11—13 mm. — Asie Mineure.

munda Escher.

Stett. Ent. Z., 1897, p. 38.

4 (3). Élytres plus ou moins pubescentes.

5 (6). Dernier article des antennes plus fin que les précédents. — Corps d'un noir-bleuâtre. Antennes d'une longueur médiocre. 5 premiers articles étroits, 6 autres plus larges. Pronotum presque quadrangulaire, assez fort rétréci, densément et assez fortement ponctué, avec un sillon court au milieu. Élytres rouges, avec de courts poils noirs, ornées de trois taches noires: deux petites au premier tiers, une grosse un peu au-delà du milieu et une étroite bordure au bord apical. Long. 15 mm. — Syrie.

tenuepicta Fairm.

Ann. Soc. Ent. Belge, XXXVI, 1892, p. 154.

6 (5). Dernier article égal ou plus large que les précédents.

7 (14). Élytres inégalement pubescentes: sur les parties d'un vert, bleu ou noir-bleu les poils plus denses.

8 (9). Corps et élytres très densément couverts de duvet gris-jaunâtre, très fin et très court, à peine visible, comme parsemé de poudre. — Corps obscur-violet. Élytres jaunes, parties des élytres plus obscures couvertes de duvet plus dense que les parties jaunes. Long. 7—9 mm. — Perse bor.

gemmula Dohrn.

Stett. Ent. Z., XXXIV, 1873, p. 73.

9 (8). Élytres couvertes de poils plus ou moins longs.

10 (11). Élytres couvertes de poils gris, assez fins, couchés et de courts poils noirs, dressés. — Bleu, hérissé de poils noirs fins. Élytres rouges, finement pubescentes, ornées de taches rondes, d'un bleu de Prusse, placées: 3, 3, 3, celles-ci garnies de courts poils très, serrés. Long. 9—15 mm. — Perse mér., Égypte, Algérie.

hemprichi Klug.

Sym. Phys., IV, 1845, p. 32, 9.

- 11(10). Élytres vêtues d'une pubescence blanche ou grise-jaunâtre, couchée.
- 12(13). Taches bleues ou vertes métalliques assez densément couvertes de poils gris-jaunâtres. — Pronotum subarrondi, bombé, vaguement ponctué, sans impressions, avec de callosité devant le milieu. Élytres d'un rouge vif, ornées de taches vertes ou bleuâtres: deux taches antérieures, l'une subhumérale, ovale, l'autre suturale, commune, subcordiforme, prolongée le long de la suture jusqu'à l'écusson; fascie au-dessous du milieu sinuée, fortement dilatée et lobée en dehors, parfois interrompue; fascie antéapicale plus étroite, dentée, accolée à la suture. Le dessin des taches sur les élytres est très variable: 1) fascie antéapicale remplacée par deux taches ovales, posées obliquement (ab. α); 2) fascie antérieure manque, deux taches postérieures comme dans la ab. α (ab. β); 3) deux taches antérieures ovale, séparées, fascie médiane réunie avec fascie antéapicale par une tache assez étroite (ab. γ); 4) fascie antérieure réunie avec fascie médiane par une tache oblongue et fascie médiane réunie avec la tache antéapicale externe, tache interne manque (ab. δ); 5) fascie antérieure réunie avec fascie médiane par deux taches longitudinales: l'une au milieu, l'autre sur la suture, deux taches antéapicales comme dans la ab. α , parfois fascie médiane de même réunie avec tache antéapicale externe (ab. ϵ); 6) fascies antérieure et médiane conflués (sauf la petite tache jaunâtre sur le bord latéral) en une large tache qui occupe tout le milieu de l'élytre et se réunit avec fascie antéapicale par une tache étroite (ab. ζ); 7) tache antérieure externe réunie avec la fascie médiane (ab. η = var. *persica* Pic)¹⁾; 8) tache antérieure externe manque et fascie antéapical réduit à une tache isolée externe, tandis que la fascie médiane est très élargie (ab. δ = var. *boettcheri* Pic)²⁾. Long. 9—14 mm. — Perse.

doriae Mars.

L'Abeille, VII, 1869-70, Mon., p. 165.

- 13(12). Bandes longitudinales noires-bleues couvertes de poils blancs très épais, couchés, dissimulant la couleur foncière. — Corps bleu-noirâtre vêtu d'un épais poil blanc, couché. Pronotum arrondi sur les côtés, bombé à sa partie postérieure, faiblement fovéolé au milieu. Élytres jaunes-pâles avec trois bandes longitudinales, raccourcies au bout. Long. 9 mm. — Sibérie, Turkestan, Turcménie.

pallasi Gebl.

Mém. Mosc., VII, 1829, p. 27, 18.

¹⁾ L'Ech., 25, 1909. Je ne vois pas la nécessité du changement de *M. signata* Mars en *M. persica* Beaur. (n. n.), comme l'avait fait M. Beauregard et var. *persica* Pic en var. *persicola*, comme l'avait fait M. Pic, car il n'existe point du tout *M. signata* Fisch., mais *M. quadrisignata* Fisch. Ce malentendu eut lieu grâce à une petite inattention de M. Beauregard.

²⁾ Ib.

- 14 (7). Élytres couvertes également de poils.
- 15 (16). Élytres assez densément couvertes de poils blancs, couchés. — Corps noir-bleuâtre, dissimulé par une longue pubescence blanche, couchée. Élytres jaunes testacées avec de taches noires-bleuâtres: une bordure suturale, de même couleur, qui s'étend de la base presque jusqu'à l'angle apical, formant une bande commune, dilatée au milieu; deux taches antérieures, l'une grosse, ovale, longue, derrière l'épaule, l'autre contiguë à la suture; une fascie médiane en forme de S, posée obliquement; enfin, deux taches ovales au-dessus du milieu, aussi posées obliquement. Long. 10 mm.—Caucase, Sibérie centr., Songarie.

marginata Fisch.-W.

Bull. Mosc., 1844, Spic., p. 133, 154.

- 16 (15). Élytres couvertes de poils assez courts, très rares, couchés ou assez densément couvertes de pubescence noire.
- 17 (20). Parties bleues ou vertes-bronzées sur les élytres couvertes de rides plus épaisses et plus tranchantes que les parties jaunes-testacées pâles ou jaunes-rouges.
- 18 (19). Tête, pronotum et dessous du corps garnis de poils gris et noirs dressés. 6 premiers articles des antennes noirs et brillants. — Pronotum dilaté gibbeux sur les côtés, rétréci et étranglé en devant, parsemé de points écartés. Élytres jaunes-testacées pâles, ornées de dessin bleu ou vert-bronzé: deux taches antérieures, externe derrière l'épaule et interne contiguë à la suture, une fascie postmédiane, dentée, n'atteint pas le bord latéral, une bordure suturale, qui s'étend de la base presque jusqu'à l'angle apical, et une tache transversale tout près du bout (forme typique); tache antérieures manquent, fascie postmédiane, s'allongant en haut, forme une branche pointe et tache antéapicale remplacée par une fascie apicale assez large (ab. α); comme dans l'aberration précédente, mais seulement une tache antérieure externe manque et fascie postmédiane ne s'allonge pas en haut en forme branche pointe (ab. β); comme dans l'aberration précédente, seulement deux taches antérieures, en forme une fascie, existantes (ab. γ); bordure basale, fascies antérieure, postmédiane et apicale, se réunissant entre elles forment: deux taches basales et deux taches antémédiane isolées et une fascie antéapicale, n'atteint pas la suture, d'un jaune-pâle ou d'un jaune-rosâtre (ab. δ); comme dans l'aberration précédente, seulement les fascies antérieure et postmédiane vertes-bronzées confondues en une large tache (ab. ϵ). Long. 8—10 mm. — Sibérie, Steppes des Kirghises.

pulchella Fald.

Bull. Mośc., V, 1833, Lék., p. 223, 11, Pl. 10, f. 7.

- 19 (18). Tête, pronotum et dessous du corps assez finement ciliés de poils grisâtres. Antennes ayant 8 premiers articles noirs brillants. — La couleur et le dessin des élytres comme dans l'espèce précédente, ab. ♂. Long. 9—11,5 mm. — Songarie.

saïramensis Ball.³⁾

Bull. Mosc., 1878, p. 342.

- 20 (17). Élytres, sauf base et l'extrémité, également ridées-pointillées ou densément ruguleuses ou coriacées et à peine visiblement pointillées.
- 21 (48). Pronotum dilaté-gibbeux sur les côtés, étranglé et rétréci en avant.
- 22 (47). Élytres jaunes-testacées pâles ou rouges-brunâtres, ornées de dessin bleu, noir-bleu ou noir-verdâtre métallique ou élytres bleues avec trois ou deux rangées de taches d'un jaune-testacé.
- 23 (46). Antennes longues, filiformes, à peine épaisses au bout chez ♂, plus courtes et plus épaisses chez ♀. Long. 10—15 mm.
- 24 (39). Élytres couvertes de poils blancs ou noirs, rares, couchés.
- 25 (30). Pronotum couvert de poils noirs.
- 26 (27). Suture des élytres rembrunie. — Élytres jaunes-pailles, ornées de trois fascies transversales bleues: fascie antérieure enveloppe l'angle huméral et s'étend un peu obliquement jusqu'à la suture; fascie médiane entière; fascie antéapicale aussi entière, recourbée vers l'extrémité pres de la suture et confondue avec la tache apicale qui occupe l'extrémité. Long. 14—16 mm. — Sibérie, Steppes des Kirghises.

caerulescens Gebl.

Bull. Ac. Pétersb., 1841, p. 374.

- 27 (26). Suture non rembrunie.
- 28 (29). Élytres d'un testacé rouge avec le dessin noir-bleu. Corps noir-bleu, hérissé de fins poils noirs. — Élytres avec de petits poils noirs, rares, couchés, ornées: d'une bordure basale, d'une grosse tache humérale, d'une petite tache ronde près de la suture, d'une fascie médiane large, sinueuse, entière, rarement interrompue et divisée en deux taches, de deux taches antéapicales (d'une carrée marginale et d'une plus petite arrondie) et, enfin, d'une bordure au bout. Long. 12—20 mm. — Sibérie.

speciosa Pall.

Icon., 1882, p. 84, Pl. E, f. 12.

³⁾ Cette espèce est assez douteuse. Je n'en puis pas donner une conclusion décisive, car cette espèce ne m'est pas connue en nature.

- 29 (28). Élytres bicolores: d'un testacé pâle au milieu et d'un rouge-brunâtre à leurs parties antérieure et postérieure avec le dessin bleu-noirâtre: deux taches antérieures, fascie médiane dentée, deux taches arrondies au-dessous du milieu et une petite tache anguleuse à l'extrémité, souvent suture à son $\frac{1}{4}$ postérieur étroitement bordée; quelquefois deux taches antérieures réunies ensemble, formant une fascie (ab. α) ou fascie médiane remplacée par deux ou trois taches (ab. β). Long. 10—18 mm. — Mongolie, Turkestan or.

mongolica Dokht.

Horae Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 345. — *aurora* Escher. Münch. Kol. Zeit., 1904, p. 34.

- 30 (25). Pronotum garni de poils blancs ou gris mêlés de noirs.
 31 (38). Corps allongé. Fascies et taches des élytres bleues, bleues-noires ou vertes-bronzées.
 32 (35). Suture des élytres rembrunie.
 33 (34). Élytres avec de petits poils blancs, rares, couchés. Corps vert-bronze. — Élytres jaunes-pailles avec le dessin noir-bleu, qui varie beaucoup: base et suture étroitement bordées jusqu'au-delà de l'angle apical (parfois cette bordure élargie anguleuse au-dessus du milieu de la suture); une bande longitudinale, qui descend de la base jusqu'au tiers et forme un petit crochet à son extrémité, en face une contiguë à la suture; une petite tache suturale ronde au tiers antérieur (parfois confluée avec la suture) et, enfin, deux taches ovales près du bout, posées obliquement; quelquefois bande longitudinale représente la tache subhumérale et deux taches médianes (ab. α) ou bande longitudinale élargie près du bord latéral par une large tache enveloppant ce dernier presque à son $\frac{2}{3}$ antérieur, parfois bordure suturale élargie à l'extrémité en petite tache anguleuse (ab. β). Long. 10 mm. — Russie mér., Sibérie, Steppes des Kirghises.

ledebouri Geb l.

Mém. Mosc., 1829, p. 22, 14.

- 34 (33). Élytres vêtues de petits poils noirs, à peine visibles, très rares et très courts. — Dessous du corps garni de poils gris, couchés. Antennes rougeâtres. Élytres d'orange avec le dessin noir-bleu: deux taches antérieures, une humérale allongée, l'autre suturale ronde, parfois réunies ensemble; deux fascies (médiane et postérieure) dentées, la dernière recourbée vers l'extrémité par la suture et confondue avec la petite tache anguleuse qui occupe l'extrémité de l'élytre; souvent les fascies interrompues; quelquefois les antennes plus foncées, presque brunes-noirâtres (ab. α = *speciosoides* Reitt. in litt.). Long. 15 mm. — Turkestan occ., Turcménie.

cyaneovaria Reitt.

Verhandl. Nat. Ver. Brünn, 1889, p. 121.

35 (32). Suture des élytres non rembrunie.

36 (37). Extrémité des élytres avec liséré de noir-bleuâtre. — Élytres d'orange, mates, avec les petits poils blancs, couchés, ornées de 7 taches noires - bleuâtres, placées: 2, 3, 2, et une bordure apicale; parfois les taches médianes réunies ensemble. Long. 10—13 mm. — Sibérie, Russie mér., Asie Min.

sericea Pall.

Icon., 1782, p. 85, Pl. E, f. 10.

37 (36). Extrémité des élytres sans liséré. — Corps et pronotum garnis de poils gris mêlés de noirs, dressés. Élytres garnies de poils blancs ou blancs et noirs, courts, très fins, couchés, ornées de taches bleues: deux antérieures, l'une humérale, l'autre suturale, posées obliquement; parfois tache humérale divisée en 2 taches séparées; deux taches médianes, souvent petite tache interne manque, et deux taches antéapicales. Long. 13 mm. — Espagne.

uhagoni Martin.

An. Esp., 1873, p. 66.

38 (31). Corps assez court, vert-bronzé-noirâtre. Taches des élytres noires. — Antennes presque de la longueur de la moitié du corps chez ♂, un peu plus courtes chez ♀. Élytres d'un jaune d'ocre, garnies de courts poils blanchâtres, ornées de 7 taches: deux antérieures, l'une allongée, l'autre petite ronde; trois médianes en triangle et deux antéapicales; celles-ci quelquefois liées entre elles, rarement aussi les postérieures. Long. 9—11,5 mm. — Turquie.

decora Friv.⁴⁾

A' Magyar Tud., 1835, p. 264, Pl. 6, f. 6.

39 (24). Élytres couvertes également et assez densément de poils noirs, couchés.

40 (41). Élytres jaunes-tastacées, ornées de 6 taches noires petites, arrondies, placées: 2, 2, 2, et d'un liséré court à l'extrémité; quelquefois seulement trois taches (ab. α) ou tache antérieure interne manque et deux taches postérieures très petites (ab. β = var. *leprieuri* Pic)⁵⁾ ou deux taches antérieures manquent (ab. γ) ou, enfin, une taille plus petite (ab. δ = var. *suspiciosa* Rosenh.). Long. 11—17. — Espagne.

hieracii Graef.

Rev. zool., 1849, p. 621, 6.

⁴⁾ *M. formosa* Will., n. n. (Deut. Ent. Z., 1910, pp. 22—23).

⁵⁾ L'Ech., 1896, p. 62.

- 41 (40). Élytres ornées de taches et de fascies.
 42 (43). Pronotum avec dépression transverse par devant, irrégulièrement et rarement ponctué. — Élytres brunes-rougeâtres avec trois fascies noires-bleuâtres: une au tiers premier, une au milieu et une au bout. Ressemble beaucoup à *M. frolovi* Germ. Long. 11—12 mm. — Turkestan, Turcménie.

königi Dokht.

Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 143, f. 19.

- 43 (42). Pronotum sans dépression transverse par devant, assez régulièrement ponctué.
 44 (45). Bouts des élytres avec une bordure large, échancrée. Élytres garnies de poils noirs, couchés. — Corps bleu ou vert-noir avec de fins poils noirs. Élytres d'un jaune d'ocre ou d'un jaune rouge, ornées de dessin bleu ou noir-verdâtre métalliques: deux fascies, ordinairement complètes, l'une au tiers antérieur, l'autre au milieu, et bordure apicale large, échancrée (forme typique); ce dessin varie beaucoup: fascie médiane remplacée par deux taches, l'une grosse vers le même bord latéral et l'autre sur la suture, pyriforme, commune (ab. α); fascies antérieure et médiane remplacées par deux taches, l'une petite humérale, isolée, l'autre médiane externe, comme dans l'aberration précédente, et une bordure suturale, qui s'élargit vers l'écusson et borde ce dernier et la base de élytre (ab. β); fascies antérieure et médiane se réunissent entre elles sur le bord latéral et parfois aussi sur la suture par bordure étroite (ab. γ = ? var. *sodalis* Heyd.⁶⁾; fascies antérieure et médiane, à l'exception de petite tache claire près de l'écusson, confondues en une large tache qui occupe $\frac{2}{3}$ de l'élytre (ab. δ = var. *obtecta* Escher.)⁷⁾ et fascie antérieure manque, parfois remplacée par un trait longitudinale sur l'épaule (ab. ϵ = var. *fenestrata* Escher.)⁸⁾. Long. 11—16 mm. — Steppes des Kirghises, Sibérie, Turkestan, Kuldja, Turcménie.

frolovi Germ.⁹⁾

Spec. Nov., 1824, p. 170, 281. — *intermedia* Fisch. ~~W. Ent. Z. II~~ 1824, p. 226, Pl. XL, f. 7.

⁶⁾ Deut. Ent. Z., 1883, p. 65.

⁷⁾ Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 108, Pf. II, f. 18.

⁸⁾ Ib., Pl. II, f. 17 a, b.

⁹⁾ *Z. staudingeri* Heyd. (Deut. Ent. Z., 1881, p. 328). — Corpore nigro-viridi, elytris rufoluteis, apice, macula posthumerali, vitta obliqua transversa, maculaque dubica, ad scutellum anguste producta in sutura. — Signatura elytrorum ut *Z. pusillae* Tauch. sed vitta mediana obliqua aliter dentata; macula posthumerali, maculique non nigris sed evidenter nigro-viridibus vel nigro-caeruleis. *Z. pusilla* difert corpore majore, longiore, capite thorace fortiter profunde punctatis. Variat maculis partim deficientibus, ita ut in apice sola color niger caeruleus vel niger-viridis conspicuus. — Long. 8,5—12 mm.

Cette espèce ne se distingue de *M. frolovi* Germ. que par le dessin, qui a la tendance vers l'abréviation. Je pense que *M. staudingeri* Heyd. est une des formes de *M. frolovi*. Pour éclaircir cette question il me faut un grand matériel que je ne possède pas pour le moment.

- 45 (44). Bouts des élytres avec bordure très étroite, noire. Élytres garnies de poils noirs, dressés. — Corps noir-verdâtre avec de poils longs, dressés. Élytres jaunes-testacées, ornées de dessin noir ou noir avec reflet bleuâtre : deux taches antérieures, l'une humérale, allongée, remontant jusqu'à la base, bord cette dernière et la suture jusqu'à la fascie antéapicale, l'autre arrondie, placée sur la suture ; une fascie médiane dentelée ; une fascie antéapicale, prolongée par la suture et le bord latéral en ligne, rebordant toute l'extrémité (forme typique) ; fascie médiane réunie avec tache humérale (ab. α) ; fascies médiane et antéapicale assez étroites, tache humérale petite, arrondie (ab. β) ; fascie médiane se réunit avec tache humérale et avec fascie antéapicale par une bande longitudinale et parfois fascie médiane interrompue près de la suture (ab. γ). Long. 10—12 mm. — Turkestan, Boukharie or.

lucens Escher.

Münch. Kol. Z., 1904, p. 32. — *staudingeri* var. *apicetenuepunctata* Sum. Rev. Russe d'Ent., XIII, 1913, p. 304.

- 46 (23). Antennes un peu plus courtes et plus épaisses au bout chez ♂ ♀. Deux derniers articles plus serrés. — Élytres bleues avec dessin d'un jaune-testacé : une tache oblongue à la base et deux fascies, l'une médiane, raccourcie en dehors, l'autre antéapicale, complète, sinuée ; ce dessin est très variable : tache basale réunie avec fascie médiane par une tache longitudinale (ab. α) ; tache basale manque (ab. β) ; fascies médiane et antéapicale confluent le long de la suture (ab. γ) ; tache basale et deux fascies médiane et antéapicale réunies ensemble (ab. δ). Long. 6—11 mm. — Steppes des Kirghises, Sibérie, Turkestan bor., Kouldja, Turcménie.

splendidula Pall.

Icon. ins., 1782, p. 83, Pl. E., f. 8.

- 47 (22). Élytres bleues ou vertes métalliques avec une fascie postmédiane ou avec une tache près de l'angle sutural d'un jaune-testacé ou d'un orange. Long. 5—9 mm. — Russie mér., Sibérie, Steppes des Kirghises, Turcménie.

bivulnera Pall.

loc. cit., p. 94, Pl. E., f. 23.

- a (b). Élytres ornées d'une tache postsuturale.

forme typique.

- b (a). Élytres ornées d'une fascie postmédiane assez large, dentée et échancrée atteignant la suture et presque le bord latéral ; cette fascie varie beaucoup. Long. 8—10 mm. — Kouldja, Turkestan.

bivulnera m. unifasciata Ball.¹⁰⁾

Bull. Mosc., 1878, p. 91.

¹⁰⁾ *M. monozona* Will., n. n. (Deut. Ent. Z., 1910, pp. 22—23).

- 48 (21). Pronotum large, également convexe au milieu, à peine rétréci en avant. — Elytres bleues avec les taches d'un jaune-testacé: une fascie basale, en demi-lune, et deux taches antéapicales, l'une externe petite, l'autre interne grosse, liées ensemble. Long. 10—12 mm. — Perse.

plurivulnera Dohrn.

Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 73.

- 49 (2). Corps noir.
 50 (303). Taches des élytres noires.
 51 (302). Deuxième article des antennes plus courte que troisième.
 52 (277). Élytres également ridées-pointillées ou pointillées-granulées, excepté base et partie postérieure.
 53 (276). Rides, points et granulation assez fins.
 54 (271). Pronotum noir.
 55 (228). Pronotum vêtu de poils noirs ou mêlés (noirs et gris).
 56 (219). Pattes noires.
 57 (214). Antennes noires, ou deux ou trois derniers articles roussâtres ou brunâtres, ou 3—6 articles ferrugineux à la base.
 58 (59). Élytres avec une bosse allongée lisse sur chacune, à leur base entre l'écusson et l'épaule. — En dessus d'un noir brillant avec un faible reflet métallique bleuâtre ou verdâtre. Élytres jaunes pâles avec le dessin noir, très variable, excepté bordure apicale: une tache humérale allongée, remontant jusqu'à la base et se continuant de manière à entourer l'écusson et à former une tache triangulaire commune derrière lui, les hachures courtes et les points vers le bord latéral un peu au-dessous du milieu et bordure large à l'extrémité des élytres, profondément échancrée près de la suture (ab. α = *voigtsii* Escher.); hachures et points vers le bord latéral remplacés par une tache quadrangulaire, bordures basale et apicale comme dans l'aberration précédente (ab. β)¹¹⁾; le dessin comme dans l'aberration précédente et une tache arrondie, commune, au milieu de la suture¹²⁾; parfois tache quadrangulaire réunie avec la bordure apicale et entre taches médianes (quadrangulaire et arrondie) plusieurs petites taches vagues (ab. γ); tache humérale réunie avec tache médiane externe, formant une bande longitudinale, qui ne conflue pas avec le bord latéral, tache suturale arrondie remplacée par une bordure suturale qui s'étend le long de la suture à $\frac{2}{3}$ de sa longueur, bordure apicale comme dans l'aberration précédente (ab. δ); bande longitudinale large, conflue avec le bord latéral et occupe les premiers $\frac{2}{3}$ de la longueur de ce dernier, bordures basale et apicale comme dans l'ab. β (ab. ϵ); les bandes longitudinales (latérale et suturale), s'élargissant en dedans en forme d'un angle, s'approchent l'une de l'autre au milieu

¹¹⁾ Rev. Russe d'Ent., XIII, 1913, p. 305, f. 12.

¹²⁾ loc. cit., f. 13.

de l'élytre, bordures basale et apicale comme dans l'aberration précédente (ab. 5); deux bandes longitudinales, réunissant entre elles par une fascie médiane et avec bordures basale et apicale, forment deux taches jaunes, l'une longitudinale, l'autre transversale en forme de zigzag (forme typique) et deux bandes longitudinales, qui confluent en une tache, couvrent les premiers $\frac{2}{3}$ des élytres, bordure apicale comme dans la forme typique (ab. 7). Long. 7,5—11 mm. — Sibérie, Tartarie, Kouldja.

quadrisignata Fisch. - W.

Entom. Ross., II, 1823. p. 236. Pl. 40, f. 9. — *voigtsii* Escher., Münch. Kol. Z., 1904, p. 33.

59 (58). Élytres sans bosse.

60 (147). Pronotum sans sillon longitudinal au milieu.

61 (114). Pronotum sans dépression transversale avant le bord antérieur.

62 (113). Antennes noires.

63 (106). Extrémité des élytres sans bordure ou avec bordure très étroite, noire.

64 (71). Poils sur le pronotum blancs ou mêlés (noirs et gris).

65 (66). Élytres jaunes-rougeâtres, sans taches noires. — Pronotum assez large, densément ponctué, peu rétréci en devant, garni d'une pubescence d'un gris-soyeux, mêlée de poils noirs, dressés. Long. 12 mm. — Asie Min., Perse.

unicolor Fald.

Fn. Transc., II, 1837, p. 127, 378, Pl. IV, f. 8.

66 (65). Élytres jaunes-testacées avec taches noires.

67 (68). Pronotum presque lisse, garni de très courts poils blancs, denses, à peine visibles. — Élytres d'un jaune-pâle, ornées de taches noires. Cette espèce est variable quant au dessin des taches. Long. 8—9,5 mm. — Caucase.

tomentosa Escher.

Wien. Ent. Z., 1899, p. 99.

68 (67). Pronotum ponctué.

69 (70). Pronotum très finement et densément pointillé. — Corps noir, luisant avec un reflet verdâtre ou bleuâtre, hérissé de poils fins, assez longs, noirs, mêlés de gris. Pronotum convexe, égal, arrondi sur les côtés, un peu rétréci en devant. Élytres jaunes-testacées, ornées de 4 taches noires: d'une oblongue humérale, d'une arrondie après le milieu, près du bord latéral et de deux autres vers le bout, externe presque près du bord latéral, interne à une certaine distance de la suture ou ornées de 6 taches, disposées 2, 2, 2 (ab. α = var. *taurusiensis* Pic)¹³). Long. 11 mm. — Caucase, Perse.

externepunctata Fald.

Faun. Transcauc., II, 1837, p. 128, 379.

¹³) Bull. Soc. Zool. Fr., 1901, p. 77.

- 70 (69). Pronotum ponctué plus fortement et plus rarement. — Corps noir, hérissé de poils noirs, mêlés de gris, plus obscurs. Élytres jaunes-testacées avec 6 taches, disposées 2, 2, 2, tache humérale n'est pas allongée. Long. 9—10 mm. — Caucase.

serena Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 99, Pl. II, f. 2.

- 71 (64). Poils sur le pronotum noirs.

- 72 (73). Antennes sans massue au bout, 3—6 articles ferrugineux à la base. — Pronotum sans dépression, vaguement ponctué. Élytres d'un roux-ferrugineux sans taches noires. Long. 11 mm. — Asie Min., Transcaucasie, Arménie.

concolor Mars.

Mon. Myl., 1872, p. 158.

- 73 (72). Antennes plus ou moins élargies au bout.

- 74 (77). Première partie des élytres sans rides ou avec les rides à peine visibles, très fines et très densément pointillées.

- 75 (76). Pronotum convexe, assez fortement et assez rarement pointillé. Élytres jaunes avec le dessin noir qui forme: deux taches antérieures (externe oblongue, interne touchant la suture et remontant quelquefois jusqu'au rebord subscutellaire), deux taches au milieu (externe en carré, très rapprochée du bord, interne ponctiforme) et deux taches vers le bout, ovales; ces taches varient peu et ne forment pas de bandes. Long. 5—8 mm. — Caucase (?), Espagne.

dejeani Gyll.

Schönh. Syn., III, Append., 1847, p. 35, 55.

- 76 (75). Pronotum assez fortement et densément ponctué, arrondi sur les côtés, peu rétréci en devant, avec une carène longue dans son milieu et de chaque côté une petite place lisse (callosité); parfois callosités manquent. Élytres brunes-rougeâtres avec trois taches: une antérieure près de la suture et deux autéapicales ou une tache antérieure interne, une médiane externe et une antéapicale interne, ou deux taches médiane et une antéapicale interne ou deux taches antérieures et une antéapicale interne (forme typique); ces taches varient très beaucoup de nombre, de grandeur et de disposition: ¹⁴⁾ 1) une tache antéapicale à la suture (ab. α = var. *unipunctata* Fuen.); 2) deux taches antérieures ou une tache antérieure interne et autre antéapicale interne (ab. β = var. *bipunctata* Fuen.); 3) quatre taches: deux médiane et deux antéapicales, ou une antérieure interne, une médiane externe et deux antéapicales, ou une antérieure externe, une médiane externe et

¹⁴⁾ Fuen. Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., IX, 1909, pp. 307—308.

deux antéapicales, ou une antérieure interne, deux médianes et une antéapicale interne (ab. γ = var. *quadripunctata* Fuen.); 4) cinq taches: une antérieure interne, deux médianes et deux antéapicales (ab. δ = var. *quinquepunctata* Fuen.); 5) six taches, posées 2, 2, 2 (ab. ϵ = var. *sexpunctata* Fuen.); 6) une fascie médiane et deux taches antéapicales (ab. ζ = var. *bipunctatofasciata* Fuen.); 7) une fascie médiane et trois taches: deux antérieures et une antéapicale interne ou une antérieure interne et deux antéapicales (ab. η = var. *tripunctatofasciata* Fuen.); 8) une fascie médiane et quatre taches, disposées 2—2 (ab. θ = var. *decimspilota* Chevrl.) et 9) sans taches (ab. ι = var. *luteipennis* Duf.). Long. 5—7 mm. — Espagne.

varians Gyll.¹⁵⁾

loc. cit., p. 34, 54.

- 77 (74). Première partie aussi distinctement ridée-pointillée comme au milieu.
 78 (105). Taches antéro-suturales (une sur chaque élytre) ou tache en forme du coeur, commune suturale après l'écussonne n'est pas réunie avec la fascie médiane ou avec la médio-interne, si fascie médiane est divisée.
 79 (96). Pronotum plus ou moins grossièrement ponctué.
 80 (91). Élytres jaunes-pâles ou jaunes-testacées.
 81 (90). Pronotum à peine rétréci en avant.
 82 (83). Élytres garnies de poils dressés, avec dessin noir, qui forment: deux bordures, basale et apicale, deux taches antérieures arrondies, isolées, une fascie au milieu, festonnée, raccourcie, et deux taches antéapicales, l'une latérale et l'autre suturale, commune, se réunissent avec bordure apicale; parfois liséré apical manque (ab. α = ? *akbessiana* Reitt.). Long. 12,6 mm. — Syrie.

sinuata Klug.

Symb. phys., 1845, p. 19, Pl. 32, f. 7.

- 83 (82). Élytres garnies de poils couchés, sauf le premier tiers.
 84 (87). Pronotum plus ou moins régulièrement ponctué.
 85 (86). Pronotum plus grossièrement et moins densément ponctué, convexe, avec une fine carène longitudinale au milieu antérieur, par-

¹⁵⁾ *M. scutellata* Rosenh., qui m'est inconnue en nature, ressemble beaucoup à *varians* Gyll. M. de Marseul la regarde comme variété de cette dernière. En voici la description courte de cette espèce. — „Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, les 5 derniers articles formant une massue forte. Pronotum petit, allongé, presque droit sur les côtés, distinctement rétréci avant le milieu, convexe, luisant, densément et assez fortement ponctué, faiblement garni de longs poils noirs, avec une petite fossette oblongue sur le milieu. Élytres jaunes avec le dessin noir: la base est étroitement noire et cette couleur s'élargit autour de l'écusson où elle rejoint celle du côté opposé, 5 petits points noirs, disposés comme dans la *10-punctata* F. Long. 9—11 mm. — Espagne“.

fois à peine visible. — Élytres jaunes-pâles avec dessin noir: deux taches au tiers, une fascie géniculée au milieu, raccourcie en dedans, et deux taches antéapicales; parfois taches antérieures ou antéapicales réunies ensemble (forme typique); ces taches varient extrêmement, 6 taches ordinaires (2, 2, 2), en se développant peu à peu se changent en trois fascies et les dernières en se dilatant et se réunissant dans des lieux divers, couvrent toute l'élytre, sauf plusieurs petites taches isolées l'une de l'autre de la coloration fondamentale. En voici ces aberrations¹⁶⁾: 1) élytres sans taches (ab. α = var. *novickii* P u e l.); 2) trois taches de chaque élytre, posées 2, 1, 0 (ab. β = var. *pseudoobsoleta* P u e l.); 3) quatre taches, 2, 1, 1 (ab. γ = var. *A*); 4) cinq taches, 2, 1, 2 (ab. δ = var. *B*); six taches, 2, 2, 2 (ab. ϵ = var. *obsoleta* N o v i c k.); 6) deux taches isolées et deux fascies raccourcies en dedans (ab. ζ = var. *gracillior* P u e l.); 7) trois fascies raccourcies en dedans (ab. η = var. *connata* R e y.); 8) une fascie entière et quatre taches isolées (ab. θ = var. *centropunctata* B a u d i); 9) deux fascies, antérieure entière et médiane raccourcie en dedans, se réunissent l'une de l'autre par une bande longitudinale près du bord latéral (ab. ι = var. *prolongata* P u e l.); 10) deux fascies entières et deux taches isolées (ab. κ = var. *meridionalis* P u e l.); 11) deux fascies, médiane et postérieure, se réunissent par les bords, parfois assez largement, taches antérieures isolées ou connées, formant une fascie (ab. λ — var. *fenestrata* P u e l.); 12) fascies médiane et antéapicale sont très largement réunies par la suture et par le bord latéral qu'elle ne laissent subsister entre-elles qu'une petite tache jaune sur le milieu de chaque l'élytre, taches antérieures isolées ou connées ou l'externe est libre et l'interne se réunit à sa correspondente sur la suture (ab. μ = var. *eryngii* P u e l.); 13) trois fascies antérieure, médiane et antéapicale entières (ab. ν = var. *camarguensis* P u e l.); 14) élytres noires avec quatre taches d'un jeune: tache basal transversale, tache antémédiane aussi transversale allant du bord latéral, tache postmédiane petite, allongée, et tache apicale ronde et toute petite (ab. \omicron = var. *apicaliformis* P u e l.); 15) élytres depourvus de dessin noirs post-médians et ayant seulement des macules antérieures isolées, une fascie médiane complète et une étroite bordure apicale, celles-ci noires (ab. π = var. *subobliterata* P i c¹⁷⁾). Long. 6—12,6 mm. — Europe mér., Russie mér. et or., Turkestan.

geminata F.

Ent. Syst., Suppl., 1738, p. 120, 9—10.

¹⁶⁾ P u e l, L. Tableau sur les variétés du *Zonabris geminata* F.* L'Echange, 23, 1907, pp. 115—119.

¹⁷⁾ L'Ech., 24, 1908, p. 72.

- 86 (85). Pronotum moins grossièrement et assez densément ponctué, avec rides fines, parfois à peine visibles. — Élytres jaunes-pâles, avec dessin noir: deux taches antérieures, l'une suturale, commune, cordiforme, prolongée le long de la suture et à la base, l'autre ovale au-dessous de l'épaule; une fascie médiane en forme ω transversale et deux taches antéapicales, qui se réunissent par un liséré apical en forme lunule. Long. 9 mm. — Russie or., Sibérie, Turkestan bor.

***geminata sibirica* Fisch.-W.**

Entomogr., II, 1824, p. 225, Pl. 40, f. 4.

- 87 (84). Pronotum irrégulièrement et très grossièrement ridés-ponctué. Élytres pailles-pâles, avec dessin noir.

- 88 (89). Front sans tache rouge. — Élytres pailles-pâles, ornées de dessin noir: deux taches antérieures, l'une allongée sur l'épaule, l'autre près de la suture, parfois se touche de cette dernière; deux taches médianes, l'une latérale, grande, l'autre suturale, petite, parfois réunies ensemble; deux taches antéapicales, qui se réunissent par un liséré apical, parfois elles confluent, formant une fascie antéapicale, et, enfin, étroite bordure basale, prolongée par la suture jusqu'à la tache antérieure interne; quelquefois tache antéro-interne manque (ab. α). Long. 7—8 mm. — Turkestan.

***geminata hauseri* Escher.**

Wiën. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 101, Pl. II, f. 6, a et b. — *Z. pilosella* Shl., Oefr. Finsk. Vet.-Soc. Förh., L., 1907—1908, p. 92.

- 89 (88). Front avec deux taches longitudinales rouges. — Élytres testacées, ornées de cinq taches noires, posées: 2, 1, 2; parfois les taches disparaissent. Long. 9—13 mm. — Espagne.

***geminata pauper* Escher.¹⁸⁾**

loc. cit., p. 100, f. 5.

- 90 (81). Pronotum fortement rétréci en avant, ponctuation assez grossière, non pas dense. Élytres testacées avec taches noires: deux antérieures séparées, deux médianes et deux antéapicales, qui touchent le bord latéral et la suture; parfois taches médianes et antéapicales se réunissent, formant deux fascies. Long. 9—10 mm. — Grèce.

***neglecta* Escher.**

loc. cit., p. 102., Pl. II, ff. 7 a et b.

¹⁸⁾ *Z. rosinae* Escher. ressemble beaucoup d'après le dessin à *quadripunctata* L.; la tête et le pronotum comme dans *Z. pauper* Escher. Toute la description latine occupe moins que deux lignes: „*Zonabri pauperi* affinis, differt ab eadem elytris margine lata apicali nigra“. À ces lignes sont ajoutées encore quelques lignes en allemand, dont les mots suivants sont dignes d'attention: „Kopf und Halsschild wie bei *pauper*. Auf der Stirn zwei längliche rothe Makeln (bei *tricincta*, var. n. nur eine rundliche Stirnmakel)“. A cause de la description très brève et peu substantielle il est impossible d'avoir une représentation claire de cette espèce. Var. *tricincta* Escher. = var. *unisticta* Voig., n. n. Wien. Ent. Z., XXI, p. 178.

- 91 (80). Élytres rouges-brunâtres ou pâles-rosâtres.
92 (95). Pronotum subglobuleux, ponctuation assez grossière, non pas dense.
93 (94). Ponctuation sur le pronotum plus ou moins égale. — Élytres d'un jaune d'ocre-rougeâtre avec taches noires: deux antérieures (l'une humérale assez allongée, l'autre suturale plus petite, presque carrée), deux médianes (l'une au milieu de chaque élytre, assez grande, subcordiforme, l'autre sur la suture, commune, rhomboïde) et enfin deux subapicales arrondies près de l'extrémité de chaque élytre. Long. 10—11 mm. — Turkestan.

undecimnotata Heyd.

Deut. Ent. Z., 1883, p. 66.

- a (b). Taches subapicales ne se confluent pas.

forme typique.

- b (a). Taches subapicales se confluent, formant une fascie. Élytres d'un jaune-pâle-rosâtre avec trois fascies (antérieure, médiane et subapicale) noires, parfois les fascies antérieure et médiane divisées en 2 taches, fascie subapicale raccourcie en dehors et parfois se réunit avec la fascie médiane; quelquefois fascie médiane large (ab. α = var. *opulenta* Escher.¹⁹⁾). Long. 10—12 mm. — Turkestan, Caucase.

undecimnotata m. crux Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1892, p. 103, Pl. II, ff. 8 a, b.

- 94 (93). Ponctuation sur le pronotum inégale, pronotum au milieu lisse, en avant et sur les côtés assez grossièrement et assez densément ponctué, arrondi, rebombé, assez pauvrement pourvu de poils. — Élytres d'un brun-rougeâtre, assez densément pubescentes, avec le dessin noir, qui forme: deux taches antérieures, fascie médiane géniculée, assez fine au milieu et n'atteignant pas le bord latéral, fascie subapicale beaucoup plus large et une fine ligne qui reborde l'extrémité de l'élytre. Long. 11,5 mm. — Turkestan.

undecimnotata turkestanica Dokht.

Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 168, f. 56.

- 95 (92). Ponctuation dense profonde, égale. — Élytres d'un flave-testacé pâle, avec le bord basal, le bord apical et 6 taches à chacune noires: une tache humérale, ovale, remontant sur le calus huméral, une tache arrondie, contiguë à la suture et liée à la base par une étroite bordure, deux taches médianes, l'une externe marginale, carrée, grande, dépassant de beaucoup, l'interne petite, et deux taches subapicales se réunissent en une fascie large qui se continue le long du bord apical, formant une petite tache d'un flave. Long. 11 mm. — Espagne.

sobrina Graëll.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1851, p. 20.

¹⁹⁾ Münch. Kol. Z., 1904, p. 33.

- 96 (79). Pronotum très finement pointillé ou lisse.
 97 (98). Pronotum très rétréci conique en avant, très convexe au milieu, garni de poils courts, dressés. Antennes courtes, très élargies au bout. — Élytres jaunes avec 6 taches noires à chacune; souvent ces taches se réunissent entre elles par une ligne transversale. Long. 7,5—8 mm. — Asie Min., Caucase²⁰).

pentheri Gangl.

Ann. d. k.-k. Nat. Hofmus., XX, 1905, p. 279.

- 98 (97). Pronotum peu rétréci en avant. Antennes médiocres, peu épaisses.
 99 (100). Pronotum lisse ou densement et finement ponctué qu'on à peine à distinguer les points. — Élytres d'un jaune-testacé avec 6 taches noires: deux antérieures (externe large, ovale, remontant sur l'épaule en s'atténuant et se continuant en une bordure étroite le long de la base jusqu'au derrière l'écusson, interne ovale, grande), deux médianes (externe arrondie, marginale, interne petite près de la suture) et deux postérieures (externe également grande, marginale, se prolongeant en bordure étroite vers l'angle apicale, interne petite moindre que l'interne médiane. Long. 11 mm. — Caucase.

laevicollis Mars.

L'Abeille, VII, 1870, Monogr., p. 109.

- 100 (99). Pronotum très finement, mais distinctement pointillé.
 101 (104). Pronotum couvert de points épars.
 102 (103). Élytres avec taches, sans fascies transversales. — Pronotum un peu plus large que long, convexe, arrondi sur les côtés. Élytres jaunes-pâles, brièvement rebordées derrière l'écusson, avec un trait brun et trois petites taches noires: une allongée sous le calus huméral, une arrondie sur la marge près de l'extrémité et une toute petite près de la suture. Long. 9 mm. — Syrie.

sexnotata Redt.

Kotsky, Col. Syr. et Chypre, 1843, p. 987, 22, f. 22.

- 103 (102). Élytres avec taches et fascies transversales. — Pronotum convexe, égal, avec de faibles points très écartés un peu dilaté en bosse sur les côtés. Élytres avec le dessin noir: deux taches arrondies, l'externe derrière la bosse humérale, l'interne suturale, remontant sur la suture jusqu'à la base qui est bordée jusqu'à l'épaule; deux fascies ondulées, médiane et subapicale; la dernière conflue avec la marge étroite apicale. Long. 11 mm. — Sibérie, Steppes des Kirghises.

mannerheimi Geb l.

Mém. Acad. Pétersb., III, 1837, p. 103.

²⁰) Un exemplaire de cette espèce se trouve dans la collection de Musée de Caucase.

- 104 (101). Pronotum couvert de points très denses. — Élytres d'un jaune-brunâtre avec les taches noires, qui varient: deux antérieures, une médiane externe et deux subapicales; parfois tache antérieure externe se réunit avec la tache médiane, formant une bande longitudinale. Long. 10 mm. — Italie.

flexuosa abrutia B a u d i ²¹⁾.

- 105 (78). Taches antéro-suturales (une sur chaque élytre) ou une tache en forme du coeur, commune suturale, après l'écusson, se réunissent avec fascie médiane ou avec la tache médio-interne, si fascie médiane est interrompue, et ne se réunit que si la tache suturale commune a une forme fourchue. — Pronotum faiblement et densement pointillé, également convexe, côtés parallèles. Elytres jaunes-pâles avec dessin noir: une tache humérale, allongée, conflue avec la tache suturale par la bordure basale, une tache suturale commune, en forme d'ovale réunie avec fascie médiane, cette dernière s'élargit en dehors parfois elle interrompue et conflue avec la tache humérale, et deux taches antéapicales, l'une latérale, l'autre suturale, confluentes ensemble et réunies avec liséré apical, forment une petite tache de la couleur fondamentale; quelquefois élytres ornées chacun de 2 bandes sinuées, l'une suturale et l'une externe non jointes entre elles en travers, tandis que le sommet des élytres noir enclôt complètement une macule jaune isolée (ab. α = var. *cassetensis* P i c) ²²⁾ ou bandes suturale et externe interrompues en macules variables et de plus non jointes entre elles en travers, avec le sommet des élytres d'ordinaire à dessin noir interrompu (ab. β = var. *inflexuosa* P i c) ²³⁾ ou bandes externe et suturale noires réunies entre elles sur leur milieu, et isolées postérieurement de 2 macules post-médianes également noires et séparées, tandis que le sommet des élytres est noir et enclôt, mais non complètement une macule jaune médiane (ab. γ = var. *rarissima* P i c) ²⁴⁾ ou taches médianes réunies et formant ainsi une fascie transversale, plus ou moins sinuée (? var. *pyrenaea* P i c). Long. 9—12 mm. — Europe mér., Russie mér., Sibérie, Turcménie, Caucase.

flexuosa O l. ²⁵⁾

Enc. méth., VIII, 1811, p. 101, 56.

²¹⁾ J'ai reçu plusieurs individus de M. Le M o u l t sous le nom de *alpina* var. *abrutia* B d i. (?). Je ne sais pas où cette espèce avait été décrite.

²²⁾ L'Ech., 24, 1908, p. 72.

²³⁾ loc. cit.

²⁴⁾ loc. cit.

²⁵⁾ *Z. beckeri* E s c h e r. (Wien. Ent. Z., 1890, p. 24) est très proche de *M. flexuosa* O l. Toute la description de cette espèce peut être puisée par la désignation de quelques petits changements du dessin des élytres. J'allègue cette description vide de sens:

- a (b). Tache humérale et tache médiane externe ou fascie médiane sont divisées ou confluentes par un petit cou plus étroit que les taches.

forme typique.

- b (a). Tache humérale et tache médiane externe, confluant, forment bande longitudinale, qui touche le bord latéral par son bout élargi au-dessous du milieu.

- c (d). Tache antéro-suturale commune en forme d'ovale ou de trapèze et réunie avec tache médiane interne sur la suture. Long. 9 mm. — Caucase.

flexuosa m. alpina Mén.

Cat. rais., 1832, p. 208, 927.

- d (c). Tache antéro-suturale en forme fourchue ne se réunit pas avec tache médiane interne.

flexuosa m. furcimacula, m. n.

- 106 (63). Extrémité des élytres bordée d'une bande noire large ²⁶⁾.

- 107 (112). Pronotum ponctué.

- 108 (111). Pronotum quadrangulaire ou plus large que long, largement arrondi en avant et également convexe au milieu.

- 109 (110). Pronotum un peu plus large que long. Élytres assez convexes, d'un jaune-pâle, densément réticulées-pointillées, ordinairement avec trois fascies (antérieure devant la base, médiane et apicale) noires; parfois fascie première se divise en deux taches, dont l'externe monte sur le calus huméral et ne touche pas le bord latéral, l'autre sur la suture remonte jusqu'à l'écusson et rejoint une étroite bordure basale. Cette espèce est fort variable quant à la taille et surtout quant au dessin des élytres: élytres d'un jaune avec l'extrémité large noire et quelques taches vagues comme vestige des deux fascies disparues (ab. α = var. *mutabilis* Dej.) ²⁷⁾; élytres d'un jaune, fascie médiane affecte une figure en zigzag qui finit par se réduire à des traits obliques en sens inverse (ab. β = var. *lacera* Fisch.) ²⁸⁾; élytres noires avec deux fascies étroites, d'un jaune, sinuées,

Z. beckeri Escher. — Mit *flexuosa* sehr nahe verwandt, jedoch sicher spezifisch verschieden durch die Stellung der Schultermakel, die bei *flexuosa* konstant bis an die Flügeldeckenbasis reicht, während bei *beckeri* dieselbe weder den Rand noch die Basis berührt, sondern ziemlich weit davon absteht. Auch die Apicalbinde, die im Gegensatz zu *flexuosa* sehr konstant ist, weicht ab, indem diese aus zwei Makeln (eine an der Naht und eine an dem Rand) gebildet wird, die nur durch einen äusserst feinen Randsaum verbunden werden. Von *pusilla* durch den behaarten Halsschild und die Apicalbinde verschieden. — Sarepta (A. Becker)*.

²⁶⁾ Excepté *M. quadripunctata dokhturovi* Escher. ab. γ (voir p. 23).

²⁷⁾ Marseul. Mon. Myl., 1872, p. 132 (v. g.).

²⁸⁾ loc. cit. (v. s.).

et une petite tache basale, parfois obsolète (ab. γ). Long. 9—16 mm. — Tout le pourtour de la Méditerranée au nord, Afrique bor., Syrie, Asie Min., Caucase, Russie or. et mér.

variabilis Pa11.

Icon., 1782, p. 81, pl. E, ff. 7, 14.

- 110 (109). Pronotum beaucoup plus large que long. Élytres peu convexes d'un jaune-roussâtre, densément granulées-pointillées, avec, deux petites taches antérieurs, qui parfois manquent (ab. α), e avec deux fascies: l'une médiane plus ou moins droite, l'autre apicale comme dans l'espèce précédente. Long. 10 mm. — Asie Min.

ciliciensis Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 106.

- 111 (108). Pronotum assez étroit, plus long que large, très rétréci en devant, très densément et finement pointillé. Élytres d'un jaune-pâle, avec dessin noir qui ressemble beaucoup à *M. pusilla* Ol. Long. 9,5—10,5 mm. — Turkestan.

liliputana Escher.

loc. cit.

- 112 (107). Pronotum sans ponctuation ou avec ponctuation très fine, à peine visible. Élytres d'un jaune-pâle avec dessin noir: deux fascies (antérieure et médiane) et l'extrémité larges, parfois fascie antérieure interrompue au milieu. Long. 7—9 mm — Russie or. et mér., Sibérie.

pusilla Ol.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 111, 57.

- a (b). Pronotum sans ponctuation, mat.

forme typique.

- b (a). Pronotum très finement, à peine visiblement, ponctué, peu luisant. Élytres jaunes avec dessin noir: deux fascies (antérieure et médiane) et l'extrémité larges, fascie antérieure réunie avec fascie médiane sur le bord latéral ou ces noires fascies confluent, formant plusieurs taches près au milieu et une fascie postmédiane; celles-ci jaunes (ab. α = var. *montenegra* Pic)²⁹). Long. 5—9 mm. — Bosnie, Caucase (?).

pusilla m. bosnica Reitt.

Wien. Ent. Z., XXII, 1903, p. 230.

- 113 (62). Deux ou trois derniers articles roussâtres ou brunâtres. — Élytres jaunes-pâles, la base et le bout rougeâtres, avec dessin noir: deux taches antérieures arrondies, une fascie bi-sinuée

²⁹) L'Ech., 1911, p. 323, 178.

au delà du milieu et une fascie subapicale plus ou moins raccourcie surtout en dehors; parfois élytres sans taches (ab. α = var. *impexa* Escher.)³⁰⁾ ou fascie médiane conflue avec fascie subapicale, formant une grande tache noire (ab. β). Long. 9—11 mm. — Russie or., Sibérie, Caucase.

impar Thunb.

Spec., VI, 1791, p. 110.

- 114 (61). Pronotum avec faible dépression transversale avant le bord antérieur et une bosse près du milieu, la première parfois à peine visible.
- 115 (138). Trois derniers articles des antennes plus larges que les précédents.
- 116 (121). Front sans tache rouge.
- 117 (118). Pronotum plus ou moins également et densément ponctué. — Élytres jaunes-roussâtres ou rouges-brunâtres, ornées de dessin noir: deux taches au tiers, deux au milieu, une large bordure apicale assez fortement échancrée et une très petite tache subscutellaire commune; ces taches varient beaucoup: taches médianes s'étendent et constituent une fascie (ab. α = var. *adamsi* Fisch.-W.)³¹⁾; quatre taches de chaque élytre forment deux fascies transversales, l'une au tiers, l'autre au milieu, la première raccourcie en dehors et en dedans (ab. β = ? var. *ar-memiaca* Fald.)³²⁾ = var. *antefasciata* Sum.)³³⁾; deux taches médianes remplacées par une assez grande tache isolée, taches antérieures manquent (ab. γ); taches antérieures existantes, taches médianes remplacées par une très petite tache et bordure apicale étroite (ab. δ = var. *maldinesi* Chevél.)³⁴⁾; deux taches antérieures ou médianes disparaissent (ab. ϵ = var. *quadri-punctata* Bilb.)³⁵⁾. Long. 10—16 mm. — Dans tout le bassin de la Méditerranée, Russie mér. et or., Sibérie, Turkestan, Caucase, Syrie.

quadripunctata L.

Syst. Nat., II, 1767, p. 680, 6.

- 118 (117). Pronotum inégalement et pas densément ponctué.
- 119 (120). Bordure apicale très large, occupe un quart postérieur de l'élytre.

quadripunctata angustata, subsp. n.

³⁰⁾ Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 107,

³¹⁾ Entomogr., II, 1823, p. 224, 2, Pl. 40, f. 2.

³²⁾ Fn. Transc., II, 1837, p. 125.

³³⁾ Rev. Russe d'Ent., XIII, 1913, p. 305, f. 1.

³⁴⁾ Mars. Mon. Myl., 1872, Pl. II, f. 37a.

³⁵⁾ Myl., 27, p. 16, Pl. III, f. 7—8. — *tetraspilota* Will., n. n. Deut. Ent. Z., 1910, p. 22.

- 120 (119). Bordure apicale assez étroite. — Corps hérissé de poils noirs ou vêtu de poils mêlés (noirs et gris). Pronotum pas densément, mais assez grossièrement ponctué. Élytres jaunes-testacées, garnies de poils noirs ou mêlés, avec taches noires: deux taches antérieures arrondies, deux taches médianes, l'externe touchant le bord latéral, l'interne assez grosse, et bordure apicale, plus ou moins étroite; quelquefois taches médianes confluent (ab. α = var. *confluens* Escher.)³⁶) ou taches antérieures manquent (ab. β .) ou bordure apicale manque (ab. γ). Long. 11,5—12 mm. — Turkestan.

quadripunctata dokhturovi Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 104, Pl. II, ff. 10 a. b.

- 121 (116). Front avec une tache rouge.
122 (123). Élytres couvertes de poils noirs, dressés. Dépression antérieure et bosse médiane sur le pronotum fortes. — Élytres jaunes-testacées ou rouges-pâles avec le dessin noir: deux taches antérieures, l'une tache humérale, oblongue, l'autre suturale sur la suture; une fascie médiane et bordure apicale non larges; parfois tache humérale manque et tache suturale vague (ab. α) ou taches humérale et suturale manquent, fascie médiane remplacée par deux taches vagues comme vestige de cette fascie (ab. β) ou bordure apicale manque (ab. γ). Long. 12 mm. — Perse bor.

quadripunctata parumpicta Heyd.

Deut. Ent. Z., XXVII, 1883, p. 337, 353.

- 123 (122). Élytres couvertes de poils couchés, sauf le premier tiers; ce dernier hérissé de poils noirs, dressés.
124 (135). Troisième article un peu plus long que quatrième.
125 (128). Élytres avec deux ou trois fascies transversales et avec taches rondes ou seulement avec une fascie apicale large.
126 (127). Pronotum pas si densément ponctué. — Élytres jaunes, brunes ou rougeâtres, avec dessin noir qui est variable: deux taches antérieures, l'une humérale et l'autre suturale commune, parfois les taches se réunissent, formant une fascie; une fascie médiane, rétrécie en dehors et en dedans, et bordure apicale assez large. Le caractère du changement du dessin est autre que dans *M. quadripunctata* L. Parfois fascie médiane conflue avec bordure apicale près de la suture (ab. α). Long. 10—15 mm. — Caucase, Asie Min.

quadripunctata emiliae Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 105.

- 127 (126). Pronotum inégalement, densément et fortement ponctué-ruguleux ou ponctué-granuleux, avec une petite bosse avant le

³⁶) loc. cit. — var. *coalescens* Voig., n. n. Wien. Ent. Z., XXI, p. 178. — var. *integra* Will., n. n. Deut. Ent. Z., 1910, p. 22.

milieu et une petite impression (sans ponctuation) lisse, parfois l'impression au milieu manque. — Élytres jaunes-testacées rougeâtres, ornées de deux fascies, antérieure et médiane, et bordure apicale, noires. Long. 12—17 mm.—Nord de l'Afrique.

quadripunctata tricineta Chev r. ³⁷⁾

Silb. Rev., V, 1837, p. 270, 2.

a (b). Élytres jaunes-testacées avec fascies (antérieure et médiane) larges, moins sinuées.

forme typique.

b (a). Élytres rouges avec fascies étroites, fascie médiane raccourcie à la suture; quelquefois fascie antérieure remplacée par deux taches rondes, rarement fascie médiane divisée en deux taches (ab. α =var. *rubripennis* Chev r.) ³⁸⁾.—Algérie.

quadripunctata tricineta m. guerini Chev r.

loc. cit., p. 3.

128 (125). Élytres avec taches arrondies ou avec taches et un liséré apical ou seulement avec bordure apicale large ou étroite.

129 (134). Corps allongé.

130 (131). Élytres 3,5 fois plus longues que larges, jaunes brunâtres ou brunes-rougeâtres, avec une très petite tache scutellaire, commune, et avec une bordure apicale large ou étroite d'un noir. Long. 12—14 mm.—Perse, Turkestan (?), Asie Min.

quadripunctata apicenigra Escher. ³⁹⁾

131 (130). Élytres 2,5 fois plus longues que larges.

132 (133). Élytres jaunes-testacées pâles, ornées de 4 taches arrondies (placées: 2, 2), les externes beaucoup plus grosses. Pronotum

³⁷⁾ M. Escalera approche dans „Especies de *Zonabris* del S.-W. de Maruccos“ sa nouvelle espèce *M. abdelcaderi* de *M. tricineta* Chev r. Je ne puis pas confirmer s'il a tout à fait raison n'ayant pas bien compris ni la description de la forme commune, ni le rapport des antennes séparées. Voici en quel ordre *M. abdelcaderi* et les espèces voisines sont rangées dans le tableau de M. Escalera.

3 (6). Élytres avec deux fascies transversales et avec bordure large au bout.

4 (5). Articles 8, 9 et 10 beaucoup plus longues que largeur.

oleae Cast.

5 (4). Articles 8, 9 et 10 à peine plus longues que largeur.

tricincta Chev r.

6 (3). Élytres avec trois fascies et avec bordure large au bout.

abdelcaderi, sp. n.

³⁸⁾ loc. cit., p. 270, 3.

³⁹⁾ J'ai reçu de M. Bodemeyer six individus de cette espèce sous le nom de *M. apicenigra* Escher. Je ne sais pas où cette espèce avait été décrite.

peu convexe, densément et également ponctué et à peine rétréci. Long. 11—16. — Espagne, Sicile, Algérie, Égypte, Syrie.
schreibersi Reiche ⁴⁰⁾.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 636, 23.

- 133 (132). Élytres jaunes-rouges testacées, ornées de 5 taches noires (disposées: 2, 2, 1): deux taches arrondies, derrière l'épaule, à peine obliques, deux un peu au delà du milieu, sur la même lignée, et une tache arrondie près du bout. Pronotum densément et rugueusement ponctué, rétréci en devant, avec une faible impression au milieu; parfois taches médianes se réunissent ensemble (ab. α). Long. 21 mm. — Espagne.

amori Graëll ⁴¹⁾.

Mém. Mapa zool., 1858, p. 114, Pl. 4, f. 6.

- 134 (129). Corps assez court. — Élytres jaunes-testacées avec trois taches rondes sur chacune, deux taches au tiers antérieur et une au-dessous du milieu. Long. 8,5 mm. — Caucase.

modesta Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 99.

⁴⁰⁾ *M. tachari* et *M. madani*, que M. Escalera regarde comme ressemblantes à *M. schreibersi* Reiche, ne me sont pas connues en nature et d'après leur description (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., IX, 1909, pp. 244—249) je n'en pus pas recevoir une représentation claire. Quant au dessin des élytres elles ressemblent à *schreibersi* et quant aux poils, qui couvrent les élytres, elles sont plus proches de *parumpicta* Heyd. On ne peut venir à une résolution ferme de cette question n'ayant pas fait connaissance avec les types de ces espèces.

En voici la corrélation de ces espèces dans le tableau de M. Escalera.

- 11—12—13. Con 4 punctos sobre cada elytro de los que el ultimo externo se une con la mancha apical, dyando una estrecha zona amarilla entre la mancha alargada asi formada y el borde del elytro.

tachari, sp. n.

- 12—11—13. Con 4 punctos negros sobre cada elytro, aislados y un estrecho reborde apical negro.

schreibersi Reiche.

- 13—11—12. Con 4 punctos negros sobre cada elytro unicamente y sin borde apical.

madani, sp. n.

⁴¹⁾ *M. amori* Graëll. est difficile à distinguer de *M. korbi* Escher. Wien. Ent. Z., 1891, p. 53). Cette dernière ne m'est pas connue en nature. J'allègue la description de cette espèce.

„*Z. korbi* Escher. — Elongata, convexiuscula, nigra obscura, nigro-hirtula; capite thoraceque dense et profunde punctatis, fronte medio rufo-punctata; antennis articulo 1° brevi, 2° minimo; 3° longo, duplo longiori articulo 4; 4°, 5°, 6° longitudine aequali, 7°, 8°, 9°, 10° paulo brevioribus, ultimo ovato, duplo longiore articulo 10; thorace latitudine paulo longiore antice angustato, basi apice duplo latiore; elytris longis rufis, dense punctato-coriaceis, apice subrotundato tenui margine, maculis 5, nigris: 2, 2. 1. — Long. 18 m. — Cuença (Castilia)“.

135 (124). Troisième article des antennes deux fois plus long que quatrième.

136 (137). Élytres jaunes-brunes, avec une seule bordure large au bout, garnies de poils jaunes, couchés. Pronotum arrondi sur les côtés, rétréci et étranglé en devant, convexe, garni de poils jaunâtres entremêlés de rares poils plus longs, dressés. Quelquefois élytres unicolores, sans poils (ab. α = *plagifrons* Reitt.)⁴²⁾. Long. 9—10 mm. — Syrie, Arménie.

inculta Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 98.

137 (136). Élytres rousses-testacées, ornées de trois taches: une longue humérale et deux un peu après le milieu de l'élytre, externe grosse, touchant au bord latéral, interne très petite, isolée. Long. 10 mm.—Syrie, Asie Min.

tauricola Mars.

L'Abeille, VII, 1870, Mon., p. 73.

138 (115). Trois derniers articles des antennes pas plus larges que les précédents. Pronotum densément ponctué-ruguleux ou ponctué-granuleux.

139 (140). 8, 9 et 10 articles des antennes deux fois plus longs que larges.—Élytres d'un rouge avec trois fascies noires, très larges: une fascie antérieure raccourcie en dehors et deux entières, l'une médiane, l'autre antéapicale. — Maroc.

mohtari Escal.⁴³⁾

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., X, 1910, p. 284.

140 (139). 8, 9, et 10 articles à peine plus long que larges.

141 (144). Pronotum convexe égal au milieu.

142 (143). 4^e article des antennes aussi long que 5^e, 5—7 de même longueur sont égaux.—La coloration claire et noire des élytres est très variable, ou bien la claire domine, ou au rebours: élytres jaunes-pâles ou rouges avec 3 fascies noires transverse plus ou moins larges que leurs intervalles, à peine sinuées ou fascie antérieure remplacée par deux taches vagues comme vestige de la dernière (ab. α = var. *rimosa* Mars.)⁴⁴⁾; élytres noires avec dessin rouge: coloration rouge humérale est nulle, ou présentant une ou quelques petites taches (ab. β); fascie médiane divisée en taches variables (ab. γ); fascie postérieure divisée en taches variables (ab. δ); fascie médiane très raccourcie en dehors ou en dedans, et quelquefois la postérieure également courte (ab. ϵ); une fascie humérale et une fascie

⁴²⁾ Pic. M., Deut. Ent. Z., VI, 1913, pp. 661—662.

⁴³⁾ *M. mo'tari* Escal. ne m'est pas connue en nature. Elle est notée dans le tableau parmi les arguments puisés de la description de cette espèce.

⁴⁴⁾ Mon. Myl., 1872, Pl. II, f. 12a.

postérieure présentes, fascie médiane oblitérée (ab. ζ); fascie postérieure présente, fascie médiane oblitérée, épaules avec ou sans petites taches rouges (ab. η); chaque élytre offrant seulement des petites taches éloignées produites par l'oblitération presque complète de toutes les fascies (ab. θ); parfois élytres largement envahies par la coloration jaune, ornées d'une rangée antémédiane de petites macules irrégulières, d'une fascie postmédiane et d'une tache sur le bout, également peu large, noires (ab. ι = var. *multinotata* Pic)⁴⁵; élytres rougeâtres, ornées d'une fascie postmédiane et de l'extrémité noires (ab. κ = var. *harterti* Pic)⁴⁶. Long. 20—30 mm. — Afrique bor.

oleae Cast.

Ins., II, 1848, p. 260, 5.

- 143 (142). 4^e article un peu plus court que le 5^e. — Corps noir, opaque. Pronotum carré, convexe, égal, brusquement rétréci. Élytres noires, ornées de fascies d'un jaune-roux, étroites, irrégulières plus ou moins sinuées, 1^{er} basale, 2^e un peu avant le milieu parfois réunie le long du bord latéral avec la première, 3^e vers le bout; ces fascies sont pour l'ordinaire décomposées chacune en 2 petites taches; quelques-unes de ces taches disparaissent même quelquefois. Long. 15—22 mm. — Syrie, Perse, Égypte, Tunis, Algérie.

tenebrosa Cast.

loc. cit., p. 270, 14.—*damascena* Mars. L'Ab., VII, 1869—70, Mon. pp. 49—50.

a (b). Corps opaque. Pronotum carré.

forme typique.

b (a). Corps peu brillant. Pronotum court et large. La pubescence dressée longue antérieurement. Élytres noires avec trois lignes en fascies d'un jaune-roux à chaque élytre. Long. 18—25 mm.—Égypte.

tenebrosa m. longipilis Pic.

Rev. sc. Bourb. Fr., 1897, p. 2.

- 144 (141). Pronotum déprimé, faiblement impressionné, étranglé et rétréci en devant, un peu rétréci également à la base.
- 145 (146). Pronotum très densément ponctué rugueux. Élytres rouges ou testacées avec une étroite bordure brune à la base, ornées de dessin noir: deux fascies sinuées ou dentelées, l'une au tiers antérieure, l'autre un peu après le milieu, et l'extrémité large;

⁴⁵) L'Ech., 1906, p. 26.

⁴⁶) Ib., 1912, p. 336, 89.

parfois intervalle postérieur de la couleur du fond tout-à-fait réduit et décomposé en deux ou trois petites taches (ab. α). Long. 18—30 mm.—Grèce, Syrie, Perse, Sennaar.

syriaca Klug.

Symb. Phys., IV, 1845, Pl. 32, f. 1. — *gebleri* Fald. Fn. Transc., II, 1837, p. 124, 376, Pl. 4, f. 9.

- 146 (145). Pronotum vaguement ponctué. Élytres jaunes-pâles avec trois fascies (antérieure, médiane et apicale) noires, qui confluent, forment six taches arrondies et anguleuses d'un jaune-pâle: deux basales, réunies en bande, deux avant le milieu et deux avant l'extrémité. Long. 26 mm.—Égypte, Nubie, Algérie.

interrupta Ol.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 93, 7.

- 147 (60). Pronotum avec petit sillon et une fossette au milieu ou sans elle, sauf *M. decempunctata* F., dans laquelle le sillon est indistinct ou disparaît tout-à-fait.
- 148 (179). Les 10^e et 11^e articles des antennes ne sont pas serrés l'un contre l'autre, le dernier est assez fort rétréci et arrondi vers la base (fig. 4).
- 149 (164). Dernier article des antennes un peu plus large que le précédent ou de même largeur.
- 150 (157). Pronotum très fortement étranglé sur les côtés avant le milieu.
- 151 (152). Pronotum très densément et assez grossièrement ponctué mat.—Élytres d'un jaune-testacé pâle ou rougeâtres, ornées de dessin noir: deux fascies larges ou étroites et l'extrémité plus ou moins large, fascie antérieure raccourcie en dehors ou en dedans et en dedans, parfois remplacée par deux petites taches rondes, fascie médiane complète, rarement raccourcie en dedans; quelquefois les fascies antérieure et médiane très élargies, peu sinuées, se réunissent par une ligne longitudinale près du bord latéral et, parfois, par la suture ou seulement près de la suture (ab. α = var. *matthesi* Fald.)⁴⁷; les fascies antérieure et médiane confondues en une large tache qui occupe toute la partie médiane de l'élytre (ab. β). Long. 19—26 mm.—Grèce, Asie Min., Caucase, Syrie, Perse, Égypte, Algérie.

cincta Ol.

loc. cit. — *jugatoria* Reiche. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 133, 8. — *tricin-gulata* Redt. Denkschr. Ac. Wien, 1850, p. 49.

- 152 (151). Pronotum assez densément ponctué, peu luisant ou assez rarement ponctué, très luisant.

⁴⁷) Fn. Transc., II, 1837, p. 120, 273.

- 153 (154). Pronotum très finement, mais non densément ponctué, ou presque imponctué. — Élytres d'un jaune-rougeâtre assez vif, avec trois fascies noires: fascie antemédiane ne touche pas le bord externe, parfois semblant être composée de deux taches réunies ensemble ou isolées; fascie médiane large, ordinairement atteignant la suture et le bord latéral, posée obliquement, rarement cette fascie se remplace par une très grande tache arrondie, atteignant la suture; fascie apicale enveloppe l'extrémité de l'élytre; quelquefois fascie apical manque, deux taches antérieures isolées (ab. α) ou taches antérieures manquent (ab. β) ou fascies antérieure et médiane confondues en une large tache qui occupe toute la partie médiane de l'élytre, sauf une petite tache de la couleur du fond au milieu (ab. γ). Long. 13—28 mm.—Turkistan, Turkménie.

cincta schrencki Geb l.

Bull. Ac. Pétersb., VIII, 1841, p. 374. — *reitteri* D o k h t. Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 157, Pl. II, f. 5.

- 154 (153). Pronotum assez grossièrement ponctué.

- 155 (156). Pronotum assez densément ponctué, peu luisant. Élytres toujours sans bordure noire au bout, d'un jaune-rougeâtre ou d'un rouge, ornées de deux taches antérieures rondes, posées transversalement ou obliquement, et deux fascies (médiane et subapicale) raccourcies en dehors et en dedans, parfois réduites à une ou deux taches. Le dessin des taches est très variable: la fascie médiane réduite à un trait et la fascie subapicale bilobée en devant (ab. α = var. *niligena* Re i c h e)⁴⁸⁾; la fascie médiane manque (ab. β); deux taches antérieures un peu obliques, rarement liées par un trait, fascies médiane et subapicale transversales larges, peu sinuées, touchant à la suture et au bord latéral (ab. γ = var. *maculata* O l.)⁴⁹⁾ = var. *maura* C h e v r.)⁵⁰⁾; tache antérieure interne réunie avec fascie médiane par une ligne longitudinale au milieu (ab. δ); fascie médiane réunie avec fascie subapicale par la suture (ab. ϵ); trois fascies larges: antérieure raccourcie en dehors, comme dans la *M. schrencki* Geb l., fascie médiane et subapicale complètes (ab. ζ = *posticalis* D o k h t. = var. *maroccana* E s c h e r.)⁵¹⁾; parfois fascies antérieure, médiane et subapicale se réunissent ensemble par deux larges taches longitudinales sur chaque élytre (ab. η); les taches antérieures et la fascie médiane confondues en une large tache noire qui occupe presque toute la première partie des élytres, tache subapicale isolée (ab.

⁴⁸⁾ Soc. Ent. Fr., 1865, p. 638, 48.

⁴⁹⁾ Ent., III, 1795, 47°, p. 7, 6, Pl. I, f. 7.

⁵⁰⁾ Silb. Rev., V, 1837, p. 273, 10.

⁵¹⁾ Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 107, Pl. II, f. 14.

♂ = var. *latifasciata* Pic⁵²); pronotum plus luisant et poils rares et courts (ab. ♀ = var. *transcaspica* Escher.)⁵³). Long. 12—27 mm. — Grèce, Russie or. et mér., Sibérie, Turkestan, Turcménie, Caucase, Perse, Asie Min., Égypte, Algérie.

calida Pall.

Icon., 1782, p. 85, Pl. E, ff. 11, 17. — *posticalis* Dokht. Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 136, Pl. II, f. 1.

156 (155). Pronotum inégalement et assez rarement ponctué très luisant. — Élytres jaunes-rougeâtres ou brunâtres avec 4 taches noires (2, 1, 1) sur chaque élytre: deux antérieures rondes ou angulaires, parfois réunies ensemble, une grande tache médiane de forme variable et une tache ronde ou ovale près du bout. Cette espèce est très variable quant au dessin et à la position des taches des élytres: taches antérieure externe et médiane manquent (ab. α); élytres avec 5 taches arrondies: deux antérieures, deux médianes et une subapicale (ab. β); comme dans l'espèce typique, mais la tache médiane élargie, formant une fascie complète, peu sinuée (ab. γ = var. *fasciculata* Escher.)⁵⁴); comme dans l'aberration précédente, seulement tache subapicale forme une fascie, qui occupe toute l'extrémité de l'élytre (ab. δ); comme la précédente, seulement fascie antérieure réunie avec fascie médiane par une tache suturale commune (ab. ε); deux taches antérieures réunies avec tache médiane par deux lignes longitudinales, tache subapicale ronde (ab. ζ); deux taches angulaires au tiers, une fascie médiane échancrée et obliquement inclinée vers le bord latéral et une large bande enveloppe l'extrémité de chaque élytre, ne laissant qu'une petite tache triangulaire jaune à l'extrémité même (ab. η = *heydeniana* Dokht.); dessin des taches comme dans l'aberration η, seulement la fascie médiane forme une large tache cordiforme, retournée, n'atteignant pas la suture (ab. θ = *heydeniana* var. a)⁵⁵); élytres d'un jaune-brunâtre ou d'un rouge brunâtre avec la suture d'un brun et trois fascies noires n'atteignant pas le bord latéral: fascie antérieure composée de 2 taches réunies ensemble, fascie médiane atteignant la suture et fascie subapicale raccourcie en dehors et en dedans, formée de 2 taches réunies ensemble (ab. ι = *excisofasciata* Heyd.); comme l'aberration ι, seulement les fascies antérieure et subapicale remplacées chacune par deux taches arrondies (ab. κ = *excisofasciata* var. a)⁵⁶); fascie antérieure divisée en 2 taches séparées, les taches suturales de chaque élytre sont réunies

⁵²) L'Ech., 1896, p. 62.

⁵³) Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 107.

⁵⁴) Ib., p. 108. — var. *aschabadensis* Voig., n. n. Wien. Ent. Z., XXI, p. 178.

⁵⁵) Dokhtourov. Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 146, Pl. II, f. 24

⁵⁶) loc. cit., p. 148.

en une seule tache subcordiforme, prolongée par la suture jusqu'à l'écusson, fascie médiane très fine et raccourcie, fascie subapicale en forme de tache oblique (ab. λ = *excisofasciata* var. a) ⁵⁷⁾; fascie antérieure large, prolongée jusqu'à la suture, fascie médiane réunie avec la fascie subapicale par une tache assez fine (ab. μ = *excisofasciata* var. b) ⁵⁸⁾; deux taches antérieures allongées, une grande tache médiane arrondie, rétrécie près du bord latéral et atteignant la suture et une tache subapicale arrondie, à peine échancrée (ab. ν = *excisofasciata* var. c) ⁵⁹⁾; les fascies antérieure et médiane réunies ensemble près de la suture par une large tache enveloppant cette dernière, fascie postérieure très large occupant presque toute l'extrémité et réunie avec la médiane par une ou plusieurs lignes (ab. ξ = *excisofasciata* var. d) ⁶⁰⁾; les fascies médiane et postérieure confondues en une large tache, qui occupe toute la moitié postérieure de l'élytre et n'est séparée de la suture que par une fine bordure d'une rouge-brunâtre (ab. π = *excisofasciata* var. e) ⁶¹⁾; les élytres noires avec 6 taches (1, 2, 2, 1) d'un rouge-brunâtre ou rougeâtre: une tache enveloppe l'angle huméral, deux sont partagées par une fine ligne noire oblique, deux sont parfois réunies en fascie et une tache antéapicale est petite (ab. ρ = *excisofasciata* var. *oschensis* Heyd.) ⁶²⁾. Long. 11—17 mm.—Turkestan, Turcménie, Kouldja.

magnoguttata Heyd.

Deut. Ent. Z., 1881, p. 329 —*excisofasciata* Heyd. loc. cit., 1883, p. 67. — *heydeniana* D o k h t. Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 145, Pl. II, f. 23. — *margarithae* R e i t t. Verh. Nat. Ver. Brünn, 1889, p. 120.

- 157 (150). Pronotum un peu étranglé en avant.
 158 (163). Dernier article un peu plus large que le précédent.
 159 (162). Dernier article plus allongé, terminé en pointe, plus ou moins aiguë.
 160 (161). Pronotum plus ou moins densément ponctué, avec une fovéole au milieu, parfois indistinctement sillonée. Élytres jaunes-roussâtres ou rougeâtres, ornées de cinq taches (2, 2, 1) noires, arrondies sur chaque élytre; parfois tache médiane externe est liée d'une partie avec tache antérieure externe et de l'autre avec la voisine (ab. α) ou tache médiane externe manque (ab. β = var. *deficiens* Fuen.) ⁶³⁾. Long. 8—18 mm.—Europe mér., Ross. mér. et or., Sibérie, Turkestan, Caucase.

decempunctata F.

Spec. Ins., I, 1781, pp. 331—5.

⁵⁷⁾ loc. cit., p. 149.

⁵⁸⁾ loc. cit.,

⁵⁹⁾ loc. cit.

⁶⁰⁾ loc. cit.

⁶¹⁾ loc. cit.

⁶²⁾ loc. cit.

⁶³⁾ Bol. Esp. Hist. Nat., X, 1910, p. 445.

a (d). Pronotum densement et assez également ponctué.

b (c). Pronotum très densement ponctué, mat.

forme typique.

c (b). Pronotum assez densement ponctué, luisant, plus ou moins distinctement sillonné au milieu. Élytres jaunes roussâtres, ornées de six taches (2, 2, 2) noires, arrondies; ces tache varient de nombre: deux taches médianes réunies ensemble (ab. α); tache médiane interne manquante (ab. β); deux taches antéapicales remplacées par une petite tache près de la suture (ab. γ) et enfin élytres sans taches (ab. δ = var. *brunnea* Escher.)⁶³). Long. 8—14 mm. — Hongrie, Turquie, Grèce, Asie Min., Syrie, Caucase, Turkestan, Sibérie, Russie mér. et or.

decempunctata m. crocata Pall.

Icon., 1782, p. 87, Pl. E, f. 13. (*M. crocata*).

d (a). Pronotum plus rarement, inégalement et non profondément ponctué⁶⁴).

decempunctata m. incertepunctata, m. n.

161 (160). Pronotum presque lisse, très luisant, rétréci coniquement en avant, creusé au milieu d'une faible impression, garni de points noirs, rares. — Élytres d'un jaune-rugeâtre, ornées cinq taches noires, placées 2, 2, 1; parfois deux taches médianes se réunissent ensemble, formant une fascie transversale, cette dernière se réunit avec tache humérale par une ligne, assez fine (ab. α). Long. 8 mm. — Caucase, Perse.

decempunctata signata (Fald.) Mars.⁶⁵

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., p. 129.

162 (159). Dernier article des antennes plus court, plus large, en point arrondi. — Élytres d'un testacé-flave, ornées de deux taches antérieures, d'une fascie ondulée au milieu et de deux taches subapicales; parfois ces dernières réunies ensemble, forment une fascie raccourcie près de la suture (ab. α), ou les fascies médiane et subapicale réunies ensemble près du bord latéral par une large tache longitudinale (ab. β), ou deux taches subapicales manquent (ab. γ). Long. 8—17 mm. — Sibérie, Russie mér., Mongolie, Mandjourie, Caucase.

aulica Mén.

Cat., 1832, p. 208, 924.

⁶⁴) On trouve des individus qu'il est très difficile à distinguer quant à la marque indiquée de l'espèce typique.

⁶⁵) Il me semble que *M. signata* (Fald.) Mars. n'est autre chause que *M. mimosae* Ol. (Enc. méth., VIII, 1811, pp. 99, 45) qui m'est inconnue en nature

- 163 (158). Dernier article de même largeur que le précédent.—Pronotum convexe, égal, assez densément ponctué, fortement rétréci et élargi en devant, marqué le long du milieu d'une fine strie. Élytres d'un jaune-testacé avec une large fascie au milieu, peu sinuée, complète, et une légère bordure apicale, noires; parfois encore avec un très petit point au $\frac{1}{3}$ antérieur plus près de la suture que du bord latéral. Long. 10—20 mm.—Turkestan, Turkménie, Perse.

javeti Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., p. 63.

- 164 (149). Dernier article un peu moins large que le précédent.
165 (166). Base des élytres rembrunie. — Pronotum comme dans la *M. magnoguttata* Heyd. Élytres d'un jaune-rougeâtre avec une large tache triangulaire des deux côtés de la suture, qui est élargie à la suture, cette tache se réunit avec la tache noire entourant l'écusson; fascie médiane est largement transversale, presque droite, la fascie apicale enveloppe toute l'extrémité de l'élytre; quelquefois la tache triangulaire divisée en 2 taches (externe très petite) ou ces dernières remplacées par deux taches arrondies, parfois réunies ensemble. Long. 8—17 mm. — Turkménie, Perse.

triangulifera Heyd.

Deut. Ent. Z., 1883, p. 359.

- 166 (165). Base des élytres non rembrunie.
167 (168). Élytres avec deux petites taches rondes au $\frac{1}{3}$ antérieur.
168 (167). Élytres avec une fascie large au milieu.
169 (174). Extrémité des élytres avec liséré étroit.
170 (173). Dernier article long, atténué, cili-gère.
171 (172). Pronotum assez égal et convexe sur le dos, avec une carène lisse interrompue au milieu par une courte coulisse, densément ponctué. — Élytres larges, convexes, d'un jaune-testacé, ornées de 2 petites taches rondes au $\frac{1}{3}$ antérieur, d'une large fascie médiane, touchant à la suture, et d'une fascie au bout, noires. Long. 12—22 mm.—Perse.

colligata Redt.

Denkschr. Acad. Wien, 1850, p. 49, 22.

- 172 (171). Pronotum finement canaliculé au milieu, peu convexe.—Élytres d'un jaune-roux, luisantes avec 2 taches rondes antérieures, une fascie médiane, ne touchant pas à la suture, et une fascie au bout échancrée, noires. Long. 16 mm.—Perse, Syrie.

bimaculata Klug.⁶⁶⁾

Symb. Phys., IV, 1845, p. 32, 2.

⁶⁶⁾ Cette espèce me semble douteuse.

- 173 (170). Dernier article plus court, en pointe obtuse sans cils.—Pronotum avec 3 petites impressions sur la même ligne au milieu. Élytres d'un jaune-testacé avec deux taches antérieures, une fascie au milieu, complète, peu sinuée, et une étroite bordure apicale avec crochet, noires. Long. 16 mm.—Perse.

cingulata F a l d.

Faun. Transcauc., II, 1857, p. 122, 374, Pl. 4, f. 10.

- 174 (169). Extrémité des élytres avec la fascie large comme dans *M. cincta* O l. Dernier article petit, très aigu. Pronotum oblong, vaguement ponctué, caréné dans son milieu, étranglé et rétréci en devant. Élytres d'un jaune-testacé avec le dessin noir: deux petites taches rondes liées au tiers, une fascie sinuée au milieu et l'extrémité large. Long. 15 mm.—Perse mér., Égypte super.

husseini R e d t.

Denkschr. Ac. Wien, 1849, p. 49, 23.

- 175 (178). Élytres avec les taches au milieu, parfois liées.

- 176 (177). Extrémité des élytres noire, large. Dernier article menu, arqué, obtus au bout.—Pronotum oblong, un peu étranglé et rétréci en devant, légèrement convexe sur le dos, longé dans son milieu d'une ligne lisse, élevée et flanquée de reliefs entre les bosses. Élytres d'un jaune-testacé rugeâtre, ornées de dessin noir: 2 taches petites antérieures, deux taches au milieu, parfois liées en fascie étroite, et fascie apicale. Long. 9—14 mm.—Égypte.

apicipennis R e i c h e.

Soc. Ent. France, 1865, p. 635, 17.

- 177 (176). Extrémité des élytres avec liséré très étroit ou une très petite tache, placée à de l'extrémité même, noires. Dernier article petit, en alène.—Pronotum densément ponctué, presque sans impression, sans étranglement, avec une étroite ligne médiane lisse et petit sillon court. Élytres d'un jaune-testacé rougeâtre, mat, ornées de taches noires: 2 antérieures, placées obliquement, 1^{er} large bilobée au milieu et, ordinairement, un mince rebord au bord apical; parfois tache bilobée médiane remplacée par une grosse tache ovale angulaire, et liséré étroit remplacé par une très petite tache près de l'extrémité même (ab. α = *ledereri* M a r s.)⁶⁷⁾ ou petite tache apicale remplacée par une assez grosse tache échancrée angulairement (ab. β = *ledereri* var. *onerata* E s c h e r.)⁶⁸⁾. Long. 11—16 mm.—Caucase, Syrie, Asie Min., Perse.

sexmaculata O l.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 98, 36.

⁶⁷⁾ L'Ab., VII, 1870, Mon., pp. 57—58.

⁶⁸⁾ Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 109, Pl. II, f. 20.

- 178 (175). Élytres avec une tache oblongue, commune, sur la suture. — Pronotum criblé-ponctué, faiblement convexe, avec une rangée transversale de tubercules lisses entre les bosses latérales. Élytres d'un roux-testacé obscur, avec une bordure étroite à la base, une longue tache suturale commune derrière l'écusson, une large fascie au milieu, complète, sinuée, et fascie assez large au bout, noires. Long. 19 mm.—Égypte.

filicornis M a r s.

L'Ab., VII, 1870, Mon., p. 64.

- 179 (148). Les 10^e et 11^e articles des antennes sont serrés ensemble, le dernier est assez droitement rétréci vers la base (fig. 5).
- 180 (181). Pronotum beaucoup plus large que long, peu rétréci en devant, peu convexe, marqué de sillon au milieu. — Élytres larges, d'un noir avec une grosse tache apicale rouge, au centre de laquelle on voit une tache ovale noire qui se réduit quelquefois à un ou deux petits points (forme typique). La coloration des élytres varie dans les limites extrêmes depuis le noir pur uniforme jusqu'au rouge presque immaculé: élytres noires jusqu'au $\frac{1}{3}$ postérieur avec 3 ou 4 taches irrégulières d'un rouge, de reste comme dans la forme typique (ab. α = var. *contexta* Chev r.)⁶⁹; élytres rouges, deux taches antérieures rondes et moitié postérieure de chaque élytre noires (ab. β = var. *semirufa* M a r s.)⁷⁰; élytres rouges, deux taches antérieures très petites, parfois à peine visibles, une tache oblongue sur la suture, parfois manque, une tache subapicale et bordures basale et apicale noires (ab. γ = *superflua* M a r s.)⁷¹ élytres noires, sauf les bords (latéral, apical et sutural), rouges (ab. δ) ou élytres noires avec petite tache rouge à l'extrémité (ab. ε = var. *apicalis* Chev r.)⁷² et, enfin, cette tache apicale disparaît complètement (ab. ζ = var. *nigra* M a r s.)⁷³. Long. 15 mm.—Algérie.

praeusta F.

Ent. Syst., I, II, 1793, p. 88, 3.

- 181 (180). Pronotum à peine plus large que long ou égal.
- 182 (213). 3^e article un peu plus long que le suivant.
- 183 (190). Pronotum garni de poils noirs.
- 184 (187). Élytres sans bordure à l'extrémité, ou très finement bordées à la base et au bord apical de brun, ou l'extrémité à peine rembrunie.

⁶⁹) Silb. Rev., V, 1837, p. 278, 23.

⁷⁰) loc. cit.

⁷¹) loc. cit.

⁷²) loc. cit., p. 278, 22.

⁷³) loc. cit.

- 185 (186). Élytres d'un jaune-testacé pâle avec le dessin noir: trois taches antérieures, 2 petites taches rapprochées sous la bosse humérale et une suturale plus grosse, formant avec celle du côté opposé une tache commune; une fascie au milieu, sinuée, raccourcie vers la suture, une fascie postmédiane, atteignant la suture, mais ordinairement interrompue et formée de deux taches, et bordure apicale brune, à peine visible. Long. 8—12 mm.—Algérie.

curta Chev. r. ⁷⁴⁾

Silb. Rev., V, 1837, p. 277, 10.

- 186 (185). Élytres d'un testacé avec le dessin noir: deux taches antérieures, disposées obliquement, une fascie médiane, sinuée, éloignée de la suture et une fascie antéapicale, parfois interrompue. Long. 9 mm.—Algérie.

insignipennis Pic.

Bull. Soc. Zool. Fr., 1901, p. 77.

- 187 (184). Élytres avec bordure noire à l'extrémité.

- 188 (189). Élytres d'un jaune-testacé pâle ou d'un testacé-roussâtre avec le dessin noir, qui varie beaucoup de grosseur et de forme: la bordure basale, qui se continue autour de l'écusson; trois fascies dentellées: la première au tiers, composée de deux taches réunies ensemble, l'externe remontant sur l'épaule jusqu'à la base, l'interne commune sur la suture, prolongée par la dernière jusqu'à l'écusson, parfois cette fascie est interrompue; la deuxième au milieu, profondément dentelée, parfois se communique avec les fascies antérieure et postérieure près du bord latéral; la troisième près du bout et l'extrémité de l'élytre rebordée d'une ligne (parfois assez large) qui se réunit avec la fascie postérieure (forme typique); trois fascies noires élargies, quelquefois plus larges que les intervalles, de la sorte que les élytres peuvent être aussi bien considérées comme noires avec le dessin d'un jaune: une petite tache ronde à la base, deux fascies (l'une au-dessus du milieu, l'autre au-dessous du milieu), dont l'antérieure parfois interrompue ou raccourcie en dehors ou remplacée par une tache arrondie; rarement fascie postmédiane réunie avec tache ovale par une ligne longitudinale (ab. α = var. *spartii* Germ.) ⁷⁵⁾; les fascies médiane et postérieure sont quelquefois interrompues, la première est alors décomposée en trois taches ou cette fascie remplacée par plusieurs traits longitudinaux, fascie antérieure

⁷⁴⁾ *Z. curta* var. *ernesti* Pic (Rev. sc. Bourb., 1905, p. 170) ne m'est pas connue ni en nature, ni en description.

⁷⁵⁾ Reise Dalm., 1817, p. 210, Pl. 10, f. 14.

interrompue au milieu ou confluee avec la bordure basale, sauf une petite tache jaune (ab. β = var. *quadrifaria* Mars.)⁷⁶); le dessin noir se rétrécit, la fascie antérieure remonte encore jusqu'à la base le long de la suture et sur l'épaule, mais laisse voir une bande marginale jaune (ab. γ); la fascie antérieure comme dans la forme typique, fascie médiane manque, fascie postérieure vague et très raccourcie en dedans (ab. δ); fascies médiane et postérieure très étroites, sinuées (ab. ϵ), ou élytres noires avec le dessin d'un jaune, mais sans tache ovale près du bout, ou élytres tout-à-fait noires. Long. 9—16 mm. — Europe mér., Russie mér. et or., Sibérie, Turcménie, Caucase, Asie Min., Algérie.

polymorpha Pall.⁷⁷)

Iter, I, 1773, p. 465, 44.

a(d). Fascie antérieure noire, se réunissant avec étroite bordure apicale, forme une tache ovale de la coloration fondamentale.

b(c). Longueur 9—16 mm.

forme typique.

c(b). Longueur 8—9 mm.—Élytres noires avec le dessin jaunepâle, qui varie: deux taches à la base (l'une petite près du bord latéral, parfois manque, l'autre triangulaire entre la bosse humérale et l'écusson), deux fascies étroites, antémédiane sinueuse, raccourcie en dehors et en dedans, parfois interrompue en dehors ou réunie avec tache antérieure interne, postmédiane dentelée et tache ovale près du bord apical ou fascie antémédiane manque (ab. α), ou taches antérieures et fascie antémédiane manquent (ab. β), ou élytres jaunes-pâles avec le dessin noir comme dans l'ab. β de forme typique. — Russie mér. et or., Sibérie, Turkestan.

polymorpha m. atrata Pall.

Iter, II, 1776, p. 722, 55.

d(a). Élytres noires avec le dessin d'un jaune, mais sans tache ovale près du bord apical ou élytres tout-à-fait noires.

e(f). Long. 12—16 mm. Élytres noires avec le dessin jaunepâle: une tache près de l'écusson et une fascie transversale près du bout, n'atteignant ni le bord latéral, ni la suture, ou deux taches (l'une près de l'écusson et l'autre

⁷⁶) L'Ab., VII, 1869—70, Mon., p. 79.

⁷⁷) Pallas a décrit cette espèce sous le nom de *Attelabus polymorphus* qu'il a remplacé dans ses Icones insectorum (1782, p. 82) par un autre: *Meloë floralis*. Je reconstruis le premier nom comme plus caractéristique pour cette espèce.

un peu au-dessus du milieu) et une fascie antéapicale (ab. α = *pullata* var. *sexmaculata* D o k h t.) ⁷⁸⁾ ou seulement une fascie antéapicale (ab. β = *pullata* var. *fasciculata* D o k h t.) ⁷⁹⁾.—Turkestan, Boukharie or.

polymorpha m. biguttata Geb l.

Bull. Ac. Pétersb., 1841, p. 374.—*pullata* H e y d. Deut. Ent. Z. 1883, p. 65.

f (e). Long. 8—11 mm. Élytres noires ou avec une ou deux taches jaunes-testacées au-dessous du milieu qui parfois forment une fascie.—Boukharie or.

polymorpha m. karateginensis, m. n.

189 (188). Élytres d'un testacé-roux-brunâtre, ornées de dessin noir: bordure basale qui se continue autour de l'écusson en forme de triangle, deux taches antérieures (l'une humérale, remontant sur l'épaule jusqu'à la base et l'autre petite, arrondie, toujours isolée), deux taches allongées ovalaires un peu au-dessous du milieu de l'élytre, ordinairement formant une fascie vers la suture, une fascie transversale près du bout de l'élytre, contiguë à la marge, et enfin une étroite bordure apicale. Long. 12—16 mm.—Russie or., Sibérie, Turkestan.

solonica P a l l. ⁸⁰⁾

Icon., 1782, p. 87, Pl. E, f. 12.

- 190 (183). Pronotum avec une courte pubescence grisâtre, entremêlée de plus longs poils noirs ou brun, dressés ⁸¹⁾.
- 191 (204). Extrémité des élytres avec liséré d'un noir.
- 192 (203). Les 10—11 articles des antennes sont serrés l'un contre l'autre, mais la ligne de leur séparation est facile à distinguer.
- 193 (200). Pronotum finement et inégalement pointillé. Élytres plus allongées, ornées de fins poils couchés.
- 194 (199). Pronotum garni densément de poils très longs. Élytres très-allongées, très-rétrécies en devant.
- 195 (198). Élytres d'un jaune-testacé grisâtre avec les taches noires, peu variables.
- 196 (197). Articles des antennes noirs. Le dessin noir des élytres forme: une tache humérale, longue, remontant jusqu'à la base qu'elle borde, en formant une tache triangulaire derrière l'écus-

⁷⁸⁾ Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 141, Pl. II, f. 48. — var. *similis* V o i g., n. n. Wien. Ent. Z., XXI, p. 178.

⁷⁹⁾ loc. cit., f. 57.

⁸⁰⁾ L'espece est très douteuse. On peut éclaircir cette question ayant un matériel immense, que malheureusement je ne possède pas. *M. humerosa* Escher. est très proche de cette espèce et ne se distingue de lui que par les poils plus ou moins mêlés sur le corps.

⁸¹⁾ Excepté *M. hirtipenis* F a i r m., dont le pronotum est garni de poils noirs (voir p. 43).

son, une tache suturale, ovale, un peu postérieure, deux taches médianes, deux antéapicales, souvent avec une toute petite entre les deux, et une étroite bordure au bout; quelquefois tache antéro-suturale manque (ab. α) ou deux taches médianes manquent (ab. β) ou les deux rangées de taches antérieures se sont dilatées au point de manière que l'élytre est noire jusqu'aux deux tiers avec un liséré marginal et une tache longitudinale au milieu de la couleur du fond (ab. γ). Long. 9—13 mm. — Russie mér. et or., Sibérie, Turkestan, Caucase.

quatuordecimpunctata P a l l.

Icon., 1782, p. 80, Pl. E, f. 6.

- 197 (196). Articles des antennes intermédiaires bruns avec la base ferrugineuse. Élytres deux fois et demie plus longues que larges, d'un jaune-testacé pâle, ornées de dessin noir comme dans l'espèce typique, sauf ab. α et γ . Long. 15 mm. — Espagne.

quatuordecimpunctata dufouri G r a ë l l.

An. Soc. Ent. Fr., 1851, p. 16.

- 198 (195) Élytres d'un jaune-brun rougeâtre avec le dessin noir qui varie beaucoup: une tache humérale, allongée réunie par une fine ligne à la base de l'élytre avec la tache triangulaire, entourant l'écusson, une tache ronde près de la suture, parfois manque, une fascie médiane complète ou n'atteignant pas le bord latéral et la suture, et une fascie postmédiane qui se réunit avec la bordure apicale, formant une tache plus ou moins ovale de la coloration fondamentale (forme typique); tache antéro-suturale conflue avec la fascie médiane (ab. α = var. *mediojuncta* P i c)⁸²; fascie médiane divisée en 2 taches séparées, interne isolée (ab. β = var. *mediopunctata* P i c)⁸³ fascie médiane se réunit avec la fascie antéapicale par une ligne au bord latéral et par une tache commune à la suture (ab. γ); fascie postmédiane divisée en trois taches isolées (ab. δ = var. *subinterrupta* P i c)⁸⁴; fascie médiane se réunit par une ligne avec la tache humérale et avec la fascie postmédiane (ab. ε = var. *ataensis* P i c)⁸⁵; les fascis médiane et postmédiane confondues en une large tache qui occupe toute la moitié postérieure de l'élytre (ab. ζ = var. *diabolica* E s c h e r.)⁸⁶. Long. 12—17 mm. — Turkestan.

quatuordecimpunctata khodjentina B a l l.

Bull. Mosc., 1878, p. 337.

⁸²) Bull. Soc. Zool. Fr., 1901, p. 78.

⁸³) loc. cit.

⁸⁴) loc. cit.

⁸⁵) Bull. Soc. Zool. Fr., 1901, p. 111.

⁸⁶) Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 108, Pl. II, f. 15.

- 199 (194). Pronotum garni de poils assez courts. — Élytres d'un testacé peu brun avec le dessin noir qui est très variable: deux taches au tiers antérieur, externe allongée, remontant sur l'épaule jusqu'à la marge basale qu'elle suit jusqu'à la suture derrière l'écusson (parfois cette tache se remplace par une tache ronde), interne ronde; deux taches au milieu, obliques; une tache antéapicale transversale, ordinairement composée de deux taches accolées, et une bordure apicale, parfois bordures basale et apicale disparaissent (forme typique); deux taches médianes forment une fascie (ab. α)⁸⁷⁾; fascie médiane se réunit avec la tache antéapicale (ab. β)⁸⁸⁾; une ou deux taches médianes manquent, parfois tache humérale interrompue (ab. γ); taches antéro-interne et médianes manquent (ab. δ); toutes les taches disparaissent, sauf une tache antéro-interne (ab. ϵ) ou sauf une tache antéapicale (ab. η); enfin, élytres sans dessin noir (ab. ϑ = var. *galatiensis* Escher.)⁸⁹⁾. Long. 10—14 mm. — Caucase, Asie Min., Syrie, Perse.

fusca Ol.⁹⁰⁾

Ent. méth., VIII, 1811, p. 100, 49.

- 200 (193). Pronotum assez densément et fortement ponctué. Élytres plus courtes, ornées de cils noirs presque couchés.
- 201 (202) Élytres d'un jaune-pâle, ornées du dessin noir, qui forment: bordure basale, entourant l'écusson, trois taches au tiers antérieur (deux externes, l'une sur le calus huméral, l'autre au-dessous de l'épaule, et une interne près de la suture; parfois taches externes se réunissent ensemble, formant une tache allongée et rejoignant la base), une fascie médiane complète ou n'atteignant ni la suture, ni le bord latéral, une fascie antéapicale, échancrée près de la suture, prolongée par cette

⁸⁷⁾ Sumakov. Rev. Russe d'Ent., XIII. 1913, p. 307, f. 14.

⁸⁸⁾ loc. cit., fig. 15.

⁸⁹⁾ Stettin. Ent. Z., 1897, p. 39.

⁹⁰⁾ *M. posticata* Fairm. (An. En. Bel., XXXV, 1892, p. 154). — Sat elongata, valde convexa, nigra, nigro et griseo villosa, parum nitida, elytris testaceis, basi et apice angustissime nigris, puncto aut vitta brevi humerali, puncto discoïdali ante medium, macula aut puncto submarginali post medium et macula ante apicem transversa, interdum per suturam cum margine apicali coerulente nigris: capite convexo, sat subtiliter sat dense punctato, fronte medio interdum anguste elevata et nitidula; antennis brevioribus, basin prothoracis haud attigentibus, clavatis, articulo 3^o paulo longiore, ultimo pyriformi; prothorace transverso subquadrato, margine postico cum angulis sat rotundato, dorso sat subtiliter sat dense ruguloso-punctato, basi interdum medio vage impresso; elytris postice vix ampliabilis, dense punctato-rugosulis, haud nervosis, subtus nigro villosa, cum pedibus subtiliter punctato rugosula. — Syria.

Cette espèce, qui m'est inconnue, M. Escherich regarde comme variété de *M. fusca* Ol.

dernière et le bord latéral en une fine ligne rebordant toute l'extrémité et formant au milieu une tache ovale jaune; quelquefois tache antéro-interne manque, fascie médiane remplacée par deux petites taches rondes et fascie antéapicale très raccourcie en dedans (ab. α)⁹¹); les fascies médiane et antéapicale réunies ensemble près du bord latéral par une ligne ou par une tache large le long du bord latéral (ab. β)⁹²); enfin, tache humérale, fascie médiane et antéapicale réunies ensemble par une ligne longitudinale, tache suturale réunie avec cette dernière par une ligne transversale (ab. γ = var. *auliensis* Pic)⁹³). — Turkestan, Caucase, Syrie, Perse, Asie Min.

scabiosae O l.

loc. cit., p. 99. 45.

a (b). Corps vêtu d'une courte pubescence grise, entremêlée de fins poils noirs. Élytres à peine plus larges que le pronotum à la base, élargies par derrière. Long. 9—11 mm.
forme typique.

b (a). Corps hérissé de fins poils noirs avec une pubescence grise, couchée. Élytres plus larges à la base, plus parallèles, avec le dessin noir comme dans l'espèce typique; quelquefois élytres noires avec le dessin d'un jaune-pâle: une tache humérale, une subcordiforme assez large près de l'écusson, un point très petit au-dessus du milieu de l'élytre, une fascie postmédiane et, enfin, une tache ovale (ab. α = *maracandensis* D o k h t.)⁹⁴). Long. 11—13 mm. — Turkestan, Caucase, Perse, Babylone.

scabiosae m. euphratica M a r s.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon. p. 84. — *marseuli* B a l l. Bull. Mosc., 1878.—? *zebraea* M a r s. l'Ab., VII, 1869—70, Mon., p. 79.

202 (201). Élytres d'un rouge-testacé, mat, pointillées-granulées, avec de petit cils noirs, couchés, ornées de dessin noir qui forment: deux bordures, l'une scutellaire, l'autre apicale, élargie à l'angle, trois taches rondes, l'une très petite sur le calus huméral, les deux autres arrondies au-dessous de celui-ci, deux taches irrégulières au milieu, souvent liées en fascie par une ligne très courte, et une fascie postmédiane, décomposée en deux taches; quelquefois le dessin noir forment: une étroite bordure apicale et 5 points ou taches sur chaque élytre ainsi disposés: un point huméral, deux points posthuméraux en

⁹¹) S u m a k o v. Rev. Russe d'Ent., XIII, 1913, p. 305, f. 3

⁹²) loc. cit., ff. 4 et 5.

⁹³) Bull. Soc. Zool. Fr., 1901, p. 111.

⁹⁴) Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 165.

ligne, un point médiane interne et une tache postérieure, placée très près de l'extrémité et sur le bord externe (ab. *sai-densis* Pic)⁹⁵. Long. 9—12 mm. — Algérie. ✓

silbermanni Chevrl.

Silb. Rev., V, 1837, p. 277, 19.

- 203 (192). Les 10—11 articles des antennes paraissant comme soudés, la ligne de leur séparation est indistincte. — Dessous du corps et pronotum couverts d'une pubescence grise soyeuse, mêlée de poils noirs-dressés. Élytres d'un rouge-brunâtre, ornées de dessin noir.

diversipilis, sp. n.

- 204 (191). Extrémité des élytres sans liséré noir. Élytres avec taches noires plus ou moins rondes.

- 205 (206). Antennes allongées, linéaires, à peine épaisses. — Élytres d'un roux-testacé, ornées de six taches, disposées un peu obliquement: deux au tiers, deux au milieu et deux près du bout; les taches antérieures parfois liées (ab. *oranensis* Pic)⁹⁶. Long. 14—18 mm. — Portugal, Algérie.

impressa Chevrl.⁹⁷

Silb. Rev., V, 1837, p. 275, 14.

- 206 (205). Antennes plus courtes, élargies au bout.

- 207 (212). Pronotum vêtu d'une courte pubescence grise, entremêlée de poils noirs ou bruns, dressés.

- 208 (209). Pronotum vêtu d'une pubescence grisâtre, couchée, surmontée de poils bruns légèrement redressés. — Élytres testacées, ornées de poils obscurs, mi-dressés, avec trois taches foncées sur chaque élytre: une sur l'épaule et deux près de l'extrémité, disposées presque en ligne. Long. 12 mm. — Sicile.

ragusae Pic.

Natural. Sic., 1898, p. 217.

- 209 (208). Pronotum couvert d'une pubescence grise, couchée, entremêlée de poils noirs, dressés.

⁹⁵ Rev. Bourb. Fr., VII, 1897.

⁹⁶ L'Ech., 1909, pp. 300, 185.

⁹⁷ Il me semble que *M. stillata* Baudi (Deut. Ent. Z., 1878, p. 375), que M. E. Reitter regarde comme variété de *M. impressa* Chevrl. (Cat. Col. Eur., p. 447), ressemble beaucoup à cette espèce. Je ne puis pas juger si M. Reitter a raison, car *stillata* m'est inconnue en nature. — Corpore brevior latioreque praesertium insignis, statura mediocri, thorace relative brevior, dorso magis inaequali, elytris minus nitidis, subopacis, subtilis punctulatis ac rugosis, serierum punctis minutis, in media nullis, anterioribus modo interno deficiente, posterioris modo externo nullo.

- 210 (211). Pronotum un peu plus large que long. — Élytres d'un roux-testacé, ornées ordinairement de six taches arrondies, inégales, disposées: 2, 2, 2; quelquefois une tache médiane (externe ou interne) manque (ab. α) ou deux taches postérieures confluent, formant une tache transversale (ab. β = var. *massiliensis* Pic⁹⁸) = var. *fasciata* Fuen.⁹⁹). Long. 18—12 mm. — Europe mér. (Espagne, France, Italie), Algérie.

duodecimpunctata O l.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 98, 40.

- 211 (210). Pronotum beaucoup plus large que long. — Élytres d'un roux-testacé, ornées de six taches rondes ou ovales, disposées: 2, 2, 2; parfois deux taches antérieures réunies (ab. α = var. *beauprei* Pic)¹⁰⁰). Long. 12 mm. — Algérie.

brevicollis B a u d i.

Deut. Ent. Z., 1878, p. 373.

- 212 (207). Pronotum garni de poils noirs, dressés, densément ponctué-rugueux. — Élytres d'un roux-testacé, avec six taches rondes, disposées: 2, 2, 2; quelquefois tache postérieure interne manque (ab. α). Long. 9—16 mm. — Maroc.

hirtipennis F a i r m.

Rev. Zool. Deyr., 1873, p. 379.

- 213 (182). 3^e article des antennes deux fois plus long que 4^e; antennes relativement courtes, 8—11 articles forment une massue très forte, les autres articles sont égaux entre eux. — Pronotum garni de poils noirs. Élytres d'un jaune-testacé, ornées de six taches arrondies, disposées: 2, 2, 2; quelquefois deux taches antérieures réunies ensemble (ab. α = var. *oasium* Ch o b.) ou deux taches médianes réunies (ab. β = var. *mayeti* Ch o b.) ou enfin taches externes (médiane et antéapicale) réunies ensemble (ab. γ = var. *vareillesi* Ch o b.). Long. 5,5—8,5 mm. — Sahara, Algérie, Tunis mér.

saharica Ch o b.

Bull. Soc. Ent. Fr., 1901, p. 280.

- 214 (57). Antennes rougeâtres ou roussâtres.

- 215 (216). 3—11 articles d'un roux-brun, 3—6 rembrunis au bout. — Élytres d'un jaune-pâle, ornées de dessin noir: deux taches antérieures ovales, externe sur le calus, interne plus petite moins près de la base; deux fascies, l'une un peu au-dessous du milieu, fortement en zigzag, joignant les bords sutural et

⁹⁸) L'Ech., 1902, p. 9.

⁹⁹) Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., X, 1910, p. 414.

¹⁰⁰) L'Ech., 1909, p. 300, 185.

latéral, l'autre antéapicale, n'atteignant pas la marge externe, échancrée en devant, et liséré apical enfumé; quelquefois fascie médiane interrompue près de la suture et fascie antéapicale décomposée de quatre taches (ab. α = var. *lividiana* Pic)¹⁰¹). — Chypre.

madoni Mars.

L'Ab., XXI, 1883. Nouv. et faits, p. 178.

216 (215). 3—11 articles d'un roux.

217 (218). Corps allongé convexe, garni de poils noirs.—Élytres d'un roux-testacé, ornées de cinq taches arrondies: deux au tiers, deux au milieu, disposées un peu obliquement, et une près du bout. Long. 12 mm. — Espagne.

lichtensteini Gorr.

Mon. Col. Mél., 1882, p. 124.

218 (217). Corps large, peu convexe, garni de poils noirs.—Élytres d'un rouge, ornées de taches et de fascies noires: deux taches au tiers, l'une humérale, longue, l'autre double, placée sur la suture et réunie avec l'écusson par une ligne bordant la suture, et deux fascies complètes, en zigzag, l'une médiane et l'autre antéapicale; parfois cette dernière interrompue. Long. 13 mm. — Égypte.

aegyptiaca Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., pp. 142—143.

219 (56). Pattes rouges.

220 (227). Antennes rouges.

221 (224). Palpes noirs.

222 (223). Pronotum beaucoup plus large que long. — Élytres d'un jaune-testacé, ornées de dessin noir qui forment: une petite tache humérale, deux taches au tiers antérieurs de l'élytre, dont l'externe plus éloignée de la base que l'interne, deux fascies sinueuses, l'une après le milieu, l'autre près du bout, unie à la marge de chaque côté, et un liséré apical, extrêmement étroit. Pattes d'un roux-testacé plus sombres avec les tarses noirs. Long. 8 mm. — Maroc, Tunis.

ruficornis F.¹⁰²

Ent. Syst., Supp., 1798, p. 121, 10—11.

¹⁰¹ Ib., 1911, p. 323, 178.

¹⁰² M. Escalera dans les „Especies de *Zonabris* del S-W de Marrueces“ a placé *M. argenteopubescens*, décrite par lui, avec *M. ruficornis* F. Ayant mal compris la description de cette espèce je n'en pus puis recevoir une représentation claire et c'est pourquoi j'ai ne la placé pas dans le tableau dichotomique. *M. argenteopubescens* est visiblement proche de *ruficornis* et se distingue de cette dernière principalement par les poils argentés sur le corps.

- 223 (222). Pronotum plus long que large. — Élytres d'un jaune-testacé, ornées de dessin noir: une tache humérale, deux taches au tiers, toujours à même hauteur, et deux fascies, l'une postmédiane et l'autre antéapicale. Toutes pattes d'un rouge foncé. — Maroc.

maelaini Escal.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., IX, 1909, pp. 244—249.

- 224 (221). Palpes rouges ¹⁰³).

- 225 (226). Élytres d'un jaune-rouge, garnies de poils noirs, couchés. Dessin noir des taches comme dans la *ruficornis* F. Pattes rouges claires. — Maroc.

rufipalpis Escal.

loc. cit.

- 226 (225). Élytres d'un jaune-rouge, garnies de poils roussâtres, couchés. Dessin noir des taches comme dans la *ruficornis* F. Pattes d'un rouge clair. — Maroc.

igneopubescens Escal.

loc. cit.

- 227 (220). Antennes noires. — Corps garni de fins poils noirs, dressés, rares. Pronotum assez grossièrement et également ponctué, avec un petit enfoncement au milieu, à peine étranglé et rétréci en devant. Élytres d'un flave-pâle, semées de petits poils noirs, couchés, ornées de roux à la bosse humérale et de dessin noir qui forment: trois petites taches au tiers antérieur, une fascie médiane complète, anguleuse, et une autre fascie postmédiane de même forme et envoyant un prolongement postérieur sur la suture qui se dilate en tache commune avant l'angle apical; quelquefois les fascies s'étendent tellement que la moitié postérieure paraît noire avec deux taches claires réniformes accolées aux $\frac{2}{3}$ et une autre postérieure occupant le bord postérieur liée avec une arrondie (ab. α) ou la couleur se restreint, les taches basales sont réduites à de tout petits points, et la dernière fascie n'atteint pas la suture (ab. β); fascie médiane prolongée sur la suture, très dentellée et souvent réunie à la fascie postérieure (ab. γ = var. *letourneuxi* Pic) ¹⁰⁴); les points antérieurs des élytres variablement réunis, au moins une partie, pour former une sorte de bande presque droite et peu dentée; bandes postérieures variables (ab. δ = var. *interrupta* Pic) ¹⁰⁵). Long. 4,5—12 mm. — Égypte, Algérie.

brunnipes Klug.

Symb. Phys., IV, 1845, pp. 32—33.

¹⁰³) Il me semble que *M. rufipalpis* et *M. ingneopubescens* n'est autre chose que les formes de *M. ruficornis* F. Je possède dans ma collection un individu sous le nom de *ruficornis* F. avec les palpes rouges, mais avec les élytres garnies de poils entremêlés (noirs et roux).

¹⁰⁴) L'Ech., 1896, p. 62.

¹⁰⁵) loc. cit. — var. *subrupta* Will., n. n. (Deut. Ent. Z., 1910, p. 23).

228 (55). Pronotum garni de poils clairs (blancs, gris, argentés ou dorés et bruns) ¹⁰⁶).

229 (252). Antennes noires.

230 (233). Pronotum à pubescence argentée ou dorée, couchée.

231 (232). Dessous du corps garni de poils dorés, entremêlés de poils noirs, dressés.—Pronotum luisant, rétréci et étranglé en devant, avec une élévation longitudinale lisse près du milieu et un sillon au milieu. Élytres d'un jaune, semées de poils dorés, couchés, avec le dessin noir: une bordure basale se continue autour de l'écusson, une tache humérale, arrondie ou allongée, trois fascies: antérieure, parfois divisée en deux taches arrondies, médiane, plus fortement dentelée, parfois réunie avec la fascie antéapicale par une ligne commune sur la suture, antéapicale, parfois interrompue, et un fin liséré apical qui se réunit avec la fascie antéapicale. Long. 7—8,5 mm. — Turkestan, Turkménie.

tekkensis Heyd.

Deut. Ent. Z., 1883, p. 360.

232 (231). Dessous du corps garni de poils noirs, dressés. Front avec deux taches rougeâtres.—Pronotum irrégulier obsolètement pointillé. Élytres d'un flave-brun avec 6 taches noires, disposées 2, 2. 2. Long. 8,5—9 mm. — Patrie inconnue.

aurociliata Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 98.

233 (230). Pronotum garni de poils blancs, gris et bruns.

234 (251). Élytres garnies de poils unicolores, clairs ou noirs.

235 (242). Élytres garnies d'une épaisse pubescence.

236 (239). Élytres avec des fascies et avec des taches.

237 (238). Antennes graduellement épaisses en massue.—Élytres d'un jaune-flave, garnies d'assez longs poils jaunes soyeux, avec le dessin noir qui forment: une tache humérale, deux taches au-dessus du milieu, parfois réunies ensemble, une fascie médiane, sinuée, entière, et une autre fascie bilobée, raccourcie en dehors et en dedans, atteint parfois la suture et se joint à la bordure apicale; un petit trait sutural derrière l'écusson (parfois devient une tache triangulaire) et une bordure apicale d'un brun. Jambes et tarses bruns-ferrugineux. Long. 9 mm. — Égypte.

fimbriata (Dej.) Mars.

L'Ab., VII, 1869—1870, Mon., p. 83.

238 (237). Antennes assez courtes, trois derniers articles forment une massue très forte, très serrée, abrupte.—Élytres d'un jaune-pâle, densément pubescentes de blanc, avec le dessin noir qui

¹⁰⁶) Dans quelques individus de *M. impedita* Heyd. la couleur des poils s'approche presque de noir (voir p. 49).

forment: deux taches au tiers, l'une longue, l'autre ovale, une fascie médiane, géniculée, et deux taches antéapicales, arrondies; bord basal bordé de brun. Pattes noires. Long. 12 mm.—Algérie.

batnensis M a r s.

loc. cit., p. 121.

239 (236). Élytres seulement avec des taches noires.

240 (241). Pattes rouges.—Corps couvert de longs poils blancs, serrés. Pronotum marqué de 3 tubercules lisses, luisants au milieu. Élytres d'un jaune-pâle avec une courte pubescence grise couchée, ornée de 6 taches: deux taches au tiers, deux taches médianes et deux antéapicales, interne sur la suture commune en forme d'un V; parfois deux taches internes sont oblitérées (ab. α.). Long. 12—17 mm. — Sibérie, Turkestan, Songarie.

undecimpunctata F i s c h. - W.

Bull. Mosc., 1844, Spic., p. 131, 151, Pl. III, f. 3.

241 (240). Pattes noires.—Corps assez richement pourvu de poils blanchâtres. Élytres d'un testacé-pâle avec 7 taches sur chacune: deux au tiers, deux médianes, deux antéapicales (interne sur la suture et forme une tache subcordiforme avec celle du côté opposé) et une tache apicale qui se réunit le long de la suture avec la tache subcordiforme. Long. 9 mm. — Turkestan.

quatuordecimmaculata D o k h t.

Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, pp. 150—151.

242 (235). Élytres garnies de poils très rares et courts.

243 (244). Antennes courtes, élargies au bout, formant une massue épaisse.—Élytres sont couvertes également de poils noirs, assez rares, d'un jaune-pâle, ornées de taches arrondies: deux taches au tiers, deux au milieu, l'une grosse appuyée sur le bord latéral et une l'autre plus petite près de la suture, et deux avant l'extrémité, l'une attenante au bord latéral et l'autre près de la suture même, parfois tache interne se recourbant le long de la suture pour former un liséré apical terminé par un petit renflement à l'angle. Long. 9 mm.—Égypte.

quatuordecimsignata M a r s.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., p. 133.

244 (243). Antennes allongées, linéaires (♂), plus courtes et un peu épaisses au bout (♀).

245 (250). Pronotum aussi long que large, inégal convexe, lisse, luisant, avec des groupes de points épars, dilaté sur les côtés au tiers, rétréci subitement et étranglé au bout qui est renflé, marqué d'une impression transverse antérieure, par derrière de

3 ou 5 tubercules lisses, disposés sur une ligne transverse, avec un sillon longitudinal médiane, marqué au milieu d'une petite fovéole et d'un espace lisse irrégulier de chaque côté.

246 (249). Corps garni de poils blancs-grisâtres, dressés.

247 (248). 3^e article des antennes une fois et demie plus long que 4^e. — Élytres d'un rouge ou d'un rouge-orange ou d'un rouge-brunâtre avec 8 taches noires ocellées de blanc: une à la base au fond d'une fovéole, deux placées transversalement au tiers antérieur, deux au milieu, externe plus grosse, interne fort rapprochée de la suture, trois antéapicales disposées en triangle, intermédiaire plus petite, interne près de la même suture, et parfois un petit point sur angle apical. Ces taches varient beaucoup de nombre, de forme et de grosseur: la rangée médiane et même celle antéapicale sont liées ensemble (ab. α = var. *wilkinsi* Dokht.)¹⁰⁷; taches internes postérieures forment une tache commune sur la suture (ab. β = var. *15-punctata* Sum.)¹⁰⁸; taches basale et antémédianes manquent (ab. γ = *tenuepunctata* Dokht.); taches antémédianes et médianes manquent (ab. δ) ou taches médianes et antéapicales manquent (ab. ϵ); tache médiane interne (ab. ζ) ou antéapicale interne (ab. η) manquent. Long. 8—18 mm. — Kirghises-Orientales, Turkestan, Turcménie.

sedecimpunctata Gebl.

Humm. Ess. Ent., IV. 1825, p. 49. — *tenuepunctata* Dokht. Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 165.

a (b). Pattes noires.

forme typique.

b (a). Pattes rouges ou moitié externe des cuisses et les jambes rouges.—Corps plus convexe. Le dessin des élytres comme dans la forme typique. — Turkestan, Turcménie Perse.

sedecimpunctata m. klugi Redt.

Denschr. Ac. Wien, 1850, p. 49, 20.

248 (247). 3^e article des antennes deux fois plus long que 4^e. Front sans point rouge. — Élytres peu convexes, d'un gris-pâle jaunâtre ou rougeâtre, ornées de 9 taches noires ocellées de pâle: une à la base, deux au tiers, posées obliquement, deux au milieu, trois avant l'extrémité et une en losange à l'angle apical; parfois taches médianes ou antéapicales réunies ensemble. Long. 8 mm.— Sibérie, Steppes des Kirghises, Turkestan, Kouldja.

ocellata Pall.

Iter, 1775, p. 721, 53.

¹⁰⁷) Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 155, Pl. II, f. 8.

¹⁰⁸) Sitzb. Nat. Ges. Juriew, XVII, 1909, p. 220.

a (b). Élytres déprimées. Pattes rouges avec les trochanters et l'extrémité noirs et les tarses rembrunis.

forme typique.

b (a). Élytres faiblement convexes. Pattes noires ou, dans un individu, les cuisses et les jambes sont rouges, moins l'extrémité. — Sibérie, Songarie.

ocellata m. octonotata Fisch. - W.

Bull. Mosc., XVII, 1844, Spic., p. 132, 152.

249 (246). Corps garni de poils d'un gris-brunâtre, d'un brun ou d'un brun-foncé. — Élytres parsemées de petits poils noirs, couchés, d'un rouge-ferrugineux avec le dessin noir, qui est très variable: une tache basale imprimée, deux taches au tiers, l'une allongée ovale au-dessous de l'épaule, l'autre ronde près de la suture, une fascie médiane atteignant la suture et le bord latéral, une fascie antéapicale et une tache apicale quadrangulaire réunie, ordinairement, avec la fascie antéapicale par une ligne bordant la suture (forme typique); deux fascies médiane et antéapicale réunies par une fine ou large ligne (ab. α); fascies médiane et antéapicale divisées en 2 taches, parfois réunies par une fine ligne (ab. β); fascies médiane et subapicale réunies ensemble par deux lignes, formant trois taches de couleur fondamentale (ab. γ); fascies sont réunies en une large tache noire avec une petite tache triangulaire de couleur fondamentale au milieu (ab. δ); la moitié postérieure de l'élytre entièrement noire avec 2 taches d'un testacé, l'une apicale et l'autre un peu au-dessus de celle-ci, parfois la tache apicale prolongée vers le bord latéral (ab. ϵ); élytres ornées de trois fascies transversales (antérieure, médiane et antémédiane), d'une bordure suturale et d'une bordure apicale (ab. η = *undulata* Sahlb.); parfois fascies antérieure et médiane réunies par une ligne longitudinale (ab. θ) ou deux fascies antérieures réunies par deux lignes, l'une au milieu et l'autre sur la suture (ab. ι). Long. 12—18 mm. — Turkestan.

impedita Heyd.

Deut. Ent. Z., 1883, p. 66. — *undulata* Sahlb. Helsingf. Of. F. Vet., 1908, pp. 90—92.

250 (245). Pronotum arrondi sur les côtés, non étranglé en devant. — Élytres d'un testacé-pâle avec 6 taches noires sur chaque élytre (2, 2, 2): deux antérieures, l'une humérale très petite et l'autre suturale grosse, ronde, deux médianes, l'externe ronde, l'interne sur la suture, commune, deux antéapicales, l'externe grosse, l'interne très petite, et une tache apicale très petite; parfois deux taches médianes réunies ensemble par une ligne

transversale et deux taches internes (médiane et antémédiane) réunies avec la tache apicale par une bordure suturale (ab. α). Long. 11,5 mm. — Talyche.

laticollis Escher.

Wien. Ent. Z., XVIII, 1899, p. 99, Pl. II, f. 3.

- 251 (234). Élytres d'une courte pubescence grise et noire. — Corps garni de poils gris, assez longs. Pronotum un peu rétréci en avant, assez densément ponctué, avec un court sillon longitudinal au milieu. Élytres d'un jaune-pâle, sauf base, côtés et bouts, qui sont russâtres, avec 7 taches noires: une petite derrière l'épaule, deux au-dessus, deux au-dessous du milieu et deux devant le bout, et l'angle sutural aussi noir. Long. 8—9 mm. — Tunis.

punctatofasciata Fairm.

An. Mus. Genova, VII, 1875, p. 531.

- 252 (229). Antennes rouges.
 253 (270). Antennes rouges ou seulement 3—11 articles rouges.
 254 (269). Élytres avec dessin noir.
 255 (260). Élytres garnies de poils petits et très rares, à peine visibles.
 256 (257). Antennes très allongées, 2 premiers articles d'un noir ou brun. — Corps finement hérissé de poils grisâtres. Pronotum oblong, parsemé d'assez gros points, rétréci et étranglé en avant, Élytres d'un jaune-pâle avec 4 taches noires ou brunes, luisantes: deux petites taches au tiers, une grosse un peu au-dessous du milieu et une tache transversale devant le bout; quelquefois tous les articles des antennes brunâtres, deux taches antérieures de chaque élytre manquent (ab. α = *angelicae* Reitt.)¹⁰⁹. Long. 6—7 mm. — Turcménie.

amoenua Mén.

Mém. Ac. Pétersb., VI, 1849, p. 247, Pl. 4, f. 13.

- 257 (256). Antennes assez courtes.
 258 (259). Pronotum arrondi sur les côtés en devant, densément couvert de poils blancs couchés, marqué de trois fovéoles lisses, luisant, au milieu, intermédiaire allongée. Élytres d'un jaune-pâle, ornées de dessin noir: trois taches antérieures, posées transversalement, une fascie médiane dentelée, deux taches après le bout, externe près du bord latéral, interne commune sur la suture, et petite tache apicale, réunie avec la tache antéapicale interne par une fine ligne bordant la suture. Long. 11—12 mm. — Algérie.

boghariensis Fairm. *Raff.*

Rev. Zool., 1873, p. 49, 380

- 259 (258). Pronotum très rétréci en avant et très étranglé sur les côtés, couvert de poils blancs fins et longs, dressés. Élytres d'un

¹⁰⁹) Verh. Nat. Ver. Brünn, 1889, 121.

pâle au milieu, d'un rouge à leurs parties antérieure et postérieure, ornées du dessin noir ou bleu-noirâtre: une fascie antérieure au tiers, trilobée devant et derrière, qui se prolonge parfois par la suture jusqu'à l'écusson et occupe ce dernier, quelquefois cette fascie se décompose en deux ou trois taches arrondies; autre fascie médiane complète, dentelée, et une tache échancrée en retriangle à l'extrémité de chaque élytre; rarement fascie antérieure prolongée par la suture jusqu'à l'écusson occupe ce dernier, fascie médiane et tache apicale manquent (ab. α = *anteactus* Pic) ¹¹⁰). Long. — 14 mm. — Turkestan, Turcmenie, Perse.

elegantissima Z u b k.

Bull. Mosc., V, 1837, p. 70, Pl. IV, f. 4.

260 (255). Élytres assez densément couvertes de poils couchés.

261 (268). Pattes rouges.

262 (263). La moitié antérieure des élytres blanchâtre, la postérieure d'un jaune-canari pâle, avec le dessin noir: trois petites taches au premier tiers, formant une ligne transversale, une fascie en zigzag au-dessous du milieu, très mince, linéaire, ne touchant ni la suture, ni le bord latéral, et trois points posés en triangle. Corps garni de poils blancs, très densément, couchés. Pattes rousses. Long. 9 mm.—Algérie.

theryi A b.

Bull. Soc. Ent. Fr., 1894, p. CXXII.

263 (262). Élytres d'un jaune-orange ou d'un jaune-pâle, avec vague couleur rougeâtre à la base et au bout.

264 (265). Antennes assez longues. Fascies noires sur les élytres sont encadrées d'une étroite bordure blanchâtre.—Pronotum étranglé et fort rétréci en devant, avec cinq tubercules lisses. Élytres d'un jaune-orange, ornées du dessin noir qui forment: deux taches rondes au tiers antérieur, une fascie au milieu sinueuse, complète, autre fascie de même forme et envoyant un prolongement postérieur sur la suture, qui se dilate en petite tache commune sur l'angle apical. Long. 9 mm.—Égypte.

elegans O l.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 101, 55.

265 (264). Antennes médiocres. Fascies noires sur les élytres sans bordure blanchâtre.

266 (267). Antennes de onze articles, toujours bien distincts.—Corps garni d'une pubescence grise-soyeuse, luisante. Élytres d'un orange, parsemées de poils courts, couchés, d'un jaunâtre, ornées de dix taches noires, arrondies: deux antérieures, l'une à l'épaule, l'autre contiguë à celle de l'autre élytre derrière l'écusson;

¹¹⁰) Bull. Soc. Zool. Fr., 1901, p. 78.

deux au-dessus du milieu; trois au milieu, l'intermédiaire plus antérieure, et trois dernières avant le bout, placées de la même manière. Long. 12 mm.—Nord de l'Afrique.

octodecimmaculata Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., p. 147—148.

- 267 (266). Antennes de onze articles, deux derniers articles paraissant comme soudés, la ligne de leur séparation peu distincte.—Corps à pubescence argentée, couchée. Élytres d'un jaune-pâle à vague couleur rougeâtre à la base et au bout, garnies d'une courte pubescence noire, couchée, et ornées de neuf taches noires sur chaque élytre (posées 1, 2, 3, 3): une à l'épaule, deux au tiers antérieur, trois un peu au-dessous du milieu et trois dernières avant le bout; quelquefois les taches médiane et postérieure plus ou moins variablement réunies en fascies irrégulières (ab. α = var. *semifasciata* Pic)¹¹¹⁾ ou coloration des élytres uniforme jaunâtre, chacune des élytres ornée de sept taches noires (1, 2, 1, 3) et d'une courte fascie oblique interne placée au milieu de ces organes (ab. β = var. *tunisea* Pic)¹¹²⁾. Long. 5—10 mm.—Algérie, Tunis.

bicolorepilosa Sum.

Rev. Russe d'Ent., XIII, 1913, pp. 473—74.

- 268 (261). Pattes noires ou tibias et tarses plus ou moins roux.—Corps vetu d'une longue pubescence soyeuse, couchée, d'un gris argenté, brillant. Élytres d'un jaune-testacé, couvertes de petits poils jaunes, couchés, ornées de dix taches noires arrondies: deux taches antérieures, l'une sur l'épaule et l'autre sous l'écusson, formant une tache commune, triangulaire; deux taches antémédianes en ligne droite; trois taches médianes en arc et trois taches avant le bout, les dernières trois taches sont souvent réunies en une fascie sinueuse; quelquefois élytres ornées de neuf taches sur chacune: une humérale, deux antémédianes en ligne, trois après le milieu, la médiane plus haute et réunie à l'externe, et trois avant l'extrémité réunies pour former une sorte de fascie sinuée; pattes moins foncées, pubescence plus sombre (ab. α = var. *obscurior* Pic)¹¹³⁾. Long. 14—16 mm.—Égypte.

tigripennis Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., pp. 143—44.

- 269 (254). Élytres d'un jaune aurifère à trois rangées de taches pâles, peu visibles.—Corps garni d'une courte pubescence grise, rare. Pronotum transverse, densément ponctué, élargi sur les côtés jusqu'au tiers antérieur où il forme un tubercule mousse, ré-

¹¹¹⁾ L'Échange, 1895, p. 81.

¹¹²⁾ Ib., 1906, p. 22.

¹¹³⁾ Rev. sc. Bourb. Fr., 1897, p. 3 (Extrait).

tréci brèvement, marqué au milieu longitudinalement d'une ligne lisse, impressionnée vers le milieu, avec un fin sillon au fond et de chaque côté une callosité lisse, luisante. Élytres faiblement pointillées et peu ciliées de noir, ornées de six taches, placées 2, 2, 2. Long 9 mm.—Perse mér., Égypte.

pallidomaculata Redt.

Denkschr. Ac. Wien., I, 1850, p. 49, 18.

- 270 (253). 3—6 articles ferrugineux à la base. — Corps hérissé de poils fins blancs, brillants. Pronotum dilaté en bosse sur les côtés au quart antérieur, rétréci et étranglé en devant, marqué au milieu d'un sillon longitudinal, parsemé de points, peu serrés. Élytres d'un jaune-paille, densément pointillées avec quelques petits cils noirs à peine visibles, des points au milieu de la pubescence blanche, ornées de trois rangées de trois petites taches sur chacune, disposées en triangle (3, 3, 3). Long. 11 mm.—Égypte.

gratiosa Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., p. 135.

- 271 (54). Tête et pronotum rouges.

- 272 (273). Antennes noires.—Corps vêtu d'une pubescence blanche, longue en dessous, courte, couchée et serrée sur les élytres. Pronotum noir en dessous, rouge en dessus, avec une petite élévation médiane lisse, luisante. Élytres d'un jaune-rougeâtre ou d'un roux-ferrugineux, ornées de dessin noir: une tache brillante imprimée à la base, deux taches au tiers antérieur, deux fascies géniculées en forme de chevron: l'une au-dessus du milieu, l'autre au-dessous du milieu, et prolongée par la suture, et enfin une tache arrondie au-dessus de l'extrémité; parfois la 2^e fascie divisée en deux taches séparées (ab. α) ou les deux fascies formant chacune un angle tranchant, la 2^e fascie atteignant la suture (ab. β). Long. 9—13 mm. — Steppes des Kirghises, Turkestan.

audouini Mars.

loc. cit., pp. 141—142.

- 273 (272). Antennes rouges.

- 274 (275). Pronotum avec deux taches noires (l'une arrondie de chaque côté), marqué sur la ligne médiane d'une fovéole entre les taches et d'une autre plus profonde au-devant du rebord basal.—Corps vêtu de poils soyeux argentés. Élytres couvertes de gros points et de rides, d'un roux plus ou moins pâle, ornées de huit taches noires arrondies, paraissant ocellées, placées 2, 3, 2, 1, taches subapicales liées ensemble et touchant à la suture; segment de l'abdomen à bandes rousses. Patte rousses. Long. 7 mm.—Algérie.

myrmidon Mars.

loc. cit., pp. 154—155.

- 275 (274). Pronotum avec trois taches noires, à peine rétréci et étranglé en devant, avec des points très-espacés.—Tête noire garnie de poils noirs rares, vertex rouge. Élytres à peine pubescentes, d'un jaune-rougeâtre, ornées de neuf taches noires un peu arrondies, entourées d'un iris pâle, placées 1, 3, 3, 2: une au milieu à la base, trois sur la même ligne au tiers, trois un peu après le milieu et deux antéapicales; parfois les taches se réunissent avec leurs voisines dans chaque rangée; dessous noir, pubescent de gris. Pattes rouges. Long. 10—14 mm. — Égypte.

sisymbrii Klug.

Symb. Phys., IV, 1845, p. 12, Pl. 31, f. 12.

- 276 (53). Élytres couvertes de très gros points et de rides.—Noir, luisant, garni de poils noirs. Pronotum court, profondément excavé au milieu par une sorte de sillon longitudinal élargi près de la base, qui le divise en deux lobes, grossièrement ridé-punctué, formant au tiers de chaque côté un angle aigu, puis rétréci brusquement en devant. Élytres d'un jaune d'ocre-pâle ou d'un orange passant en rouge-brunâtre vers le tiers postérieur avec le dessin noir qui est variable: bordure basale, entourant l'écusson, fascie antérieure au tiers, souvent interrompue, fascie médiane complète, fascie antéapicale, parfois raccourcie en dedans ou manque, bordure apicale assez large, lunule échancrée en dedans et plusieurs petites taches irrégulières entre les fascies. Long. 14—22 mm.—Thibet or.

przewalskii Dokht.

Horae Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 341.—Ib., XXIV, 1889, p. 120, ff. 11, 12.

- 277 (52). Parties noires des élytres finement et très densément chagrinées ou pointillées-chagrinées, parties claires (jaunes ou rouges) grossièrement ponctuées-ruguleuses ou ponctuées-fovéolées.

- 278 (291). Antennes noires.

- 279 (280). Dernier article des antennes un peu moins large que le précédent.—Corps à peine vêtu de noir. Front avec une petite tache rousse au milieu et deux légères impressions obliques partant de ce point. Pronotum densément punctué-criblé, étranglé et très rétréci en devant, marqué au milieu d'une fine ligne longitudinale. Élytres d'un jaune-pâle, avec le dessin noir: bordure basale, deux fascies: antérieure, réunie avec bordure basale par la suture, postmédiane oblique, et large bordure apicale. Long. 33 mm. — Égypte.

abiadensis Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., pp. 29—30.

- 280 (279). Dernier article des antennes de même largeur ou un plus large que le précédent.

- 281 (282). Corps assez court, large et peu convexe, hérissé de petits poils noirs. — Antennes médiocres, très élargies au bout (trois derniers articles). Pronotum densément ponctué, rétréci et étranglé en devant, fovéolé au milieu. Élytres d'un jaune-rougeâtre, ciliées de noir plus rarement que sur les parties noires (dessin), grossièrement ponctuées-ruguleuses, ornées de dessin noir: une petite tache derrière l'épaule, une fascie médiane large et bordure apicale assez large avec un dent près du bord latéral. Long. 12 mm.—Japon (Hakodate).

japonica Sum.

Rev. Russe d'Ent., XIII, 1913, pp. 474—475.

- 282 (281). Corps assez convexe, assez étroit.

- 283 (288). Petit. Long. jusque 13 mm.

- 284 (285). Élytres testacées avec dessin noir.—Corps noir à peine brillant, modérément pubescent de foncé. Élytres ornées de dessin noir, qui forment: étroites bordures basale et apicale, une tache humérale, deux taches antémédianes, obliquement placées, et deux fascies, l'une au-dessous du milieu, l'autre avant le bout celles-ci paraissant faites de macules juxtaposées ou jointes. Le dessin des élytres varie: élytres dépourvues de leur fascie avant le bout (ab. α = var. *massaraiensis* Pic) ou élytres largement noires sur le milieu, par suite de la dilatation et la réunion plus ou moins complète des taches antérieures avec la fascie médiane (ab. β = var. *heluanensis* Pic).—Égypte.

mediofasciattela Pic.

L'Ech., 24, 1908, p. 33.

- 285 (284). Élytres noires avec dessin jaune-rougeâtre.

- 286 (287). Élytres noires avec trois fascies d'un jaune-rougeâtre. — Corps noir, luisant, hérissé de poils noirs peu serrés et longs. Antennes longues, 3-e article plus long que 4-e. Pronotum rugueusement et fortement ponctué, rétréci et étranglé en devant, avec une ligne lisse longitudinale au milieu et deux impressions: l'une au milieu et l'autre antéscutellaire. Long. 13 mm.—Himalaya.

macilentata Mars.

Mon. Myl., 1872, pp. 129—30, Pl. V, f. 51.

- 287 (286). Élytres noires avec trois fascies et deux taches près du bout d'un jaune-roux. — Corps noir, opaque, garni de poils dressés. Antennes grêles, 3-e article un peu plus long que 4-e et 5-e ensemble. Pronotum subitement, rétréci et à peine étranglé en devant, impression médiane peu visible. Élytres densément chagrinées et granuleuses, ornées de trois fascies sinuées et dentelées, entières: 1-re occupant la base même, 2-e au-dessus

du milieu et 3-e au-dessous du milieu, et deux taches en ovale, l'une plus grosse, l'autre plus petite, contre la suture plus éloignée du bout. Long. 12 mm. — Égypte.

varia O1.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 96, 24.

288 (283). Grand. Long. 15—30 mm.

289 (290). Élytres noires avec le dessin jaune-testacé. — Corps convexe, garni de fins poils noirs, dressés. Pronotum dilaté arrondi sur les côtés avant le milieu, étranglé et rétréci en devant, bombé, densément ponctué et rugueux. Élytres ciliées de noir, sur les parties noires plus densément, ornées de dessin, qui forment: deux taches à la base, l'une externe petite et l'autre interne plus grande, et deux fascies larges, complètes, sinuées ou dentelées, l'une antémédiane, l'autre postmédiane. Ce dessin varie beaucoup: parfois fascie antérieure conflue avec fascie postérieure, sauf une très petite tache noire au milieu (ab. α = var. *mosquiniana* Ferr.)¹¹⁴; parfois taches basales confluent avec fascie antémédiane (ab. β). Long. 15—30 mm. — Chine, Himalaya.

phalerata P a 11.

Icon., 1782, p. 78, Pl. E., f. 3b. — Fab. En. Syst., Supp., 1798, p. 120, 7—8 (*sidae*).

290 (289). Élytres noires avec deux fascies blanches-jaunâtres. — Corps peu convexe, garni de poils rares, noirs, dressés. Front avec une tache rouge. Pronotum assez densément ponctué-criblé avec quelques reliefs sur les côtés avant le milieu, étranglé et rétréci en devant. Élytres, ciliées de noir, sur les parties jaunâtres à peine visiblement, ornées de dessin qui forment: une fascie au tiers, assez large, plus étroite en dedans qu'en dehors, et une autre très étroite, sinuée et raccourcie en dehors et en dedans; parfois fascie postmédiane divisée en plusieurs taches séparées. Long. 30 mm. — Perse.

schah Reiche.

An. Soc. Ent. Fr., 1866, p. 632, 4.

291 (278). Antennes rouges avec les deux premiers articles noirs ou avec premier article en grande partie noir.

292 (301). Deux premiers articles noirs.

293 (294). Derniers segments de l'abdomen avec taches rouges de chaque côté, le dernier entouré d'un anneau. — Corps hérissé de petits poils noirs. Tête avec une petite ligne rouge. Élytres très densément aciculaires, avec deux fascies jaunes-pailles, l'une avant le milieu, rétrécie vers la suture, l'autre postmédiane très large. Long. 30 mm. — Égypte, Nubie et Arabie.

maculiventris Kl ug.

Symb. Phys., 1845, p. 4, Pl. 31, 2.

¹¹⁴) Guer. Rev., 1859, p. 540, Pl. 21, f. 8.

- 294 (293). Segments de l'abdomen sans taches rouges.
 295 (296). Deux fascies d'un jaune-rougeâtre, très étroites et en reliefs, peu ponctuées. — Élytres noires, finement et densément aciculées-ruguleuses, ornées de deux fascies, l'une au tiers, l'autre aux deux tiers un peu oblique. Long. 22—30 mm. — Égypte, Nubie.

ligata Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., pp. 31—32.

- 296 (295). Les parties des élytres d'un jaune-rouge, ne sont pas reliefs, assez densément pointillées.
 297 (300). Élytres noires avec deux fascies d'un jaune-rouge ou élytres jaunes-rouges avec deux bordures, basale et apicale.
 298 (299). Corps noir, luisant et garni de poils noirs. — Élytres noires, densément ponctuées-ruguleuses, ornées de deux fascies d'un jaune-rouge, complètes, plus fortement et moins densément ponctuées, l'une antémédiane, bidentelée par dessus et l'autre étroite, sinuée. Long. 10—16 mm. — Égypte, Arabie.

cruentata Klug.

Sym. Phys., IV, 1845, Pl. 31, f. 1.

- 299 (298). Corps noir, mat, garni de poils noirs, mélangés de gris. — Élytres d'un jaune-rouge, ornées de deux bordures: basale très étroite, brune, et apicale très large, noire. Long. 18 mm. — Algérie, Égypte.

ustulata Reiche.

An. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 633, 6.

- 300 (297). Antérieure moitié des élytres jaunes-rouges, avec une bordure brune et deux taches noires, arrondis, et postérieure moitié noire avec deux taches jaunes-rouges, ovales, placées au tiers postérieur; les parties noires finement et très densément chagrinées. Long. 17—27 mm. — Égypte.

bipartita Mars.

Mon. Myl., 1872, pp. 67—68.

- 301 (292). Premier article des antennes en grand partie noir, arqué. — Corps noir, garni de poils noirs, peu serrés, en dessous d'une pubescence courte, gris-soyeuse, couchée. Élytres noires, ornées de trois fascies d'un rouge-brun: une fascie près de la base, une antémédiane, assez large, bisinuée, et une postmédiane; quelquefois fascie antérieure interrompue et réunie avec la fascie antémédiane au milieu et sur la suture (ab. α). Long. 25 mm. — Égypte.

✓ **dubiosa** Mars.

loc. cit., pp. 35—36.

302 (51). Deuxième article des antennes presque de la longueur du troisième.—Corps noir, luisant, à peine vêtu de poils noirs. Pronotum arrondi sur les côtés, rétréci en devant avec une large impression oblique de chaque côté et une médiane. Élytres d'un flave ou blanc de lait, à peine visiblement ciliées de noir, assez densément ponctuées, ornées de taches noires: deux petits points posés obliquement derrière l'épaule, une tache triangone au-delà du milieu, un petit trait longitudinal près de la suture devant l'angle sutural. Pattes rouges. Long. 12 mm.—Égypte.

lactea M a r s.

loc. cit., pp. 140—141.

303 (50). Le dessin des élytres d'un vert ou d'un bleu soyeux.—Corps noir, luisant. Antennes assez longues, 6—11 articles opaques, bruns-noirs, serrés, plus épaisses et pubescents de gris, 10—11 articles paraissant comme soudés, la ligne de leur séparation peu distincte. Pronotum presque subglobuleux, rudiment et grossièrement ponctué, avec de callosités sur le milieu du dos, puis de là fortement étranglé et rétréci en devant. Élytres jaunâtres ou rougeâtres, faiblement et vaguement pointillées, avec quelques rares cils noirs, ornées de 4 taches: deux taches antérieures arrondies, une fascie géniculée, oblique au milieu, raccourcie en dehors et en dedans, et une tache arrondie près du bout; étroit rebord sutural, derrière l'écusson, un peu obscurci, bordure à la base brune; parfois antennes et pattes antérieures entièrement noires (ab. α = var. *pilimana* R e i t t.) ¹¹⁵) ou élytres d'un rouge-pâle (ab. β = var. *connecticornis* R e i t t.) ¹¹⁶). Long. 7—11 mm.—Russie mér., Sibérie, Turkménie, Turkestan.

tauscheri F i s c h. - W.

Bull. Mosc., I, 1844, p. 130. — *komarovi* R e i t t. Verhandl. Nat. Ver. Brünn, 1889, p. 121.

304 (1). Épine des tibias postérieurs en forme de cuiller (fig. 3).

305 (320). Corps garni de poils obscurs.

306 (307). Corps noir, garni de poils bruns, dressés.—Élytres d'un roux-ferrugineux, avec de rares petits poils noirs, couchés, ornées, de petites taches noires placées 3, 3, 3, 1, chacune des rangées plus ou moins placées en triangle, première rangée sous l'épaule, deuxième vers le milieu et troisième aux trois quarts et une tache subapicale; ordinairement taches externes liées ensemble avec celle du milieu dans chaque rangée; quelquefois toutes ensemble de manière à former des bandes sinuées, complètes (ab. α). Long. 10 mm.—Syrie.

delarouzei R e i c h e.

An. Soc. Ent. Fr., 1865. p. 639, 52.

¹¹⁵) Deut. Ent. Z., 1894, p. 51.

¹¹⁶) loc. cit.

307 (306). Corps noir, garni de poils noirs.

308 (309). Pronotum couvert de gros points pressés avec les intervalles comme réticulés, fortement rétréci et étranglé en devant, arrondi sur les côtés, marquées sur la ligne médiane longitudinalement d'abord d'une ligne lisse élevé, puis d'une petite impression au milieu. Élytres d'un jaune-testacé sale, ornées de trois fascies noires: l'une au tiers; l'autre au milieu, étroites, décomposées, ordinairement, en petits points, disparaissant en partie; la troisième antéapicale plus large, souvent interrompue, mais prolongée sur la suture en bordure commune jusqu'à l'angle apicale. Long. 15 mm. — Perse, Arabie.

goryi Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., pp. 88—89.

309 (308). Pronotum densément et assez finement également ponctué, rétréci et étranglé en devant, avec dépression longitudinale au milieu.

310 (315). Élytres garnies de poils noirs, dressés.

311 (314). Pattes noires.

312 (313). Élytres noires avec trois fascies ou trois lignes de points ou taches d'un jaune-rugeâtre, assez étroites n'atteignant pas la suture: l'une fascie humérale, l'autre antémédiane et la troisième postmédiane; ces fascies varient beaucoup: fascies ou lignes de points humérale et antémédiane existantes, fascie postmédiane oblitérée (ab. α); fascies humérale et postmédiane existantes, fascie antémédiane oblitérée (ab. β); quelques taches à peine visibles, variablement disposées; une ou plusieurs taches aux épaules (ab. γ); les élytres sans fascies, entièrement noires ou à peine tachées de jaune aux épaules (ab. δ = var. *nigripennis* Pic)¹¹⁷). Long. 20 mm. — Algérie.

wartmanni Pic.

L'Ech., 1896, p. 62.

313 (312). Élytres noires avec quatre rangées de taches d'un rouge, à peine en relief: une fascie basale, raccourcie près de la suture, deux fascies antémédiane et postmédiane complètes et une tache subapicale ovalaire (forme typique) ou une fascie humérale irrégulière, deux petites taches antémédianes en ligne, deux taches postmédianes, l'une grosse suturale et l'autre petite externe et une grande tache apicale (ab. α = var. *notatipennis* Pic)¹¹⁸). Long. 6—20 mm. — Syrie, Arabie, Égypte, Tunis, Algérie.

sanguinolenta Ol.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 95, 18.

¹¹⁷) Rev. Bourb. Fr., 1897, p. 2. (Extrait).

¹¹⁸) loc. cit.

- 314 (311). Pattes testacées. — Pronotum avec trois fovéoles au milieu, placées sur une ligne transversale, intermédiaire plus grosse. Élytres noires, assez finement et densément ponctuées-ruguleuses, ornées de quatre taches transversales, étroites, raccourcies près de la suture, d'un rouge: une subbasale droite, une antémédiane arquée en avant, une postmédiane droite, près de la suture à peine interrompue, et une petite subapicale. Long. 10—14 m. — Tunis.

quadrizonata Fairm.

An. Mus. Genova, VII, 1875, pp. 530—531.

- 315 (310). Élytres garnies de poils noirs, assez courts, couchés.
316 (317). Élytres noires avec trois fascies rouges, en relief. — Corps noir, obscur, garni de petits poils noirs, dressés. Pronotum dilaté arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en avant, légèrement convexe, densément crible-ponctué, avec trois reliefs sur une ligne transversale. Élytres densément et finement réticulées, ornées de trois fascies jaunes, teintées de rose: 1^{re} basale, ne touchant ni le bord basal, ni la suture, 2^e antémédiane, entière, sinuée, et 3^e antéapicale, aussi entière; parfois fascies antémédiane et antéapicale confluent ensemble et se réunissent avec la fascie basale par le bord latéral (ab. α = var. *islamita* Mars.)¹¹⁹). Long. 12—19 mm. — Égypte, Arabie, Algérie.

litigiosa Chevrl.

Silb. Rev., V, 1837, p. 271, 4.

- 317 (316). Élytres jaunes-rouges ou rouges, avec dessin noir.
318 (319). Élytres garnies des poils rares et très courts. Pronotum étranglé et fortement rétréci en avant, inégalement ponctué, avec trois impressions, antérieure transversale, médiane longitudinale et antéscutellaire. — Élytres assez grossièrement ridées-pointillées, d'un jaune-rouge, ornées de trois fascies: 1^{re} au tiers, parfois remplacée par deux ou trois taches isolées, 2^e au milieu, dans des cas très rares interrompue, et 3^e près du bout, prolongée par la suture jusqu'à l'angle apical; quelquefois fascie antérieure manque (ab. α). Long. 9—18 mm. — Le Nord de l'Afrique.

angulata Klug.

Symb. Phys., IV, 1845, Pl. 32, f. 6.

- a (b). Pronotum fortement étranglé et rétréci en avant.
forme typique.
b (a). Pronotum un peu moins étranglé et rétréci en avant.
Élytres garnies de poils plus densément. — Égypte, Syrie(?).

angulata m. ? incerta Klug.

loc. cit., p. 32, 5.

¹¹⁹) Mon., 1872, Pl. II, f. 16a.

- 319 (318). Élytres garnies de poils courts et denses. Pronotum peu rétréci et à peine étranglé en avant, densément et assez également ponctué, marqué au milieu d'une impression faible et d'une autre antéscutellaire. — Élytres finement et plus densément ridées-pointillées, d'un rouge-brique, ornées de taches noires variées à l'infini: deux taches au tiers antérieur, externe grande, interne petite, envoyant un prolongement sutural jusqu'à l'écusson, parfois liée avec la première; deux taches au milieu, externe dilatée-sinuée près du bord latéral, interne ronde, et deux taches au tiers postérieur, posées obliquement (forme typique); taches antérieures et médianes parfois forment deux fascies, tache subapicale interne manque (ab. α); taches antérieures, médianes et postérieures forment trois fascies, parfois fascie médiane interrompue (ab. β); fascie antérieure se réunit avec fascie médiane le long du bord latéral par une tache large (ab. γ); les taches antérieures, médianes et subapicales confondues en une large tache qui n'est séparée de la suture et du bord latéral que par une fine bordure d'un rouge (ab. δ = var. *scapularis* Chevrl.)¹²⁰); trois taches antérieures et deux médianes sont très petites et vagues, taches antéapicales manquent (ab. ϵ). Long. 10—20 mm. — Algérie.

circumflexa Chevrl.

Silb. Rev., V, 1837, p. 273, 11.

- 320 (305). Corps garni de poils clairs (gris ou argentés) ou entremêlés (noirs et gris).
 321 (336). 3^e article des antennes plus long que le 2^e. Élytres garnies de poils assez rares.
 322 (325). Antennes noires.
 323 (324). Pattes, sauf tarsi rouges ou seulement tibias bruns, rougeâtres. — Front avec une tache rouge. Pronotum rétréci et étranglé, densément ponctué, avec deux impressions, l'une profonde au milieu, l'autre antéscutellaire. Élytres ponctuées-ridées (plus grossièrement que les parties noires), d'un jaune-rouge, garnies de poils gris, ornées de fascies noires, très denticulées: 1^{re} parfois remplacée par trois taches isolées, tache interne sur la suture remontant jusqu'à l'écusson, 2^e au milieu, entière, et 3^e près du bout, parfois aussi décomposée en trois taches isolées. Long. 10—15 mm. — Le Nord de l'Afrique.

gilvipes Chevrl.

loc. cit., p. 9.

- 324 (323). Pattes noires. — Corps garni de poils gris. Pronotum plus long que large, rétréci en avant, irrégulièrement et fortement ponctué, marqué en dessus de plusieurs impressions variables.

¹²⁰) Silb. Rev., V, 1837, p. 278, 24. — var. *borealis* Voig., n. n. Wien. Ent. Z., XXI, p. 178.

Élytres d'un testacé, ornées de taches noires: une fascie antérieure sinuée, remontant sur la suture et entourant l'écusson en se prolongeant un peu sur la base, deux petites taches postmédianes isolées, variables, et une bordure apicale assez large. Long. 13—14 mm. — Syrie.

alepensis Pic.

L'Ech., 1913, p. 348, 185.

325 (322). Antennes rouges.

326 (329). Pronotum rouge, court.

327 (328). Pronotum sans dessin noir, transverse, marqué au milieu d'une fovéole arrondie. — Corps garni de poils argentés. Élytres d'un jaune-roussâtre avec taches noires qui sont plus ou moins variables: une tache basale, parfois manque, trois au tiers antérieur et trois au milieu, placées en triangle, trois ou quatre au-dessous du milieu, irrégulières fréquemment liées ensemble au moins partiellement, et une ou deux près du bout et parfois un liséré obscur sutural vers l'angle apical; quelquefois les taches internes des deux premières rangées disparaissent (ab. α). Long. 10—16 mm. — Égypte, Algérie.

menthae Klug.

Symb. Phys., IV, 1845, p. 12, Pl. 31, f. 11.

328 (329). Pronotum presque globuleux avec une tache devant l'écusson et une ligne transversale noires. — Corps garni de poils gris-argentés. Dernier article des antennes très allongé. Élytres d'un jaune, ornées de taches noires: une derrière l'écusson, trois antémédianes, disposées triangulairement, une fascie médiane ondulée et une autre postmédiane avec le bord apical rembruni. Long. 12 mm. — Égypte.

diversithorax Pic.

L'Ech., 1910, p. 303, 18.

329 (326). Pronotum noir.

330 (331). Antennes assez longues, faiblement épaissies au bout. Élytres luisantes. — Corps garni de poils gris-argentés. Pronotum à points peu enfoncés, sans rebords à la base, couvert de poils gris-soyeux, assez rares. Élytres d'un jaune-paille, ornées de taches noires: deux rondes au tiers, posées obliquement, deux au milieu, souvent liées par une fine ligne, une fascie antéapicale, composée de trois taches unies et envoyant un trait marginal vers l'angle. Long. 13—15 mm. — Égypte.

fulgurita Reiche.

An. Soc. Ent. F., 1865, p. 600, 60.

331 (330). Antennes modérées, un peu plus élargies au bout. Élytres peu luisantes.

332 (335). Derniers deux articles des antennes bien séparés, la ligne de leur séparation toujours bien distincte.

- 333 (334). Premiers deux articles des antennes noirs ou rembrunis, parfois seulement 2^e article noir. — Corps garni de poils gris, longs et très épais. Pronotum très densément ponctué, couvert de poils gris, longs et très épais. Élytres d'un jaune-pâle, semées de petits poils courts, couchés, ornées chacune de 10 ou 11 taches noires, placées triangulairement: trois au tiers, trois au milieu, trois ou quatre au-dessus du milieu et une près du bout. Long. 10—14 mm. — Égypte, Syrie.

vigintipunctata O l.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 97, 35.

- 334 (333). Tous les articles des antennes d'un roux. — La couleur et la disposition des taches la rapprochent du *vigintipunctata* O l. Long. 8—10 mm. — Algérie.

albilanea B e d.

Bull. Soc. Ent. Fr., 1899, p. 382.

- 335 (332). Derniers deux articles des antennes paraissant comme soudés, la ligne de leur séparation peu distincte. — Élytres d'un jaune-testacé, semées de très petits poils gris-argentés, couchés, ornées de très petits poils gris-argentés, couchés, ornées de 11 taches noires: trois antérieures, disposées obliquement, trois médianes, parfois tache externe se réunit avec tache intermédiaire, quatre postmédianes et une tache près du bout. Long. 7—10 mm. — Algérie.

bedeli B l e u s e.

loc. cit., p. 383.

- 336 (321). 2—3 articles presque d'égale longueur. Élytres vêtues d'une pubescence assez serrée, couchée, d'un blanc, ornées de dessin noir: une tache sur la bosse humérale, deux au tiers premier, une médiane en circonflexe ou en croche de musique et deux près du bout, externe en arc, interne rond. Pattes d'un jaune-testacé; tarsi garnis en dessous partiellement de brosses de cils noirs. Long. 13 mm. — Arabie, Égypte (?).

nigriplantis K l u g.

Symb. Phys., 1845, p. 9, Pl. 31, f. 9.

Sous-genre **Ceroctis** M a r s.

- 1 (2). Élytres noires, opaques, ornées de dessin rouge. — Corps noir, opaque, hérissé de poils noirs. 1^{er} article des antennes assez long. Pronotum avec une impression sulciforme au milieu et une légère fovéole de chaque côté. Élytres noires, très densément ponctuées-ruguleuses, avec dessin rouge assez fortement et grossièrement ponctuées-réticulées: deux taches en dehors et en dedans du calus et deux fascies, l'une antémédiane, l'autre postmédiane, plus ou moins raccourcies vers la suture. Long. 11—17. — Algérie.

corynoides R e i c h e.

An. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 631, 2.

- 2 (1). Élytres jaunes-testacées avec dessin noir. — Corps noir, peu luisant. 1^{er} article peu allongé. Pronotum avec deux impressions, médiane et antéscutellaire. Élytres fovéolées-punctuées, avec dessin noir, très densément ponctué-rugueux: deux fascies, l'une au tiers, composée de trois taches, tantôt réunies, tantôt disparaissant, parfois nulles, l'autre médiane, parfois interrompue, et bordure apicale large. Long. 11 mm. — Égypte.

coronata Mars.

L'Ab., VII, 1869—70, Mon., pp. 70—71.

Sous-genre **Decatoma** Latr.

- 1 (8). Antennes rousses.
2 (5). Pattes noires ainsi que le pronotum.
3 (4). Corps garni de poils noirs, rares, dressés. — Élytres d'un noir, ornées de deux fascies d'un jaune-roux transversales, en relief, luisantes, grossièrement ponctuées. Long. 18 mm. — Arabie, Égypte.

scabrata Klug.

Symb. Phys., IV, 1845, p. 33°, Pl. 32, f. 10.

- 4 (3). Corps garni de poils gris avec quelques poils noirs fins, dressés. — Élytres d'un testacé-roux, pubescent de gris, ornées de six taches rondes, noires, vetues de poils brunâtres, plus rugueuses que le fond, disposées: 2, 2, 2; parfois deux taches postérieures réunies ensemble. Long. 10—12 mm. — Afrique bor.

duodecimmaculata Ol.

Enc. méth., VIII, 1811, p. 98, 41.

- 5 (2). Pattes rouges.
6 (7). Pronotum noir avec bordure basale rouge. — Corps garni de poils d'un jaune-soyeux, serrés, assez longs. Antennes toutes rousses. Élytres flaves avec de poils blancs, épars, couchés, ornées de dix taches noires arrondies, placées 2, 2, 3, 3. Long. 10 mm. — Afrique bor.

novemdecimpunctata Ol.

loc. cit., p. 31.

- 7 (6). Pronotum rouge. — Dessous du corps testacé-rougeâtre, garni de poils argentés, très épais. Élytres d'un jaune, couvertes d'une courte pubescence argentée, assez rare, couchée, ornées de 9 taches noires, placées 1, 2, 3, 3; les taches sont parfois réunies en fascies plus ou moins régulières; les taches 1 et 2 sont parfois réunies l'une à l'autre de façon à former une bande longitudinale en dessous de l'épaule; d'autres fois, ce sont les taches 4, 5 et 6 ou bien les taches 7, 8 et 9 de chaque élytre qui sont réunies de manière à former une bande noire transversale (ab. α = var. *auberti* Chob.)¹²¹). Long. 9—12 mm. — Algérie.

argentifer Pic.

L'Êch., 1895, p. 11, 81.

¹²¹) Rev. Ent. Fr., XVII, 1898, p. 87.

В. Oshanin (Petrograd).

Vade mecum destiné à faciliter la détermination des Hémiptères.

Catalogue systématique des faunes, des monographies et des synopsis traitant les Hétéroptères, les Cicadines et les Psyllides.

В. Ошанинъ (Петроградъ).

**Указатель литературы, необходимой при опредѣленіи
Полужесткокрылыхъ.**

Систематическій каталогъ фаунъ, монографій и синопсисовъ группъ:
Heteroptera, Homoptera-Auchenorrhyncha и Psyllidae.

Préface.

Tout biologiste, quelque soit le domaine spécial de ses travaux, se trouve dans la nécessité de connaître avec certitude les noms exacts des espèces qu'il étudie. Cette condition essentielle n'étant pas remplie, les noms spécifiques de ces formes restant douteux, les résultats de l'étude perdent de leur valeur. Si c'est incontestable pour les travaux ayant pour objet l'histologie, l'anatomie ou bien l'embryologie des êtres organisés, c'est encore bien plus important lorsqu'il s'agit des questions concernant la distribution géographique ou bien l'écologie, parce que les espèces les plus voisines présentent parfois sous ces deux points de vue des différences très considérables. Dans ce cas là une erreur dans la détermination spécifique rend la valeur d'un travail, même très consciencieux, non seulement tout-à-fait nulle, mais entrave pour un certain nombre d'années le progrès de la science en introduisant des données erronées qui mènent à des conclusions complètement fausses. Linné avait dit: „Nomina si nescis, periit et cognitio rerum“; les savants contemporains doivent convenir de la justesse de cet aphorisme énoncé par l'illustre fondateur de la systématique scientifique.

La détermination des espèces présente bien de difficultés. Il faut d'abord bien connaître la littérature systématique du groupe que l'on se propose d'étudier. Cette littérature, étant très volumineuse, est en même temps extrêmement éparse parce qu'elle est publiée dans les annales de

nombreuses sociétés scientifiques et dans beaucoup de revues imprimées presque dans tous les pays du monde. L'acquisition des connaissances bibliographiques n'est pas aisée à faire et surtout elle ne peut être faite rapidement. Cela est surtout applicable à l'immense domaine de l'entomologie où la quantité des travaux systématiques atteint son maximum. En outre dans la classe des insectes il n'y a qu'un nombre restreint d'ordres dont les espèces aient été énumérées dans des catalogues avec l'indication des ouvrages dans lesquels leurs descriptions peuvent être trouvées. Ainsi un catalogue pareil n'existe pas pour les Hémiptères. Les deux tentatives de publication qui aient été faites sont restées incomplètes même pour le sous-ordre des Hétéroptères, si l'on ne tient pas compte des deux ouvrages de Walker, qui sont d'une part trop anciens et d'autre pèchent par bien de défauts. Aussi grâce à cet état de choses la détermination des Hémiptères est un travail très ardu, surtout si l'on a à classer des collections faites dans une contrée dont la faune est peu connue et qui est, en même temps, très riche en formes endémiques.

Quoique la littérature systématique soit composée en grande partie d'articles renfermant des descriptions détachées d'innombrables genres et espèces nouvelles, elle contient aussi heureusement bon nombre d'ouvrages ayant pour but la révision des formes connues qui habitent une partie déterminée de notre planète, ou bien qui appartiennent à un certain groupe taxonomique donné — famille, tribu ou genre. J'entends par là les faunes et les monographies dont la valeur pratique est surtout réhaussée lorsqu'elles contiennent des tableaux synoptiques, ou bien lorsqu'elles sont en entier disposées selon la méthode analytique. Chaque détermination d'une forme inconnue commence nécessairement par l'étude de ces ouvrages qui présentent un moyen puissant de faciliter le travail entrepris et de réduire le temps indispensable à son accomplissement. La connaissance de ces ouvrages est donc d'une nécessité absolue pour tout systématisateur.

Les monographies et les faunes ne sont pas trop nombreuses, d'ailleurs les titres qu'elles portent permettent presque aussitôt de saisir le contenu de ces travaux avant même de les avoir vues. Et néanmoins même un entomologiste expérimenté, qui avait consacré de longues années à l'étude des Hémiptères paléarctiques, est souvent obligé à faire des recherches préalables dans les nombreux volumes du „Zoological Record“ ou des „Berichte“ avant d'apprendre qu'il existe des monographies des Cicadides ou bien des Psyllides d'Australie, ainsi que les revues où ces articles ont été publiés. Quant aux synopsis détachés, leur nombre, du moins dans l'hémiptérologie, atteint un chiffre assez élevé. Ils ont été publiés dans des revues et dans des ouvrages les plus divers, et il est parfois très difficile, même pour un spécialiste, de s'assurer s'il existe ou non un synopsis des genres d'une tribu ou celui des espèces d'un certain genre donné.

Lorsque j'étais occupé à préparer mon „Katalog der paläarktischen Hemipteren“ qui a paru en 1912, j'ai reçu une lettre du regreté professeur O. M. Reuter, dans laquelle il me conseillait de citer dans mon travail

les noms des articles se rapportant aux faunes, aux monographies et aux synopsis. Parfaitement convaincu que j'étais de l'importance de cette idée, je me trouvais cependant dans l'impossibilité de la réaliser, parce que les citations auraient rendu mon catalogue trop volumineux et auraient retardé outre mesure son apparition. D'ailleurs ces citations n'auraient eu qu'une utilité restreinte, car elles se seraient rapportées seulement aux formes de la faune paléarctique, et les ouvrages traitant les Hémiptères exotiques n'y auraient pas trouvé de place. A cause de ces considérations j'ai préféré de consacrer un travail spécial à la réalisation de l'idée de Reuter. Cette tâche est enfin terminée et j'en présente les résultats à mes collègues.

Pour ce „Vade mecum“ j'ai adopté la méthode suivante. Je cite les catalogues, les faunes, les monographies, les révisions et les synopsis traitant l'ordre des Hémiptères dans son ensemble ainsi que ses subdivisions taxonomiques jusqu'aux variétés; pourtant les groupes: *Aphidoideae*, *Coccoideae* et *Aleuroideae* dont je ne me suis jamais occupé en restent exclus. Considérant que mon travail a un but exclusivement pratique, j'ai cru inutile de citer les ouvrages des auteurs du XVIII et du premier tiers du XIX siècles; même ceux de Linné, de Fabricius et de Latreille y sont omis. Les travaux de ces grands savants, quoique formant époque en entomologie, sont devenus trop surannés et ne présentent actuellement qu'un intérêt exclusivement historique. Un hémiptérologiste ne penserait pas actuellement à les consulter pour la détermination d'une espèce. En 1831 Hahn a commencé la publication de son ouvrage volumineux: „Die wanzenartigen Insekten“; cette oeuvre a conservé jusqu'à l'époque présente une valeur assez considérable, vu le grand nombre de figures coloriées que l'on y trouve. Ainsi, l'année 1831 est la date où commencent mes citations.

Les opinions sur les limites des divers groupes taxonomiques ayant beaucoup varié, la signification attachée aux noms des familles, des genres etc. présente des différences très notables selon l'époque de la publication des ouvrages. Aussi ai-je cru indispensable d'ajouter la date de l'impression de chaque article cité. Mes citations contenant des travaux écrits en langues assez nombreuses, j'ai pensé qu'il ne serait pas superflu de mentionner chaque fois l'idiome de l'article nommé, afin que le lecteur puisse se rendre compte si l'ouvrage est à sa portée.

Les catalogues peuvent être divisés en deux catégories. Les uns ne contiennent que la liste des espèces avec leurs synonymes et leur patrie; comme exemple on peut citer les ouvrages de Dohrn, de Puton ou bien mon „Katalog der paläarktischen Hemipteren“. Je les désigne du nom de „listes“. Dans les seconds on trouve en plus des données sur la littérature concernant les descriptions des genres et des espèces; tels sont les catalogues de Dallas, de Lethierry et Sévérin et de Kirkaldy. Je leur donne le nom „d'énumérations“ parce que le grand ouvrage de Stål „Enumeratio Hemipterorum“ appartient à cette catégorie.

Je cite toutes les monographies parues; quant aux faunes j'en omets celles qui ne contiennent qu'une simple liste des espèces connues, même si l'on y trouve un nombre assez considérable de descriptions des espèces nouvelles. Par contre les faunes dans lesquelles toutes les espèces sont décrites, ainsi que celles qui renferment des synopsis ou bien des données bibliographiques, sont citées dans mon ouvrage.

J'ai tâché de rendre la liste des synopsis, surtout ceux des genres, aussi complète que possible. Il n'est pas facile de les trouver: comme je l'ai déjà dit, ils ont été publiés dans un grand nombre d'ouvrages et d'articles dont les titres ne contiennent parfois aucun indice de leur présence. Ces synopsis sont surtout très nombreux dans les ouvrages de Stål; vu leur grande importance pour la systématique des Hémiptères je les cite tous, sans même excepter les synopsis anciens qui ont été remplacés plus tard par d'autres tableaux analytiques plus complets, écrits par le même auteur.

Les synopsis des espèces peuvent être divisés en deux catégories. A l'aide des uns on arrive à la détermination de l'espèce; les autres, que l'on peut désigner du nom de synopsis partiels, ne visent qu'à un démembrement d'un genre en un nombre de groupes dont chacun contient plusieurs espèces. Les synopsis des espèces donnés par Stål dans son „Enumeratio Hemipterorum“ se rapportent à cette dernière catégorie. Je les exclus de mon „Vade mecum“, tandis que je cite les synopsis de la catégorie précédente.

Les citations dans mon travail étant arrangées dans l'ordre systématique, je crois indispensable d'ajouter quelques mots sur la classification et la nomenclature que j'y ai suivies. Dans les Hétéroptères j'ai adopté le dernier système proposé par Reuter dans son ouvrage: „Bemerkungen über mein neues Heteropteren-System“, et dans les Homoptères j'ai pris pour guide le travail de Kirkaldy: Leaf-Hoppers. Supplement. J'ai cru néanmoins devoir faire quelques changements insignifiants dans le classement de ces deux sous-ordres. Quand à la nomenclature des familles j'ai adopté les vues émises par G. Horváth dans son article: „Nomenclature des familles des Hémiptères“ (Ann. Mus. Natur. Hung. IX, pp. 1—34). J'ai appliqué les mêmes principes aux noms des autres groupes taxonomiques jusqu'aux tribus inclusivement. Grâce à cela j'ai dû changer plusieurs noms donnés par Reuter en 1910, lorsqu'il a rebaptisé quelques uns des groupes qu'il avait désignés antérieurement par d'autres dénominations. J'ai tenu à conserver ces noms plus anciens, ainsi que je l'avais déjà fait dans mon Catalogue. Pour permettre au lecteur de se rendre aisément compte de la classification et de la nomenclature adoptées dans l'ouvrage présent je donne ci-dessous la liste des groupes avec leurs synonymes.

L'arrangement des genres exotiques dans les tribus m'a présenté de grandes difficultés et je suis tout disposé d'admettre que l'ordre dont je me suis servi sera trouvé très défectueux en maintes occasions.

Dans l'ouvrage même je cite les synonymes des familles, des tribus et des genres seulement lorsque leur absence pourrait causer de la confusion ou bien amener un doute.

Dans tout travail basé sur l'étude de la littérature scientifique il est impossible d'éviter complètement les défauts et surtout les omissions; je sais bien que dans le mien ces fautes doivent être assez nombreuses. Cela provient de l'impossibilité de consulter la grande quantité de revues et d'ouvrages traitant l'entomologie. Peut-être serait-on enclin de croire que les recherches bibliographiques ne présentent aucune difficulté à Petrograd où nous avons à notre disposition la magnifique Bibliothèque Impériale Publique, celle de l'Académie Impériale des Sciences qui est encore plus riche en ouvrages zoologiques et enfin la bibliothèque spéciale très complète de la Société Entomologique de Russie. Néanmoins je n'ai pu consulter plusieurs articles, parce que les revues et les annales des sociétés savantes où ils ont été publiés ne se trouvent point dans les bibliothèques mentionnées. J'ai pu combler une grande partie de ces lacunes grâce à l'obligeance de mes honorés confrères qui m'ont fait de nombreux envois des tirages de leurs travaux. Je les prie de vouloir bien agréer mes sincères remerciements pour leur bienveillance gracieuse. Il reste cependant un certain nombre d'articles que je ne connais que par leurs titres mentionnés dans les „Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie“, ainsi que dans le „Zoological Record“. Mais ces publications excellentes sont insuffisantes pour éclaircir toutes les questions spéciales. Les relations internationales étant devenues très difficiles à cause de la guerre, je ne suis pas en état de lever mes doutes par la correspondance. Mon âge avancé ne me permet pas d'attendre le rétablissement de l'état normal entre les peuples de l'Europe. Je me suis décidé donc à publier mon „Vade mecum“ tel qu'il est; les rectifications et les additions nécessaires pourront être faites à une époque plus propice pour l'accomplissement des travaux scientifiques. J'espère que mon ouvrage, qui est loin d'être parfait, pourra pourtant aider les jeunes hémiptérologistes au début de leurs études, et peut-être ne sera-t-il pas sans quelque utilité même pour mes confrères expérimentés en leur fournissant, sous une forme commode, les renseignements qui, cet ouvrage étant absent, exigeraient parfois des recherches longues et laborieuses.

Du reste je ne pouvais me permettre un plus long retard dans la publication de cet article, parce que je le considère comme l'accomplissement d'un devoir qui m'a été légué par le professeur O. M. Reuter, comme un témoignage de la profonde vénération pour les talents et les connaissances exceptionnelles de ce maître en hémiptérologie dont j'ai pu apprécier l'amabilité hors ligne durant la visite, malheureusement trop courte, que je lui ai faite peu d'années avant son décès prématuré.

Liste alphabétique des revues scientifiques citées.

- Abhandlungen der Böhmisches Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. 4°.
- Abhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Wien. 8°.
- Abhandlungen und Berichte des zoologischen und anthropologisch-ethnographischen Museums zu Dresden. Berlin. 4°.
- Acta Societatis Entomologicae Bohemiae. — Časopis České Společnosti entomologické. Praha. 8°.
- Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Helsingfors. 4°.
- Anales de la Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires. 8°.
- Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Wien. 8°.
- Annales de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelles. 8°.
- Annales de la Société Entomologique de France. Paris. 8°.
- Annales du Musée de Congo. Série II. Zoologie. Bruxelles. 4°.
- Annales Musei Nationalis Hungarici. Budapest. 8°.
- Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Genova. 8°.
- Annals and Magazine of Natural History. London. 8°.
- Annals of the Entomological Society of America. Columbus. 8°.
- Anotationes Zoologicae Japonenses. Tokyo. 8°.
- Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie des Sciences. — Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии Наукъ. Петроградъ. 8°.
- Archiv für Naturgeschichte. Berlin. 8°.
- Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands. Dorpat. 8°.
- Berichte des botanisch-zoologischen Vereins in Danzig. 8°.
- Berliner Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem Entomologischen Verein in Berlin. Berlin. 8°.
- Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 8°.
- Bollettino della Società Entomologica Italiana. Firenze. 8°.
- Buletinul Societății de Științe din București-România. București. 8°.
- Bulletin de la Société Entomologique de France. Paris. 8°.
- Bulletin de la Société des Naturalistes. Nantes. 8°.
- Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscou. 8°.
- Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle. Paris. 8°.

Bulletin international de l'Académie de l'Empereur François Joseph I. Prague. 8°.

Bulletin of the American Museum of Natural History. New York. 8°.

Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Buffalo. 8°.

Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History. Peoria. 8°.

Bulletin of the U. S. Geological and Geographical Survey of Territories. Washington. 8°.

Canadian Entomologist, The. London, Canada. 8°.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. Berlin. 8°.

Entomologica americana. Brooklyn. 8°.

Entomological News. and Proceedings of the Entomological Section of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia. 8°.

Entomologische Nachrichten. Berlin. 8°.

Entomologische Zeitung, herausgegeben von dem Entomologischen Verein zu Stettin. Stettin 8°.

Entomologisk Tidskrift, utgifven af entomologiska Föreningen i Stockholm. Stockholm. 8°.

Entomologist, an Illustrated Journal of General Entomology, The. London: 8°.

Entomologist's Monthly Magazine, The. London. 8°.

Faune de la Russie et des pays limitrophes. — Фауна России и сопредельныхъ странъ. Петроградъ. 8°.

Horae Societatis Entomologicae Rossicae. — Труды Русскаго Энтомологическаго Общества. Петроградъ. 8°.

Invertebrata pacifica. Santiago de las Vegas. 8°.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. 8°.

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau. Wiesbaden. 8°.

Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. 8°.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Part II. Natural History. Calcutta. 8°.

Journal of the Cincinnati Society of Natural History. Cincinnati. 8°.

Journal of the New York Entomological Society. New York. 8°.

Journal of the Sapporo Agricultural Colledge. Sapporo. 8°.

Linnea entomologica. Stettin. 8°.

Magasin de Zoologie. Paris. 8°.

Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Helsingfors. 8°.

Mémoires de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelles. 8°.

Mémoires de la Société Zoologique de France. Paris. 8°.

Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 8°.

Memorie di Matematica e di Fisica della Società Italiana di Modena. 4°.

Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Schaffhausen. 8°.

Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. Graz. 8°.

Naturalista Siciliano, Il. Organo della Società dei Naturalisti Siciliani. Palermo. 8°.

Naturhistorisk Tidskrift. Kjöbenhavn. 8°.

Notes from the Leyden Museum. Leyden. 8°.

Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar. Helsingfors. 8°.

Novitates Zoologicae. A Journal of Zoology. Tring. 8°.

Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. Helsingfors. 8°.

Öfversigt af k. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Stockholm. 8°.

Ohio Naturalist, The. Published by the Biological Club of the Ohio State University. Columbus. 8°.

Ohio State University Bulletin. Columbus. 8°.

Pomona Journal of Entomology. Claremont. 8°.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia. 8.

Proceedings of the Davenport Academy of Natural Sciences. Davenport. 8°.

Proceedings of the Hawaiian Entomological Society. Honolulu. 8°.

Proceedings of the Iowa Academy of Sciences. Des Moines. 8°.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Sidney. 8°.

Proceedings of the U. S. National Museum. Washington. 8°.

Psyche, a Journal of Entomology. Cambridge, U. S. 4°.

Report of Iowa Academy of Sciences. Des Moines. 8°.

Revue d'Entomologie publiée par la Société française d'Entomologie. Caen. 8°.

Revue de Zoologie Africaine. Bruxelles. 8°.

Revue et Magasin de Zoologie. Paris. 8°.

Revue Russe d'Entomologie. — Русское Энтомологическое Обозрѣніе. Петроградъ. 8°.

Rovartani Lapok. Budapest. 8°.

Rozprawy Česke Akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy slovestnost a umení. Praha. 8°.

Sitzungsberichte der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. 8°.

Sitzungsberichte der Gesellschaft der naturforschenden Freunde zu Berlin. Berlin. 8°.

Societas Entomologica, Organ für den internationalen Entomologen-Verein. Zürich. 4°.

Stettiner Entomologische Zeitung. — Conf. Entom. Zeit.

Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm. 4°.

Termeszetráji Füzetek. Budapest. 8^o.

Tijdschrift voor Entomologie, uitgeven door de Nederlandsch entomologische Vereeniging. 'SGravenhage. 8^o.

Transactions of the American Entomological Society. Philadelphia. 8^o.

Transactions of the Entomological Society of London. London. 8^o.

Transactions of the Sapporo Natural History Society. Sapporo. 8^o.

Труды Русскаго Энтомологическаго Общества. С.-Петербургъ. 8^o.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Wien. 8^o.

Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn. Brünn. 8^o.

Věstník Českí Společnosti Nauk v Praze. — Stzber. Böhm. Ges. Prag. 8^o.

Věstník Klubu Přírodovědeckého v Prostějově. 8^o.

Wiener Entomologische Monatsschrift. Wien. 8^o.

Wiener Entomologische Zeitung. Wien. 8^o.

Записки Туркестанскаго Отдѣла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи. Ташкентъ. 8^o.

Zeitschrift der wissenschaftlichen Insektenbiologie. Berlin. 8^o.

Zoologischer Anzeiger, zugleich Organ der Deutschen Zoologischen Gesellschaft. Leipzig. 8^o.

Table des groupes taxanomiques des Hémiptères jusqu'aux sous-familles inclusivement.

Subordo Heteroptera.

Series I. Polyneuria

Superf. Pentatomoideae.

Phal. Aphyliformes.

Fam. 1. Aphylidae.

Phal. Plataspidiformes.

= *Coptosmatiformes* Reut.

Fam. 2. Plataspidae.

= *Coptosomatidae* Kirk.

Phal. Pentatomiformes.

Fam. 3. Cydnidae.

= *Thyreocoridae* Kirk.

Fam. 4. Pentatomidae.

Subf. Asopinae.

— Cyrtocorinae.

— Scutellerinae.

— Discocephalinae.

— Graphosominae.

— Pentatominae.

— Acanthosominae.

— Urostylinae.

— Dinidorinae.

— Phloeinae.

— Phyllocephalinae.

— Tesseratominae.

Superf. Coreoideae.

Fam. 5. Coreidae.

Subf. Merocorinae.

— Coreinae.

— Pseudophloeinae.

— Alydinae.

— Corizinae.

Fam. 6. Hyocephalidae.

Series II. Phloeobiotica.

Superf. Aradoideae.

Fam. 7. Dysodiidae.

Fam. 8. Aradidae.

Series III. Onychiophora.

Superf. Lygaeoideae.

= *Neidoideae* Reut.

Phal. Lygaeiformes.

= *Neidiformes* Reut.

Fam. 9. Berytidae.

= *Neididae* Reut.

Fam. 10. Colobathristidae.

Fam. 11. Lygaeidae.

= *Myodochidae* Kirk.

Subf. Lygaeinae

— Chauliopinae

— Cyminae

— Blissinae.

— Henestarinae.

— Geocorinae.

— Artheneinae.

— Heterogastrinae.

— Pachygronthinae.

— Oxycareninae.

— Bledionotinae.

— Aphaninae.

Phal. Pyrrhocoriformes.

Fam. 12. Pyrrhocoridae.

Subf. Larginae.

— Pyrrhocorinae.

Phal. Thaumastocoriformes.

Fam. 13. Thaumastocoridae

Series IV. Anonychia.

Superf. Tingitoïdeae.

Fam. 14. Piesmidae.

Fam. 15. Tingitidae.

Superf. Reduvioïdeae.

Phal. Henicocephaliformes.

Fam. 16. Henicocephalidae.

Phal. Reduviiformes.

Fam. 17. Phymatidae.

= *Macrocephalidae* D h r n.

Fam. 18. Reduviidae.

Subf. Emesinae.

— Bactrodinae.

— Saicinae.

— Tribelocephalinae.

— Stenopodinae.

— Salyavatinae.

— Holoptilinae.

— Reduviinae.

— Piratinae.

— Ectrichodiinae.

— Hammatocerinae.

— Apiomerinae.

— Harpactorinae.

Phal. Joppeicidiformes.

Fam. 19. Joppeicidae.

Phal. Hebriformes:

= *Naeogeiformes* Reut.

Fam. 20. Mesoveliidae.

Fam. 21. Hebridae.

= *Naeogeiidae* Kirk. Reut.

Phal. Nabiformes.

Fam. 22. Nabidae.

Subf. Pachynominae.

— Prostemmae.

= *Nabinae* Kirk.

— Nabinae.

= *Reduviolinae* Kirk.

Superf. Cimicoïdeae.

Phal. Cimiciformes.

Fam. 23. Polycetenidae.

Fam. 24. Cimicidae.

Fam. 25. Anthocoridae.

Fam. 26. Microphysidae.

Fam. 27. Termatophylidae.

Phal. Capsiformes.

= *Miriformes* Reut.

Fam. 28. Capsidae.

= *Miridae* D h r n.

Subf. Capsinae

= *Mirina* Reut.

— Bothynotinae.

— Cylapinae.

— Ambraciinae.

— Bryocorinae.

— Dicyphinae.

= *Macrolophina* Reut.

— Cyllacorinae.

= *Heterotomina* Reut.

— Plagiognathinae.

= *Phylina* Reut.

— Lygaeoscytinae.

Fam. 29. Isometopidae.

Series V. Trichotelocera.

Superf. Ceratocomboïdeae.

= *Dipsocoroïdeae* Reut.

Fam. 30. Ceratocombidae.

= *Dipsocoridae*. D h r n.

Fam. 31. Schizopteridae.

Series VI. Hydrobiotica.

Superf. Gerroïdeae.

Phal. Hydrometriformes.

Fam. 32. Hydrometridae.

Phal. Gerriformes.

Fam. 33. Veliidae.

Fam. 34. Gerridae.

Superf. Acanthioïdeae.

Phal. Aëpophiliformes.

Fam. 35. Aëpophilidae.

Phal. Acanthiiformes.

Fam. 36. Leptopodidae.

Fam. 37. Acanthiidae.

Fam. 38. Velocipedidae.

Superf. Notonectoïdeae.

Phal. Notonectiformes.

Fam. 39. Notonectidae.

Subf. Ploeinae.

— Notonectinae.

Phal. Nepiformes.

Fam. 40. Naucoridae.

Fam. 41. Nepidae.

Fam. 42. Belostomidae.

Superf. Ochteroïdeae.

- Phal. Peloridiformes.
 Fam. 43. Pelorididae.
 Phal. Ochteriformes.
 Fam. 44. Mononychidae.
 = *Nerthridae* Kirk.
 Subf. Mononychinae.
 — Gelastocorinae.
 = *Galgulinae* Billb.
 Fam. 45. Ochteridae.
 Series VII. Sandaliorhyncha.
 Superf. Corixoïdeae.
 Fam. 46. Corixidae.
 Subordo Homoptera.
 Series VIII. Auchenorhyncha.
 Superf. Cicadoïdeae.
 Fam. 47. Cicadidae.
 Subf. Cicadinae.
 — Gaeaninae.
 — Tibicininae.
 Fam. 48. Cercopidae.
 Subf. Cercopinae.
 — Aphrophorinae.
 — Machaerotinae.
 Fam. 49. Membracidae.
 Subf. Tragopinae.
 — Smiliinae.
 — Darninae.
 — Hoplophorinae.
 — Membracinae.
 — Centrotinae.
 — Aethalioninae.
 Fam. 50. Jassidae.
 = *Tetigoniidae* Kirk.
 Subf. Ulopinae.
 — Megophthalminae.
 — Scarinae.
 = *Ledrinae*.
 — Proconiinae.
 = *Tetigoniinae* Am.
 Serv.
 — Bythoscopinae.
 — Jassinae.
 — Typhlocybinae.
 = *Eupteryginae* Kirk.
 Superf. Fulgoroïdeae.
 Fam. 51. Fulgoridae.
 Fam. 52. Cixiidae.
 Subf. Dictyopharinae.
 — Cixiinae.
 Fam. 53. Delphacidae.
 = *Asiracidae* Kirk.
 Fam. 54. Achilidae.
 Fam. 55. Tropiduchidae.
 Fam. 56. Derbidae.
 Fam. 57. Lophopidae.
 Fam. 58. Eurybrachydididae.
 Fam. 59. Issidae.
 Fam. 60. Tettigometridae.
 Fam. 61. Flatidae.
 = *Poekillopteridae* Kirk.
 Subf. Ricaniinae.
 — Acanaloniinae.
 — Flatinae.
 = *Poikillopterinae* Kirk.
 Series IX. Sternorhyncha.
 Superf. Psylloïdeae.
 Fam. 62. Psyllidae.
 Superf. Aphidoideae.
 Superf. Aleurodoïdeae.
 Superf. Coccoïdeae.
 Les trois derrières superfamilles
 ne sont pas traitées dans mon Vade
 mecum. Quant-aux Pédiculides et aux
 Mallophages elles constituent un
 ordre distinct — les *Pseudorhyn-*
chota Chlodk.

Ordo HEMIPTERA.

Catalogues généraux.

1. A. Dohrn. *Catalogus Hemipterorum*. Herausgegeben von dem Entomologischen Verein zu Stettin. Stettin, 1859, 8°, 112 pp. — Liste des espèces avec leurs synonymes.
2. Horváth. *Nomenclature des familles des Hémiptères*. *Annal. Mus. Nation. Hung.*, 9, 1911, pp. 1—34. — Énumération des familles et de leurs synonymes. Préface française.

Catalogues des espèces paléarctiques.

3. Puton. *Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) de la faune paléarctique*. 4^{me} édition. Caen, 1899, 8°, 121 pp. — Liste des espèces avec leurs synonymes.
4. Oshanin. *Katalog der paläarktischen Hemipteren. (Heteroptera, Homoptera-Auchenorrhyncha und Psyllotidae)*. Berlin, 1912, 8°, 187 pp. — Liste des espèces avec leurs synonymes.
5. Oshanin. *Verzeichnis der paläarktischen Hemipteren mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verteilung im Russischen Reiche*. St. Petersburg, 8°. 1906—1910. Vol. 1, LXXIV+1087 pp.; 2, XVI+492 pp., 3, XVI+217 pp. — Énumération des espèces, avec indications plus détaillées de leur distribution en Russie. Allemand.
6. Douglas and Scott. *A Catalogue of British Hemiptera: Heteroptera and Homoptera (Cicadaria and Phytophthires)*. London 1876, 8°, 99 pp. — Énumération des espèces. Anglais.

Ouvrages d'ensemble.

7. Burmeister. *Handbuch der Entomologie*. 2 Bnd., 1 Abt. Schnabelkerfe. Rhynchota. Berlin, 1835, 8°, 400 pp., 2 tt. — Synopsis des familles et des genres. Allemand.
8. Amyot et Sèrville. *Histoire naturelle des Insectes. Hémiptères*. Paris, 1843, 8°, LXXVI+672 pp., 12 tab. color. — Synopsis et caractéristiques des familles, de leurs subdivisions et des genres. Français.
9. Stål. *Hemiptera Fabriciana*. Vol. 1, Kon. Sv. Vet. Akad. Handl. 7, № 11, 1868, 4°, 148 pp. et Vol. 2, ibidem 8, № 1, 1869, 130 pp. — Beaucoup de synopsis de genres et d'espèces. Latin.

10. Spinola. Tavola sinottica dei generi spettanti alla classe degli Insetti Arthrognati Hemiptera Linn., Rhyngota Fabr., Rhynchota Burm. Mem. di Mat. e di Fisica d. Soc. Ital. di Modena 25, prt. 1, 1852. Pp. 43—100. — Synopsis des familles et des genres. Latin.
11. Spinola. Di alcuni generi d'Insetti Arthrognati nuovamente proposti. L. c. pp. 101—178. — Caractères détaillés des genres nouveaux mentionnés dans l'ouvrage précédent. Latin.
12. [Synopsis des sous-ordres et des familles]. Osborn. Entomologica americana 1, 1885, pp. 25—27. — Anglais.

Faunes.

13. Breddin. Hemiptera [in] Fauna arctica herausg. von Römer und Schaudin. 2, 1902, pp. 531—560. — Énumération des espèces connues de la zone arctique. Allemand.
14. Flor. Die Rhynchoten Livlands in systematischer Folge beschrieben. Bd. 1. Rhynchota Frontirostria. Arch. f. d. Naturk. Liv-, Est- und Kurlands. 3. 1860, 825 pp.; Bd. 2. Cicadina und Psyllodea. Ibidem 4, 1861, 637 pp.; 8°. — Synopsis des genres et des espèces de la Livonie; descriptions détaillées. Allemand.
15. Amyot. Entomologie française. Rhychotes. Méthode mononymique. Ann. Soc. Ent. France (2). 3, 1845, pp. 369—492, pl. 8, 9; (2), 4, 1846, pp. 73—192, 359—452, pl. 10; (2), 5, 1847, pp. 143—238, 453—524, pl. 2, 7. Edition séparée Paris, 1848. 8°. 504 pp., 5 tt. — Arrangement synoptique; les noms adoptés dans cet ouvrage ne sont pas valables, l'auteur n'ayant pas suivi la nomenclature binominale. Français.
16. Stål. Hemiptera africana. Holmiae. Vol. 1—4, 1864—1866. 8°. 256+181+200+275 pp. — Faune de la région éthiopienne; synopsis et description des genres et des espèces; dans plusieurs familles les synopsis génériques contiennent non seulement les formes africaines, mais aussi celles qui se trouvent dans l'Ancien Monde ou même sur toute la surface du globe; ces synopsis sont cités plus bas; les Psyllides sont exclues. Latin.
17. Distant. The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Rhynchota. London. 1, 1902, 438 pp., 2, 1904, 503 pp.; 3, 1906, 503 pp.; 4, 1908, 501 pp.; 5, 1910, 362 pp. — Synopsis des genres, diagnoses de toutes les espèces; beaucoup de figures dans le texte; les Psyllides sont exclues. Anglais.
18. Stål. Hemiptera insularum Philippinarum. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1870, pp. 670—776, pl. VII—IX. — Énumération des espèces, descriptions des espèces nouvelles; plusieurs synopsis des genres et des espèces de la faune philippine; les Psyllides manquent. Latin.
19. Breddin. Die Hemipteren von Celebes. Ein Beitrag zur Faunistik der Insel. Stuttgart. 1901, 8°, 213 pp., 1 t. — Liste des es-

- pèces connues, descriptions de beaucoup d'espèces nouvelles; zoogéographie de l'île. Allemand.
20. Kirkaldy. *Hemiptera* [des îles Hawaïi] dans: Fauna Hawaïiensis, 3, prt. 2, 1902, pp. 93—102, tab. 4, 5 color.; 2, prt. 6, pp. 531—599. — Énumération des espèces de l'ordre entier; quelques synopsis: les Psyllides sont incluses. Anglais.
 21. Kirkaldy. A list of the described Hemiptera of the Hawaiian Islands. Proc. Hawaiian Ent. Soc. 1, 1908, pp. 186—208, t. 4. — Je n'ai pas vu cet article.
 22. Kirkaldy. Catalogue of the Hemiptera of Fiji. Proc. Linn. Soc. New South Wales 33, 1908, pp. 345—391. — Énumération des espèces. Anglais.
 23. Provancher. Petite faune du Canada et particulièrement de la province de Quebec. Vol. 3. Les Hémiptères. Quebec. 1890, 8^o, 354 pp., 5 tab. — Synopsis et courtes descriptions des genres et des espèces. Français.
 24. Stål. Bidrag till Rio-Janeiro-traktens Hemipter-Fauna. Vol. 1—2. Kong. Sv. Vet. Akad. Handl. 2, № 1, 1860, 84 pp., et 3, № 6, 1861, 70 pp. — Énumération des espèces de la province de Rio-Janeiro; descriptions de beaucoup de formes nouvelles; plusieurs synopsis. Latin.
 25. C. Berg. *Hemiptera argentina*. Anal. Soc. Cient. Argent. 5, 1878, pp. 231 et 297; 6, 1878, pp. 23, 82, 129, 179, 223 et 261; 7, 1879, pp. 41, 86, 225 et 262; 8, 1879, pp. 19, 71, 135, 178, 209 et 241; 9, 1880, pp. 5 et 58. [Reimprimé à] Bonariae. 1879, 8^o, 316 pp.
 26. C. Berg. Addenda et emendanda ad *Hemiptera argentina*: L. c. 15, 1883, pp. 193 et 241; 16. 1883, pp. 5, 73, 105, 180, 231 et 285; 17, 1884, pp. 20, 97 et 166. [Réimprimé à] Bonariae, 1884, 8^o, 213 pp.
 27. C. Berg. *Nova Hemiptera faunarum Argentinae et Uruguayensis* L. c. 32, 1891, pp. 164, 231, 277; 33, 1892, pp. 5, 43, 65, 97, 151; 34, 1892, pp. 82 et 193. [Tirage à part] Bonariae, 1891—1892, 8^o, 112 pp. — Ces trois ouvrages de C. Berg contiennent l'énumération de toutes les espèces connues de l'Argentine et de l'Uruguay, des descriptions de plusieurs genres et de beaucoup d'espèces nouvelles. Espagnol, diagnoses des formes nouvelles en latin.

Subordo HETEROPTERA.

Catalogues.

28. Lethierry et Sévérin. Catalogue général des Hémiptères. 8^o. Vol. 1, Bruxelles, 1893, 286 pp.; 2, Bruxelles, 1894, 277 pp.; 3, Berlin, 1896, 275 pp. — Énumération des espèces du monde; la famille des Capsides et le groupe des Cryptocérates n'ont pas paru. Préface française.

29. Dallas. List of the specimens of Hemipterous Insects in the collection of the British Museum. London. 12^o Prt. 1, 1851, pp. 1—368, tab. 1—11; prt. 2, 1852, pp. 369—592, tab. 12—15. — Sont traitées la superf. *Pentatomoideae* et les fam. *Coreidae*, *Lygaeidae* et *Anthocoridae*; synopsis de tous les genres et des espèces de plusieurs genres; descriptions des genres et d'espèces nouvelles. Je ne les cite pas ci-dessous, vu leur ancienneté. Anglais, diagnoses des formes nouvelles en latin.
30. Walker. Catalogue of the specimens of *Hemiptera-Heteroptera* in the collection of the British Museum. London. 8^o. 1, 1867, pp. 1—240; 2, 1867, pp. 241—418; 3, 1868, pp. 419—599; 4, 1871, 211 pp.; 5, 1872, 202 pp.; 6, 1873, 210 pp.; 7, 1873, 213 pp.; 8, 1873, 220 pp. — Énumération de toutes les espèces connues; quelques synopsis, que je ne cite pas ci-dessous; descriptions très incomplètes des formes nouvelles; ouvrage défectueux. Anglais, diagnoses latines.
31. Baerensprung. Catalogus Hemipterorum Europae. *Hemiptera-Heteroptera* europaea systematice disposita. Berlin, 1860: Separat-Abdruck aus d. Berl. Entom. Zeit. 4, 25 pp. — Liste ne présentant actuellement qu'un intérêt historique. Latin.
32. Uhler. Check-List of the Hemiptera Heteroptera of North America. Brooklyn, 1886, 8^o, 29 pp. — Liste des espèces de la faune du Canada, des Etats Unis, du Mexique et des Antilles. Latin et anglais.
33. Banks. Catalogue of the Nearctic Hemiptera-Heteroptera. Philadelphia 1910, 8^o, 103 pp. — Énumération des espèces néarctiques; donnés bibliographiques et géographiques insuffisantes. Anglais.

Classification.

Familles.

34. Schiödde. Nogle nye Hovedsaetninger af Rhynchoternes Morphologi og Systematik. Naturh. Tidskr. (3) 11, 1870, pp. 237—266. — Morphologie des Hémiptères, valeur systématique de la structure des organes divers; synopsis des familles. Danois.
35. Reuter. Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der Miriden nebst einleitenden Bemerkungen über die Phylogenie der Heteropteren-Familien. Acta Soc. Sc. Fennicae 37, № 3, 1910, 171 pp. — Révision et critique des diverses classifications proposées; valeur des caractères; essai de phylogénèse. Ouvrage fort important. Allemand et latin.
36. Reuter. Bemerkungen über mein neues Heteropteren-System. Öfv. Finska Vetensk.-Soc. Förh. 54, № 6, 1912, 62 pp. — Addenda et emendanda à l'ouvrage précédant. Allemand et latin.

Synopsis des familles.

37. Jakovlev. Horae Soc. Entom. Ross. 18, 1884, pp. 148—151. — Russe.
38. Kirkaldy. Canadian Entom. 1908, pp. 159—362. — Anglais.
39. Reuter. Acta Soc. Scient. Fennicae 37, № 3, 1910, pp. 79—89. — Latin.
40. Reuter. Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. 54, № 6, 1912, pp. 49—62. — Latin.

Genres et espèces.

41. Laporte de Castelnau. Essai d'une classification systématique de l'ordre des Hémiptères. (Hémiptères-Hétéroptères Latr.) Guérin Magas. d. Zool. 1832, tome 2, № 52—55, tab. 1—5. — Synopsis et caractéristiques des familles et des genres. Français.
42. Spinola. Essai sur les genres d'Insectes appartenant à l'ordre des Hémiptères Lin. ou Rhynogotes Fab. et à la section des Hétéroptères Duf. Gênes, 1837, 8^o — 2^e édit. Paris, 1840, 8^o, 383 pp. — Synopsis des familles et des genres. Français.
43. Hahn und Herrich Schäffer. Die wanzenartigen Insekten getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. Nürnberg. 8^o. Bd. 1—9 und Alphabetisch-systematisches Verzeichnis. 1831—1853. Tab. col. 354. — Descriptions d'une grande quantité de formes; beaucoup de synopsis d'espèces et de genres qui ne sont pas cités ci-dessous, vu leur utilité minime à l'époque actuelle; ouvrage dont l'importance est fondée surtout sur le grand nombre d'espèces qui y sont figurées. Allemand.
44. Stål. Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en företeckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden. Vol. I. K. Svensk. Vet.-Akad. Handl. 9, № 1, 1870, 232 pp.; vol. II, l. c. 10, № 4, 1872, 159 pp.; vol. III, l. c. 11, № 2, 1873, 163 pp.; vol. IV, l. c. 12, № 1, 1874, 186 pp.; vol. V, l. c. 14, № 4, 1876, 162 pp. — Énumération des espèces appartenant à presque toutes les familles des Hétéroptères; beaucoup de synopsis de genres et d'espèces; descriptions des formes nouvelles. Ouvrage indispensable pour la détermination des genres exotiques. Latin.

Faunes.

45. Fieber. Die europäischen Hemipteren. Halbflügler (*Rhynchota-Heteroptera*), nach der analytischen Methode bearbeitet. Wien, 1861, 8^o, 444 pp. — Genres et espèces arrangés synoptiquement; ouvrage qui a conservé son importance même à présent, mais qui présente des difficultés considérables pour les personnes commençant leurs études hémiptérologiques. Allemand.
46. Reuter. Finlands och den Skandinavisk Halföns *Hemiptera-Heteroptera*. Entomolog. Tidskr. 1, 1880, pp. 113—145; 2, 1881, pp. 61—93; 3, 1882, pp. 65—81, 105—121, 163—172; 5, 1884, pp. 173—185.

- Synopsis et descriptions concises des genres et des espèces de la Finlande et de la Scandinavie appartenant aux superfamilles *Pentatomoideae*, *Coreoideae*, *Lygaeoideae*, *Aradoideae*, *Tingitoideae*, *Reduvioideae* et *Gerroideae*. Ouvrage fort utile et très pratique. Suédois.
47. R. F. Sahlberg. *Monographia Geocorisarum Fenniae*. Helsingfors. 1848. 154 pp. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces de Finlande; les Cryptocérates et les Amphibocorises ne sont pas incluses dans cet ouvrage. Latin.
 48. J. Sahlberg. *Enumeratio Hemipterorum Gymnoceratorum Fenniae*. Medd. Soc. pro Faun. Flora Fennica 7, 1881, pp. 1—109. — Énumération des Gymnocérates de la Finlande. Suédois.
 49. Jansen-Haarup. *Taegeter [in] Danmarks Fauna. Håndbøger over den Danske-Dyreverden utgivet af Naturhistorisk Forening*. København, 8°. Vol. 12, 1912, 300 pp., 171 ff. dans le texte. — Synopsis et courtes descriptions des genres et des espèces de la faune du Danemark. Danois.
 50. Douglas and Scott. *The British Hemiptera*. Vol. 1, *Hemiptera-Heteroptera*. London. 1865, 8°. 627 pp., 21 tt. — Descriptions assez détaillées des genres et des espèces; figures excellentes. Anglais.
 51. Saunders. *Synopsis of the British Hemiptera-Heteroptera*. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, pp. 117—159, 245—306; 1876 pp. 613—655, tab. 12. — Anglais.
 52. Saunders. *The Hemiptera-Heteroptera of the British Islands*. London. 1892, 8°, 350 pp., 32 tab. col. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces; beaucoup d'espèces figurées. Anglais.
 53. Guérin et Péneau. *Faune entomologique armoricaine. Hémiptères. Hétéroptères*. 1, 2 et 3-me Familles: Pentatomides, Coréides, Berytides. Supplément du Bull. d. l. Soc. Sc. et méd. de l'Ouest, Rennes, 1903. (Tirage à part: Rennes, 1904, 8°, pp. XVIII, 44+28+8); 4-me Famille Lygaeides, Rennes, 1905, 8°, pp. 84. — Synopsis et courtes descriptions des genres et des espèces de la Bretagne. Nombreuses figures dans le texte. Ces deux livraisons ne contiennent que les familles: *Plataspidae*, *Cydnidae*, *Pentatomidae*, *Pyrhrocoridae*, *Berytidae*, *Lygaeidae*, il n'est pas fait mention d'autres livraisons dans le „Record“. Français.
 54. Snellen van Vollenhoven. *De inlandsche Hemipteren beschreven en meerendels och afgebeeld*. Tijdschr. v. Entom. 11, 1868, pp. 129—172, tt. 5, 6; 12, 1869, pp. 49—74, tt. 1, 2; 13, 1870, pp. 263—302, tt. 11, 12; 16, 1873, pp. 75—122, tt. 5—7; 18, 1875 pp. 150—185, tt. 8—10; 19, 1876, pp. 65—132, tt. 3—5. — Synopsis et courtes descriptions des genres et des espèces de la faune des Pays-Bas; figures des planches en partie coloriées. Les sections *Hydrobiotica* et *Sandaliorrhyncha* manquent. Hollandais.

55. De Jonck. Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg. 40, 1896, pp. 237—240, 480—494; 41, 1897, pp. 121—127; 43, 1898, pp. 6—20, 611—618. — Synopsis des familles, des genres et des espèces de la faune belge; plusieurs familles manquent. Français.
56. Hübner. Fauna Germanica. *Hemiptera-Heteroptera*. (Die Halbflügler der Schnabelkerfe: Wanzen). Systematisches Verzeichnis der bis jetzt in Deutschland gefundenen Wanzen nebst Angaben ihrer Fundorte, Benennungen und Beschreibungen. Ulm. Heft 1—3, 1891—1893, 8°, 520 pp. — Énumération des espèces de l'Allemagne; les Capsides et les Cryptocérates manquent; bibliographie sur la distribution en Allemagne et dans les contrées limitrophes très complète. Allemand.
57. Puton. Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères de France. 8°. Vol. I, prt. 1. Lygéides. Paris, 1878, pp. 1—82; prt. 2. Tingitides, Phymatides, Aradides, Hébrides, Hydrométrides. Paris, 1879, pp. 83—169; prt. 3. Réduvides, Saldides, Hydrocorises. Remiremont 1879, pp. 161—243; Vol. II, prt. 4. Pentatomides, Coréides, Berytides. Remiremont 1881, pp. 1—129. — Ouvrage très pratique; avec son aide la majeure partie des espèces européennes peut-être déterminée facilement; les Capsides n'ont pas paru. Français.
58. Ferrari. Hemiptera Agri Ligustici hucusque lecta. Ann. Mus. Civ. Genova 6, 1874, pp. 114—208.
59. Ferrari. Hemiptera Ligustica adjecta et emendata. L. c. 12, 1878, pp. 60—96. — Ces deux articles contiennent l'énumération des Hétéroptères de la Ligurie; synopsis des espèces de plusieurs genres, surtout dans le second article. Latin.
60. A. Costa. Cimicum Regni Neapolitani Centuriae. Napoli 4°. Centur. 1, 1836, 76 pp., 1 tab.; 2, decas 1—5, 1843, 43 pp., tab. 2, 3; 2, dec. 6—10, 1847, 41 pp., tab. 1—3 col.; 3 et 4, 1852, 73 pp., tt. 1—3; — Additamenta 1860, 41 pp., tt. col. 1—3. — Latin.
61. Kolenati. Meletemata entomologica. 8°. Fasc. II, Hemiptera Caucasi. Tesseratomidae monographice dispositae. Petropoli 1845, 132 pp., tab. col. 3—11; fasc. IV. Hemiptera Caucasi. Pentatomidae monographice dispositae. Petropoli, 1846, 72 pp., tab. col. 15, 16; fasc. VI. Hemipterorum Heteropterorum Caucasi Harpagocorisidae synoptice dispositae. Bull. Soc. Nat. Moscou 1856, 2, pp. 419—497, tab. col. 3. — Synopsis des genres et des espèces du Caucase et de la Transcaucasie. Latin.
62. Summers. The true Bugs, or Heteroptera, of Tennessee. Bull. Agric. Exper. Station Univ. Tennessee 4, 1891, pp. 75—95. — Synopsis des familles, et des genres de quelques familles; présente une certaine utilité aux commençants. Anglais.
63. Distant and Champion. Rhynchota-Heteroptera [in] Godman and Salvin. Biologia Centrali-Americana 4°. Vol. I, 1880—1093, 462 pp., 39 tab. col.; Vol. II, 1897—1901, 416 pp., 22 tab.

- color. — Énumération des espèces de la faune de l'Amérique centrale; synopsis des espèces de plusieurs genres; descriptions des formes nouvelles; une grande quantité d'espèces figurées sur les planches coloriées d'une très belle exécution. Anglais.
64. Reed. Synopsis de los Hemipteros de Chile. *Revista chilena* 2, 5, 1898—1901, passim. — Je n'ai pas vu cet ouvrage et je ne sais pas s'il a été terminé. Espagnol.
65. C. Berg. Rectificaciones y anotaciones à la „Synopsis de los Hemipteros de Chile“ de Edwin C. Reed. *Ann. Mus. Buenos-Aires* 7, 1900, pp. 81—91. — Indispensable à consulter lorsque on se sert du synopsis précédent. Espagnol.

Series Polyneuria.

Faunes:

66. [de Bretagne]. Conf. Guérin et Péneau n. 53.
67. Gorski. *Analecta ad entomographiam provinciarum occidentali meridionalium Imperii Rossici*. Berolini 1852, 8^o, 163 pp. — Descriptions des espèces de la faune de Lithuanie et de Volynie. Latin.

Superf. Pentatomoideae.

Catalogue.

68. Bergroth. *Enumeratio Pentatomidarum post catalogum Bruxelensem descriptarum*. *Mém. Soc. Entom. Belg.* 15, 1908, pp. 131—200 et 22, 1913, p. 150. — Addenda à l'énumération contenu dans le catalogue de Lethierry et Sévérin; indispensable à consulter pour les *Cydnidae* et les *Urostylinae* qui manquent dans le catalogue de Kirkaldy. Latin.

Faunes.

69. Mulsant et Rey. *Histoire naturelle des Punaises de France*. Paris. 8^o. Scutellérides, 1865, 109 pp.; Pentatomides, 1866, 365 pp. — Synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces; ouvrage important. Français.
70. Snellen van Vollenhoven. *Essai d'une faune entomologique de l'Archipel Indo-Néerlandais*. La Haye, 4^o. 1^{re} monographie fam. des Scutellérides [= *Plataspidae* + *Scutellerinae* + *Graphosominæ*] 1863, 60 pp.; 4 tab. col.; 3-me monographie: fam. des Pentatomides, 1 partie [= *Cydnidae* + *Asopinae* + *Tesseratominæ* + *Dinidorinae*] 1868, 49 pp., 4 tab. col. — Français, diagnoses latines.
71. Summers. A generic synopsis of nearctic *Pentatomidae*. *Proc. Jowa Acad. Nat. Sc.* 1898, pp. 40—46. — Je n'ai pas vu cet article.

Fam. Aphylidae.

72. Schouteden. Genera Insectorum dirigés par Wytsman, fasc. 47. *Heteroptera*, Fam. *Pentatomidae*, subf. *Aphylinae*. Bruxelles, 1906 4^o, 4 pp. 1 t. col. — Caractéristique détaillée de la famille et du genre unique; énumération des espèces. Français.

Fam. Plataspidae.

(= *Coptosomatidae* Reut.).

Catalogue.

73. Kirkaldy. Catal. of the Hemiptera-Heteroptera 1, 1909, pp. 316—314. — Conf. n^o 88.

Genres et espèces.

74. Stål. Enumer. Hemipter. 5, 1876, pp. 3—16. — Synopsis des genres et énumération des espèces. Latin.
75. [Addenda au synopsis précédent]. Kuhlitz. Sitzungsber. d. naturf. Freunde. Berlin. 1900, pp. 134—136. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

76. [*Coptosoma* Lap.]. Jakovlev. Труды Русск. Энт. Общ. 11, 1880, p. 202. — Contient les espèces de Russie. Russe.
77. [*Coptosoma* Lap.]. Kuhlitz. Arch. f. Naturg. 1901, Beiheft, pp. 205—259; tt. 8, 9. — Contient les espèces appartenant à la section de *C. cinctum* Esch. Allemand.
78. [*Plataspis* Westw.]. Haglund. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1894, pp. 391—392. — Ne se rapporte qu'aux individus mâles. Latin.

Fam. Cydnidae.

Catalogue.

79. Stål. Enumer. Hemipter. 5, 1876, pp. 17—27. — Énumération des espèces extra-européennes. Latin.

Monographie.

80. Signoret. Révision du groupe des Cydnides. Ann. Soc. Ent. France (6), 1, 1881, pp. 25—52, 193—218, 319—332, 423—436, tab. 1, 2, 6—8, 10—12; (6) 2, 1882, pp. 23—42, 145—168, 241—266, 465—484, tab. 1, 2, 6—9, 13, 14; (6) 3, 1883, pp. 33—60, 207—220, 357—374, 517—534, tt. 3—5, 9, 10, 15, 16; (6) 4, 1884, pp. 45—62, 117—128, tt. 2, 3. — Synopsis des genres; descriptions des espèces dont un grand nombre est figuré. Français.

Faune.

81. [Rég. néarctique.] Uhler. Bull. of the U. S. Geolog. and Geogr. Survey of Territories (2), 3, 1877, pp. 366—398. — Synopsis des genres; descriptions des genres et des espèces néarctiques. Anglais.

Genres.

82. [Synopsis des genres voisins du g. *Sehirus* Am. et Serv.]. Signoret. Ann. Mus. Civ. Genova 16, 1881, pp. 655—657. — Français.
83. [Addenda au synopsis des genres de la „Révision du gr. des Cydnides“]. Signoret. Ann. Soc. Ent. France (6), 2, 1882, p. LXIII. — Français.

Synopsis des espèces des genres:

84. [*Thyreocoris* Schr.]. Van Duzee. Trans. Amer. Entom. Soc. 30, 1904, pp. 3—4. — Synopsis des espèces de la rég. néarctique. Anglais.
85. [*Byrsinus* Fieb.]. Jakovlev. Rev. Russe d'Entom. 6, 1906, p. 52. — Français.
86. [*Dismegistus* Am. et Serv.]. Jeannel [in] Voyage de Alluand et Jeannel en Afrique Orientale, Insectes Hémiptères. I. *Pentatomidae* 1913, p. 88. — Français.
87. Horváth. Révision des *Sehirus* noirs. Rev. d'Entom. 14, 1895, pp. 128—130. — Français.

Fam. Pentatomidae.

Catalogue.

88. Kirkaldy. Catalogue of the Hemiptera (Heteroptera) 1. *Cimicidae* [= *Pentatomidae*]. Berlin. 1909. 8°. 392 pp. — Énumération de toutes les espèces connues; citations bibliographiques très complètes, données géographiques parfois pas assez précises; beaucoup de noms changés sans nécessité; le catalogue contient tous les *Pentatomoideae* à l'exception des *Cydnidae* et des *Urostylinae*. Préface anglaise.

Synopsis des sous-familles.

89. Stål. Hemiptera africana 1, 1864, pp. 32—33. — Latin.

Synopsis des genres.

90. Stål. Genera *Pentatomidarum* Europae. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 29, 1872, № 3, pp. 31—40. — Latin.

Faunes.

91. Schouteden. Rhynchota aethiopica. I. *Scutellerinae* et *Graphosomatinae*. Ann. Mus. Congo. Zool. Série III. Faune entom.

d. Afr. tropic. 1, fasc. 1, 1903, pp. 1—131, tt. col. 1, 2; II. *Arminae* [*Asopinae*] et *Tesseratominae*. L. c. 1, fasc. 2, 1905, pp. 133—277, tt. col. 3—5. — Synopsis des tribus, des genres et des espèces; descriptions et données géographiques très détaillées. Français et latin.

92. Stål. Enumeratio Pentatomidarum Americae [in] Enum. Hem. 2, 1872, pp. 9—65. — Énumération des espèces néarctiques et néotropicales; descriptions des formes nouvelles; synopsis partiels des espèces de plusieurs genres. Latin. Conf. n^o. 94, 111, 232 et 243.

Subf. *Asopinae*.

= *Cimicinae* Stål ol., Kirk. = *Arminae*.

Genres.

93. Schouteden. Genera Insectorum dirigés par Wytsman. fasc. 52, *Heteroptera*. Fam. *Pentatomidae*. Subf. *Asopinae* (*Arminae*). Bruxelles. 1907, 4^o, 82 pp., 5 tt. color. — Synopsis et caractéristiques très détaillées des genres; énumération des espèces; beaucoup de figures très belles. Français.
94. Stål. En. Hem. 1, 1870, pp. 21—59. — Énumération des genres et des espèces; synopsis partiels des espèces de quelques genres Latin.
95. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, p. 43. — Synopsis des genres ayant les fémurs antérieurs armés d'une épine et habitant l'Ancien Monde. Latin.
96. Stål. Öfv. Sv. Vet.-Akad. Förh. 1867, pp. 495—499. — Synopsis des genres d'Europe et d'Amérique. Latin.

Faunes.

97. [Allemagne]. Schumacher. Zeitschr. wiss. Insektenbiol., 1913. pp. 6, 19, 263—264, 379—380. — Synopsis des espèces et de leurs larves. Allemand.
98. [Rég. éthiopienne]. Schouteden. Conf. n^o 91.
99. [Indes néerlandaises]. Snellen van Vollenhoven. Conf. n^o 70.

Synopsis des espèces des genres:

100. [*Perillus* Stål]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, pp. 64—65. — Anglais.
101. [*Podisus* Herr. Sch.]. Van Duzee. L. c. pp. 68—69.
102. [*Oechalia* Stål]. Kirkaldy. Proc. Hawaiian Ent. Soc. 2, 1909, p. 83, t. 2. — Anglais.
103. [*Jalla* Hahn]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou. 1884, 2, p. 166. — Allemand.

Subf. Scutellerinae.

104. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hemipt. **3**, 1873, pp. 3—4. — Latin.
105. Schouteden. Genera Insectorum dirigés par Wytsman. Bruxelles 4°, fasc. 24. *Heteroptera*, fam. *Pentatomidae*, subf. *Scutellerinae*, 1904, 98 pp., 5 tt. color. — Synopsis et caractéristiques très détaillées des tribus et des genres; énumération de toutes les espèces connues; figures excellentes. Français.
106. [Synopsis des genres]. Mayr. Novara-Expedition. Zoologie. Theil **2**, Abth. 1, 1866, pp. 12—20. — Les *Graphosominae* sont incluses dans ce synopsis. Allemand.

Faunes.

107. [Gouv. d'Astrachan]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Rossicae, **18**, 1884, pp. 158—204. — Synopsis et descriptions des espèces et des genres. Russe.
108. [Rég. éthiopienne]. Schouteden. Conf. n° 91.
109. [Indes néerlandaises]. Snellen van Vollenhoven. Conf. n° 70.
110. [Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. **3**, 1873, pp. 4—32. — Synopsis des genres, énumération des espèces. Latin.
111. [Amérique]. Stål. L. c. **1**, 1870, pp. 4—20. — Énumération des espèces, avec des synopsis partiels des espèces de plusieurs genres. Latin.

Trib. Elvisuraria.

112. [Synopsis des genres]. Stål. En. Hem. **3**, 1873, p. 4. — Latin
113. Schouteden. Monographie du genre *Coleotichus*. Ann. Mus. Nat. Hung. **3**, 1905, pp. 317—361, tt. 8, 9. — Synopsis et descriptions très détaillées des espèces du genre. Français.

Trib. Sphaerocoraria.

114. [Synopsis des genres]. Stål. En. Hem. **3**, 1873, p. 6. — Latin.

Trib. Scutelleraria.

115. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. pp. 8—10.

Synopsis des espèces des genres:

116. [*Calliphara* Germ.]. Stål. Berl. Ent. Zeit. **10**, 1866, pp. 151—154. — Latin.
117. [*Eucorysses* Am. et Serv.]. Stål. L. c. pp. 154—156, et Hem. Fabr. **1**, 1868, p. 11. — Latin.

Trib. Tetryaria.

Synopsis des genres.

118. [de l'Ancien Monde]. Stål. En. Hem. **3**, 1873, p. 24. — Latin.
119. [américains]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1867, pp. 491—495. — Latin.

120. [voisins du g. *Tetyra* Fabr.]. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, p. 4. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

121. [*Homaemus* Dall. de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, p. 13. — Anglais.
122. [*Pachycoris* voisins de *P. torridus* Scop.]. Breddin. Wien. Ent. Zeit. 25, 1906, pp. 189—190. — Allemand.

Trib. *Odontoscelaria*.

123. [Synopsis des genres]. Stål. En. Hem. 3, 1873, pp. 30—31. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

124. [*Odontoscelis* Lap.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1881, 2, p. 347. — Espèces de Russie. Allemand.
125. [*Odontoscelis*]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, p. 19. — Espèces néarctiques. Anglais.

Trib. *Odontotarsaria*.

126. [Synopsis des genres]. Stål. En. Hem. 3, 1873, p. 26. — Latin.
127. Reuter. Monographia generis Heteropterorum *Phimodera* Germ. Acta Soc. Scient. Fennicae 33, № 8, 1906, 51 pp., 2 tt. — Synopsis et descriptions très détaillées des espèces. Latin.
128. [*Odontotarsus* Lap.]. Horváth. Monographia generis Hemipterorum *Odontotarsus* Lap. Ann. Mus. Nas. Hungar. 4, 1906, pp. 463—483, 2 ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions très détaillées des espèces. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

129. [*Phimodera* Germ.]. Fieber. Ent. Wien. Mon. 7. 1863, pp. 1—9. — Allemand.
130. [*Phimodera*]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Rossicae 36, 1903, pp. 185—186. — Français.
131. [*Odontotarsus*]. Jakovlev. Bull. Soc. Natur. Moscou 1883, 2, p. 119, et 1885, 2, pp. 83—84. — Synopsis des espèces de la faune russe. Allemand.

Trib. *Eurygastraria*.

Synopsis des genres.

132. Stål. En. Hem. 3, 1873, pp. 28—29. — Latin.
133. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Rossicae 19, 1885, p. 99. — Allemand.
134. [Synopsis des espèces du g. *Eurygaster* Lap.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1885, 2, pp. 80—81. — Allemand.
135. Péneau. Le genre *Eurygaster*. Bull. Soc. Nat. Ouest. 21, 1911 pp. 157—193. — Je n'ai pas vu cet ouvrage, je le place ici parce que c'est probablement une monographie du genre.

Subf. **Discocephalinae.**

136. [Synopsis des genres]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1867, pp. 499—501; Addenda Stål. Enum. Hem. 2, 1871, p. 10. — Latin.
137. [Synopsis des espèces du g. *Discocephala* Lap.]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 17—18. — Latin.

Subf. **Graphosominae.**

138. Schouteden. Genera Insectorum dirigés par Wytsman, fasc. 40, *Heteroptera*, fam. *Pentatomidae*, subf. *Graphosomatinae*. Bruxelles, 1905, 4°. 46 pp., 3 tt. col. — Synopsis et caractéristique très détaillées des genres, énumération des espèces. Français.

Synopsis des genres.

139. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 28—34. — Synopsis des genres et énumération des espèces d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
140. Mayr. Conf. n°. 106.

Faunes.

141. [Gouv. d'Astrakhan]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 18, 1884, pp. 204—243. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Russe.
142. [Rég. éthiopienne]. Schouteden. Conf. n° 91.
143. [Indes Néerlandaises]. Snellen van Vollenhoven. Conf. n° 70

Trib. **Tarisaria.**

Espèces du genre *Tarisa* Am. et Serv.

144. Reuter. Monographia generis *Tarisa* Am. et Serv. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. 43, 1900, pp. 25—48, tt. 1, 2. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Latin.
145. Puton. Ann. Soc. Ent. France (5), 3, 1873, p. 23. — Synopsis des espèces d'Europe et d'Algérie. Français.

Trib. **Trigonosomaria.**

= *Ventocoraria*.

Synopsis des genres. |

146. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1872, pp. 56—58. — Synopsis des genres européens des tr. *Trigonosomaria* et *Graphosomaria*. Latin.
147. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 28, 1894, pp. 131—132. — Allemand.
148. Kiritshenko. Rev. Russe d'Ent. 13, 1913, pp. 297—298. — Synopsis des genres voisins du g. *Leprosoma* Baer. Latin.
149. Horváth. Essai monographique sur le genre *Trigonosoma* Lap. Revue d'Ent. 8, 1889, pp. 33—49. — Synopsis et descriptions des espèces. Français, diagnoses latines.

Synopsis des espèces des genres:

150. [*Trigonosoma* in spec.]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 5 1907, p. 292. — Latin.
151. [*Trigonosoma* de la faune circumcaspienne]. Jakovlev. Труды Русск. Энтом. Общ. 13, 1882, pp. 143—144. — Russe.
152. [*Leprosoma* Baer.]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 9, 1911, p. 578. — Latin.

Trib. *Graphosomaria*.

Synopsis des genres.

153. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 21, 1887, pp. 304—305. — Allemand.
154. Stål. Conf. n° 146.

Espèces des genres:

155. [*Tholagmus* Stål]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1883, 1, p. 424. — Synopsis. Russe.
156. Horváth. Conspectus specierum generis *Graphosoma*. Ann. Mus. Nat. Hung. 1, 1903, pp. 345—354. — Synopsis et descriptions détaillées. Latin.
157. Horváth. Les *Graphosoma* d'Europe. L. c. 7, 1909, pp. 143—150, ff. 1—6. — Descriptions des espèces. Français.

Trib. *Podoparia*.

158. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, p. 21. — Synopsis des genres néarctiques. Anglais.
159. Horváth. Die europäischen Podoparien. Wien. Ent. Zeit. 2, 1883 pp. 133—138, 161—167, tab. 2. — Description des genres et des espèces. Anglais.
160. [Synopsis des espèces néarctiques du g. *Podops* Latr.]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, p. 22.

Subf. *Pentatominae*.

Synopsis des genres.

161. Stål. Öfv. Sv. Vet.-Akad. Förh. 1867, pp. 501—522. — Genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
162. Stål. L. c. pp. 522—532. — Genres d'Amérique. Latin.

Faune.

163. [Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 34—108. — Énumération des espèces d'Afrique, d'Asie et d'Australie; synopsis partiels des espèces de plusieurs genres. Latin.

Trib. Halyaria.

Synopsis des genres.

164. Stål. Enum. Hemipt. **5**, 1876, pp. 34—37. — Genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
165. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou. 1881, **2**, 351. — Genres de Russie. Allemand.
166. Stål. Enum. Hemipt. **5**, 1876, p. 12. — Genres américains voisins du g. *Macropygium* Spin. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

167. [*Caridophthalmus* Assm. = *Allocotus* Mayr.]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. **10**, 1912, p. 600. — Allemand.
168. [*Eumecopus* Dall.]. Van Duzee. Bull. Am. Mus. Nat. Science. **31** 1905, pp. 194—195. — Anglais.
169. [*Brochymena* Am. et Serv.]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. **30**, 1904, pp. 26—27. — Anglais.
170. [*Mustha* Am. et Serv.]. Reuter. Revue d'Ent. **9**, 1890, pp. 262—264. — Latin.
171. [*Mustha*]. Horváth. Bull. Mus. d'Hist. Natur. 1906, pp. 515—516. — Latin.
172. [*Mustha*]. Horváth [in] J. de Morgan. Délégation en Perse. Annales d'Histoire Naturelle, **2**, Entomologie, fasc. 1, Paris, 1912, pp. 20—21, 1 tab. — Français.

Trib. Sciocoraria.

173. [Monographie]. Fieber. Abhandl. Böhm. Gesell. Wissensch. Prag (5), **7**, 1851, pp. 437—453. — Outre les *Sciocoraria*, contient les *Discocephalinae*; intérêt principalement historique, mais les descriptions des espèces peuvent être de quelque utilité. Allemand.
174. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. **5**, 1876, p. 49. — Genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
175. [Synopsis des espèces du g. *Menaccarus* Am. et Serv.]. Jakovlev. Horae Soc. Entom. Ross. **34**, 1900, pp. 517—518 et Revue Russe d'Ent. **3**, 1903, pp. 289. — Espèces paléarctiques. Français.

Trib. Aëptaria.

176. [Synopsis des genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie]. Stål. Enum. Hem. **5**, 1876, p. 51. — Latin.

Trib. Myrochaearia.

Synopsis des genres.

177. Stål. L. c. p. 52. — Genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
178. Stål. Öfv. Sv. Vet.-Akad. Förh. 1861, pp. 199—200. — Genres voisins du g. *Delegorguella* Spin. = *Paramecocoris* Stål, appartenant aux tribus actuelles *Myrochaearia* et *Aëptaria*. Latin.

Trib. Pentatomaria.

Synopsis des genres.

179. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 54—69. — Genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
180. Stål. L. c. 2, 1871, p. 30. — Genres voisins du g. *Mecocephala* Dall. Latin.
181. Stål. L. c. 2, 1871, p. 37. — Genres américains voisins du g. *Chlorocoris* Spin. Latin.
182. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1861, pp. 139—140. — Genres voisins du g. *Strachia* Hhn. Latin.
183. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1870, pp. 637—638. — Genres voisins du g. *Rhynchocoris* Westw. Latin.
184. Bergroth. Bull. Soc. Ent. France 1915, p. 438. — Genres voisins du g. *Dendrocoris* Bergr. Français.

Synopsis des espèces des genres:

185. [*Halydicoris* Jeann.]. Jeannel [in] Voyage de Alluaud et Jeannel en Afrique Orientale. Insectes Hémiptères. *Pentatomidae*, 1913, pp. 74—75. — Français.
186. [*Halycorypha* Jeann.]. Jeannel. L. c. pp. 63—64.
187. [*Holcostethus* Fieb. Stål = *Dryadocoris* Kirk.]. Jeannel. L. c. pp. 54—55.
188. [*Peribalus* Muls et R. de la rég. paléarctique]. Jakovlev. Revue Russe d'Entom. 2, 1902, pp. 158—159. — Français.
189. [*Peribalus* de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, p. 32. — Anglais.
190. [*Trichopepla* Stål.]. Van Duzee. L. c. p. 34.
191. [*Halyomorpha* Mayr. de la rég. éthiopienne]. Jeannel [in] Voyage de Alluaud et Jeannel en Afrique Orientale. Insectes Hémiptères. 1, *Pentatomidae*, 1913, pp. 67—68. — Français.
192. [*Palomena* Muls. et R.]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 37, 1904, p. 73. — Français.
193. [*Chlorochroa* Stål. = *Pentatoma* Uhl. de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, pp. 35—36. — Anglais.
194. [*Rhombocoris* Mayr. = *Cyrtochilus* Jak.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1880, 1, p. 163. — Allemand.
195. [*Agatharchus* Stål. = *Barbiger* Jak.]. Jakovlev. Труды Русск. Энт. Общ. 12, 1879, p. 42. — Russe.
196. [*Carpocoris* Kol. sbg. *Anthemina* Muls. et R.]. Jakovlev. Revue Russe d'Ent. 5, 1905, pp. 99—100. — Français.
197. [*Mimulocoris* Jak.]. Kiritschenko. Rev. Russe d'Ent. 12, 1912 p. 318; et 14, 1914, p. 186. — Latin.
198. [*Euschistus* Dall. de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, pp. 43—44. — Anglais.
199. [*Proxys* Spin.]. Distant. Biol. Centr. Amer. Rhynch. Het. 1, 1880, p. 62. — Anglais.

200. [*Aelia* Fabr.]. Fieber. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1868, pp. 465—478, tt. 5, 6. — Descriptions disposées synoptiquement. Allemand.
201. [*Aelia* de la faune de France]. Rey. Rev. d'Ent. 7, 1888, pp. 93—94. — Français.
202. [*Aelia* voisines de l'*A. acuminata* L.]. Kiritschenko. Rev. Russe d'Ent. 14, 1914, pp. 183—184. — Latin.
203. [*Aelia* voisines de l'*A. rostrata* Boh.]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 1, 1903, pp. 404—405. — Latin.
204. [*Neottiglossa* Kirby de la rég. paléarctique]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 36, 1903, pp. 325—327. — Latin.
205. [*Neottiglossa* de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, pp. 49—50. — Anglais.
206. [*Cosmopepla* Stål]. Van Duzee. L. c. pp. 50—51.
207. [*Cosmopepla*]. Montandon. Proceed. Nation. Mus. Wash. 16, 1893, № 924, p. 46. — Anglais.
208. [*Eusarcoris* Hhn. de la faune de France]. Rey. Rev. d'Ent. 7, 1888, pp. 94—95. — Français.
209. [*Eusarcoris* voisins de l'*E. inconspicuus* Herr. Sch.]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 34, 1900, pp. 521—522; 35, 1902, p. 602. — Français.
210. [*Risibia* Horv. = *Parastaria* Kir.]. Kiritschenko. Rev. Russe d'Ent. 11, 1911, pp. 82—83. — Allemand.
211. [*Carbula* Stål. de l'Afrique Orientale]. Jeannel [in] Voyage de Alluaud et Jeannel en Afrique Orientale. Ins. Hém. 1. *Pentatomidae*. 1913, p. 45. — Français.
212. [*Thyanta* Stål de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, pp. 52—53. — Anglais.
213. [*Chlorocoris* Spin.]. Barber. Journ. New York Ent. Soc. 18, 1910, pp. 35—36. — Anglais.
214. [*Agonoscelis* Spin. de la rég. éthiopienne]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 2, 1904, pp. 261—262. — Latin.
215. [*Nezara* Am. et Serv. de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, pp. 57—58. — Anglais.
216. [*Nezara* s. l. du nord-est des États Unis]. De la Torre Bueno. Ent. News 28, 1912, p. 317. — Anglais.
217. [*Banasa* Stål de la rég. néarctique]. Van Duzee. L. c. p. 59. — Anglais.
218. [*Odmalea* Bergr.]. Bergroth. Bull. Soc. Ent. France 1915, pp. 438—439. — Français.
219. [*Dendrocoris* Bergr.]. Bergroth. Rev. d'Ent. 10, 1891, p. 229; Bull. Soc. Ent. France 1915, pp. 439—440. — Le premier synopsis est en latin, le second en français.
220. [*Dendrocoris* = *Liotropis* Uhl.]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, p. 62. — Anglais.
221. [*Dendrocoris* = *Liotropis*]. Barber. Entom. News. 22, 1911, p. 269. — Anglais.

222. [Synopsis des variétés de l'*Eurydema oleraceum* L.]. Gulde. Deut. Ent. Zeit. 1914, pp. 335—341. — Allemand.

Subfam. **Acanthosominae.**

Synopsis des genres.

223. [d'Afrique, d'Asie et d'Australie]. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 108—115. — Synopsis des genres et énumération des espèces. Latin.
224. [d'Amérique]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1867, pp. 532—534. — Latin.
225. [du Chili]. Signoret. Ann. Soc. Ent. France (4), 3, 1863, pp. 548—549. — Français.
226. [voisins du g. *Acanthosoma* Curt.]. Stål. Ann. Soc. Ent. France, (4), 4, 1864, p. 54. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

227. [*Acanthosoma* Curt. de la rég. paléarctique]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1880, 1, pp. 386—387. — Allemand.
228. [*Elasmotethus* Fieb. = *Acanthosoma* V. D. de la rég. néarctique]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, p. 73. — Anglais.

Subf. **Urostylinae.**

= *Urolabidinae* Stål.

229. [Énumération des espèces]. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 115—117. — Latin.

Subf. **Dinidorinae.**

230. Schouteden. Genera Insectorum dirigés par Wytsman. fasc. 153. *Heteroptera*. Fam. *Pentatomidae*. Subf. *Dinidorinae*. Bruxelles. 1913, 4^o, 19 pp., 2 tt. color. — Synopsis et caractéristiques très détaillées des genres, énumération des espèces. Français.
231. [Synopsis des genres]. Kirkaldy. Canad. Ent. 1913, p. 83—84. — Anglais.
232. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, pp. 79—89. — Énumération des espèces. Latin.
233. [Faune des Indes Néerlandaises]. Snellen van Vollenhoven. Conf. n°70.

Subf. **Phloeinae.**

234. [Synopsis des genres]. Kirkaldy. Canad. Ent. 1913, p. 83. — Anglais.
235. Magalhaens. Contribution à l'histoire naturelle des Phlées. Mém. Soc. Zool. France. 22, 1908, pp. 234—260, tt. 4. — Monographie du g. *Phloea* Lep. et Serv., description des espèces (pp. 239—240). Français.

Subf. Phyllocephalinae.

Synopsis des genres.

236. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 117—118. — Le synopsis est suivi d'une énumération des espèces. Latin.
237. Kirkaldy. Canad. Entom. 1913, p. 81—83. — Anglais.

Subf. Tessaratominae.

238. Horváth. Analecta ad cognitionem Tesseratominum. Termesz. Fuzet. 23, 1900, tt. 9, 10. — Synopsis des tribus; synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces des tr. *Oncomeraria* et *Sepinaria*. Latin.

Tribus et genres.

239. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, p. 60. — Synopsis des tribus. Latin.
240. Stål. L. c. p. 70—71. — Synopsis des genres de la tribu *Eusthenaria*. Latin.

Faunes.

241. [Rég. éthiopienne]. Conf. n° 91.
242. [Indes Néerlandaises]. Conf. n° 70.

Espèces.

243. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, pp. 60—78. — Énumération des espèces. Latin.
244. [Synopsis des espèces du g. *Megadoeum* Karsch]. Bergroth. Wien. Ent. Zeit. 23, 1904, pp. 39—40. — Latin.

Fam. Coreidae.

Catalogues.

245. Bergroth. Supplementum catalogi Heteropterorum Bruxellensis. II. *Coreidae*, *Pyrrhocoridae*, *Colobathristidae*, *Neididae*. Mém. Soc. Ent. Belg. 22, 1913, pp. 125—183. — Addenda au catalogue de Le-thierry et Sévérin; très important. Latin.
246. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 33—100. — Énumération des genres et des espèces d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
247. Stål. L. c. 1, 1870, pp. 125—228. — Énumération des genres et des espèces d'Amérique. Latin.

Sous-familles et genres.

248. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 33—34. — Synopsis des sous-familles de l'Ancien Monde. Latin.
248a. Kiritshenko. Faune de la Russie. Ins. Hém. 6, livr. 2. Conf. n° 256a. Pp. 18—21. — Synopsis des sous-familles. Russe.
249. Stål. Synopsis Coreidarum Europae. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1872, N° 6, pp. 49—56. — Synopsis des genres européens. Latin.

250. Puton. Ann. Soc. Ent. France (5), 1, 1871, pp. 305—310. — Synopsis des genres européens. Français.
251. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1867, pp. 534—551. — Synopsis des genres américains. Latin.
252. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 48, 53, 58—59 et Enum. Hem. 1, 1870, p. 206. — Addendas aux précédent.

Faunes.

253. Stål. Synopsis Coreidum et Lygaeidum Sueciae. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1862, pp. 203—209. — Synopsis des genres et des espèces. Latin.
254. Mulsant et Rey. Histoire Naturelle des Punaises de France. Coréides, Alydides, Bértytides, Sténocéphalides. Paris, 1870, 8^o, 250 pp., 2 tt. Synopsis et descriptions très détaillées des genres et des espèces. Français.

Subf. Merocorinae.

255. [Synopsis des genres]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 42. — Latin.

Subf. Coreinae.

256. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 34—37. — Contient les tribus d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.
256a. Kiritshenko. — Кириченко. Insectes Hémiptères. 6, livr. 2, Coreidae: Coreinae [in] Faune de la Russie et des pays limitr. Petrograd. 1916, 8^o. Pp. 1—388, avec 4 planches et 44 ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions très détaillées des tribus, des genres et des espèces paléarctiques. Russe; diagnoses des genres et des espèces latines.

Trib. Mictaria.

257. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 37—39. — Latin.

Trib. Amorbaria.

258. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. p. 51.

Trib. Petascelaria.

259. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. pp. 53—54.

Trib. Brachytaria.

260. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. pp. 56.

Trib. Homoeoceraria.

261. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. pp. 56—57.

Trib. Cloresmaria.

262. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. pp. 64—65.

Trib. Colpuraria.

= *Lybantaria* = *Pachycephalini*.

263. Breddin. *Materiae ad cognitionem subf. Pachycephalini*. Rev. d'Ent. 19, 1900, pp. 194—217. — Essai monographique. Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Latin.
264. [Synopsis des genres]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1870, pp. 653—654. — Latin.

Trib. Anisoscelaria.

265. [Synopsis des genres]. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1862, p. 294. — Latin.

Species des genres:

266. [*Holymenia* Lep. et Serv. = *Copium* Stål]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 50. — Synopsis. Latin.
267. [*Leptoglossus* Guér. = *Theognis* Stål]. Mayr. Novara-Exped. Zool. 2 Abth. 1, 1866, pp. 101—110. — Courtes descriptions des espèces. Allemand.

Trib. Leptoscelaria.

Synopsis des espèces des genres:

268. [*Leptoscelis* Lap.]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 53. — Latin.
269. [*Phthia* Stål.]. Stål. L. c. p. 53.

Trib. Acanthoceraria.

= *Mictaria* Stål prt.

270. [Synopsis des genres voisins du g. *Archimerus* Burm.]. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1862, pp. 277—278. — Latin.
271. [Synopsis des genres voisins du g. *Crinocerus* Burm.]. Mayr. Novara-Exped. Zool. 2 Abth. 1, 1866, p. 88. — Allemand.

Trib. Physomeraria.

272. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 69—70. — Contient les genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.

Trib. Chariesteraria.

273. [Synopsis des genres]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1859, p. 473. — Latin.

Trib. Pendulinaria.

274. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, p. 73. — Latin.

Trib. Hypselonotaria.

Species des genres:

275. [*Margus* Dall.]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 58. — Synopsis. Latin.

276. [*Anasa* Am. et Serv.]. Stål. L. c. p. 57. — Synopsis. Latin.
277. [*Hypselonotus* Hhn.]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 1913, pp. 365—372. — Synopsis et descriptions détaillées. Latin.
278. [*Sundarus* Am. et Serv.]. Horváth. L. c. p. 355—364. — Synopsis et descriptions détaillées.
279. [*Stenoprasia* Horv.]. Horváth. L. c. p. 364—365. — Synopsis et descriptions détaillées.
280. [*Paryphes* Burm.]. Horváth. L. c. p. 344—349. — Synopsis et descriptions détaillées.

Trib. Gonoceraria.

281. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1876, p. 75. — Latin.
282. [Synopsis des espèces des genres *Cletus* Stål et *Cletomorpha* Mayr]. Mayr. Novara-Expedition. Zool. 2, Abth. 1, 1866, pp. 118—119. — Allemand.

Trib. Corearia.

Synopsis des espèces des genres:

283. [*Verlusia* Spin. + *Haploprocta* Stål]. Puton. Ann. Soc. Ent. France (5), 1, 1871, pp. 313—314. — Français.
284. [*Haploprocta* Stål]. Kiritschenko. Rev. Russe d'Ent. 11, 1911, p. 375. — Latin.
285. [*Coreus* Fabr. = *Enoplops* Am. et Serv.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Mosc. 1881, 1, p. 205. — Allemand.
286. *Centrocoris* Kol. = *Centrocarenus* Fieb.]. Jakovlev. Труды Русск. Энт. Общ. 12, 1879, p. 54; Bull. Soc. Nat. Moscou 1882, 2 p. 105; Rev. Russe d'Ent. 7, 1908, pp. 235—236. — Les deux premiers synopsis sont en russe, le troisième est en français.
287. [*Centrocoris* Kol.]. Horváth. Wien. Ent. Zeit. 3, 1884, p. 115. — Allemand.

Trib. Spathoceraria.

Synopsis des espèces du genre *Spathocera* Stein.

288. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1882, 2, p. 101. — Espèces de Russie. Russe.
289. Puton. Ann. Soc. Ent. France (5), 3, pp. 15—16. — Espèces de France. Français.
290. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, pp. 74—75. — Latin.

Trib. Hydararia.

291. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, p. 80. — Latin.

Trib. Phyllomorpha.

292. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. p. 80.

Subf. **Pseudophloeinae.**

293. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 81—82.
— Contient les genres africains et asiatiques. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

294. [*Pseudophloeus* Burm. de Russie]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1882, 2, p. 103. — Russe.
295. [*Bothrostethus* Fieb. de Russie]. Jakovlev. Rev. Russe d'Ent. 3, 1903, p. 291. — Français.

Subf. **Alydinae.**

296. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 84—85.
— Latin.

Trib. **Stenocephalaria.**

Synopsis des espèces du g. *Stenocephalus* Latr.

297. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 6, 1874, pp. 138—139. — Latin.
298. Horváth. Bull. Soc. Ent. Italiana 1887, pp. 278—281. — Latin.
299. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 35, 1901, pp. 202—204. — Contient les espèces paléarctiques et quelques-unes de la rég. éthiopienne. Français.
300. Butler. Ent. Monthly Mag. (2), 22, 1911, p. 135. — Espèces d'Angleterre. Anglais.

Trib. **Leptocorisaria.**

301. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 85—86.
— Contient les genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.

Trib. **Micrellytraria.**

302. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. pp. 87—88. — Contient les genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.

Subf. **Alydaria.**

Synopsis des genres.

303. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1859, pp. 458—459. — Latin.
304. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 89—91. — Contient les genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.

Subf. **Corizinae.**

305. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 97. — Latin.
306. [Synopsis des genres]. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1862, p. 306. — Latin.

Trib. Corizaria.

307. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 97—98. — Contient les genres d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Latin.

Species des genres:

308. Signoret. Monographie du genre *Corizus* Fall. [sensu lat.]. Ann. Soc. Ent. France (3), 7, 1859, pp. 75—105. — Descriptions des espèces. Français.
309. Humbleton. The genus *Corizus* with a review of the North and Middle American species. Ann. Ent. Soc. America 1, 1908, pp. 133—147. — Synopsis et description des espèces. Je n'ai pas pu consulter cet article.
310. [*Corizus* Fall.]. De la Torre Bueno. Entom. News 23, 1912, p. 219. — Synopsis des espèces de la partie orientale des États-Unis. Anglais.
311. [*Corizus*]. Baker. Canad. Entomol. 40, 1908, p. 243. — Synopsis des espèces des États-Unis. Anglais.
312. [*Stictopleurus* Stål]. Rey. Rev. d'Ent. 7, 1888, pp. 97—99. — Synopsis. Français.
313. [*Agraphopus* Stål de Russie]. Jakovlev. Труды Русск. Энт. Общ. 11, 1880, p. 215. — Synopsis. Allemand.

Trib. Serinetharia.

314. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 98—99. — Latin.

Superf. Aradoideae.

315. [Synopsis des sous-familles]. Stål. En. Hem. 3, 1873, p. 135. — Les trois sous-familles qui y sont mentionnées forment actuellement deux familles distinctes. Latin.
316. [Synopsis des genres]. Stål. Hem. afric. 3, 1865, pp. 30—32. — Contient tous les genres connus à l'époque. Latin.
317. [Énumération des espèces extraeuropéennes]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 135—147. — Synopsis partiels des espèces de quelques genres. Latin.

Faunes:

318. [Russie]. Kiritschenko. — Кириченко. Insectes Hémiptères 6, livr. 1. *Dysodiidae* et *Aradidae*. St. Pétersbourg, 1913, 8°, 301 pp., 90 ff. dans le texte, 2 tt. [in] Faune de la Russie et des pays limitrophes. — Synopsis des tous les genres et de la majeure partie des espèces paléarctiques; descriptions très détaillées. Diagnoses des genres et des espèces en latin, le reste du texte en russe.
319. [Finlande et Scandinavie]. Reuter. Öfv. Sv. Vet.-Akad. Förh. 1872, № 5, pp. 47—62. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Latin.

320. [État d'Ohio]. Osborn. *Aradidae* of Ohio. Ohio Natural. 4, 1903, pp. 36—42. — Synopsis des genres, descriptions des espèces; je n'ai pas vu ce travail.

Fam. Dysodidae.

= *Brachyrrhynchinae*.

321. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 138—140. — Latin.
322. Horváth. Species mundi antiqui generis *Calisius*. Ann. Mus. Nat. Hung. 11, 1913, pp. 623—634, 10 ff. — Synopsis et descriptions détaillées. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

323. [*Euloba* Uhl. = *Phyllocraspedum* Bergr.]. Bergroth. Entom. Tidskr. 1894, pp. 99—100. — Latin.
324. [*Proxius* Stål de l'Amérique centrale]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, p. 69. — Anglais.
325. [*Hesus* Stål de l'Amérique centrale]. Champion. L. c. p. 73.
326. [*Artagerus* Stål de l'Amérique centrale]. Champion. L. c. pp. 76—77.
327. [*Aphleboderrhis* Stål]. Champion. L. c. pp. 78—79.
328. [*Dysodius* Lep. et Serv. de l'Amérique centrale]. Champion. L. c. p. 96.
329. [*Cinyphus* Stål]. Champion. L. c. p. 88.
330. [*Mezira* Am. et Serv. de Russie]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1878, 1, p. 135; ibid. 1880, 1, p. 171. — Allemand.
331. [*Mezira* = *Brachyrrhynchus* Lap. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, pp. 92—93. — Anglais.
332. [*Pictinus* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. pp. 80—81.
333. [*Neuroctenus* Fieb. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. pp. 106—107].
334. [*Aneurus* Curt. de la sous rég. de Madagascar]. Bergroth. Ann. Mus. Nat. Hung. 12, 1914, pp. 97—98. — Latin.
335. [*Aneurus* Curt. de la rég. orientale]. Bergroth. L. c. pp. 104—105.
336. [*Aneurus* Curt. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, p. 114. — Anglais.

Fam. Aradidae.

Synopsis des espèces du genre *Aradus* Fabr.

337. [Section de l'*A. betulae* L.]. Reuter. Wien. Ent. Zeit. 3, 1884, pp. 129—132; ibid. 4, 1885, pp. 149—150. — Latin.
338. [Section de l'*A. lugubris* Fall.]. Reuter. L. c. 3, 1884, pp. 132—136; Medd. Soc. Faun. Fl. Fennica 26, 1900, pp. 133—137. — Latin.

Superf. **Lygaeoideae.**

339. [Faune de Bretagne]. Guérin et Péneau. Conf. n° 53.

Fam. **Berytidae.**

= *Neididae.*

340. [Supplément au catalogue de Lethierry et Sévérin]. Bergroth. Conf. n° 245, pp. 177—179.
341. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 127—129. — Contient les genres et l'énumération des espèces extra-européennes Latin.

Faunes.

342. [Europe]. Fieber. Wien. Ent. Monatsschr. 3, 1859, pp. 200—209. — Synopsis des genres et des espèces. Allemand.
343. [Suède]. Reuter. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1870, pp. 597—603. — Synopsis des genres et des espèces. Latin.
344. [France]. Mulsant et Rey. Histoire Naturelle des Punaises de France. Coréides. 1870, pp. 181—242. — Synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces. Français.
345. [Hongrie]. Horváth. A magyarországi szunyogpoloskák. Radványi Lapok 2, 1885, 260—268. — Berytides de Hongrie, synopsis des genres, description des espèces. Hongrois.

Synopsis des espèces du genre *Berytus* Fabr.

346. [de la faune ligurienne]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 6, 1874, p. 143. — Latin.
347. [voisines de *B. clavipes* Fabr.] Jakovlev. Rev. Russe d'Ent. 6, 1906, pp. 215—216. — Français.
348. [voisines de *B. montivagus* Mey.]. Jakovlev. L. c. p. 217.

Fam. **Colobathristidae.**

349. [Énumération des espèces]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 168—169. — Latin.
350. [Supplément au catalogue de Lethierry et Sévérin]. Bergroth. Conf. n° 245, pp. 174—177.
351. Horváth. Monographia Colobathristinarum. Ann. Mus. Nat. Hung. 2, 1904, pp. 117—172. — Synopsis et descriptions très détaillés des genres et des espèces. Latin.
352. [Species du g. *Colobasiastes* voisines de *C. fulvicollis* Bredd.]. Breddin. Wien. Ent. Zeit. 23, 1904, pp. 245—250, ff. 1—3. — Synopsis et descriptions détaillées. Latin.

Fam. **Lygaeidae.**

= *Myodochidae.*

353. [Synopsis des sous-familles]. Stål. Hem. afr. 2, 1865, p. 120—121. — Latin.

354. Stål. Synopsis generum *Lygaeidarum* Europae. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1872, № 7, pp. 37—62. — Latin.
355. [Enumeration des espèces extra-européennes]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 98—170. — Latin.

Faunes.

356. [Suède]. Thomson. Opuscula entomol. 1870, pp. 180—202. — Synopsis des espèces. Latin.
357. Stål. Synopsis Coreidum et Lygaeidum Sueciae. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1862, pp. 210—225. — Synopsis des genres et des espèces. Latin.
358. Horváth. Monographia Lygaeidarum Hungariae. Budapest. 1875, 4°, 109 pp., 1 tab. col. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Hongrois, les diagnoses des espèces en latin.

Subf. *Lygaeinae*.

359. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 98. — Latin

Trib. *Lygaearia*.

360. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. L. c. pp. 98—99.
361. [Synopsis des genres voisins du g. *Lygaeus* Fabr.]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 199—200. — Latin.
362. [Synopsis des sous-genres du g. *Spilostethus* Stål = *Lygaeus* Fabr. Stål]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 74—76; Enum. Hem. 4, 1874, pp. 104—105. — Latin.

Faune.

363. [de France]. Mulsant et Rey. Histoire Naturelle des Punaises de France. Lygéides: Pyrrhocoriens-Lygéien. Paris. 1879, p. 11—59. — Synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces Français.

Synopsis des espèces des genres:

364. [*Spilostethus* Stål = *Lygaeus* Reut. ol.]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 201—202. — Contient les espèces paléarctiques. Latin.
365. [*Lygaeus* Fabr. sens. lat.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Mosc. 1883, 1, pp. 428—429. — Espèces de Russie. Russe.
366. [*Apterola* Stål]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, p. 203. — Latin.
367. [*Lygaeosoma* Spin. de la rég. paléarctique]. Reuter. L. c. p. 205.
368. [*Melanotelus* Reut.]. Reuter. L. c. pp. 202—203.

Trib. *Orsillaria*.

369. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 119. — Latin.

Synopsis des espèces du g. *Nysius* Dall.

370. Horváth. Rev. d'Ent. 9, 1890, pp. 185—191. — Espèces paléarctiques. Latin.
371. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, p. 76. — Espèces paléarctiques. Latin.
372. Kirkaldy. Fauna Haw. 2, prt. 6, 1910, pp. 536—537. — Espèces de l'arch. Hawaïien. Anglais.
373. Baker. Invert. pacif. 1, 1906, pp. 133—140. — Espèces néarctiques; je n'ai pas vu cet ouvrage. Anglais.

Subf. **Cyminae.**

374. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 123. — Latin.
375. [Synopsis des genres de la faune de Hawaïi]. Kirkaldy. Fauna Hawaïiensis 3, prt. 2, 1902, p. 165. — Anglais.

Trib. **Ischnorhyncharia.**

376. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 124. — Latin.

Trib. **Cymaria.**

377. [Synopsis des genres] Stål. L. c. pp. 125—126.
378. [Synopsis des espèces du g. *Cymus* Hhn.]. Horváth. Wien. Ent. Zeit. 7, 1888, p. 310. — Latin.

Subf. **Metrarginae.**

379. [Synopsis des espèces du g. *Metrarga* White]. Kirkaldy. Fauna Hawaïiensis 3, prt. 2, 1902, p. 165. — Anglais.

Subf. **Blissinae.**

380. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 129—130. — Latin.
381. Signoret. Essai monographique du g. *Micropus* Spin. [= *Ischnodemus* Fieb. sens. lat.]. Ann. Soc. Ent. France (3), 5, 1857, pp. 23—32, tab. col. 2. — Description des espèces. Français.
382. [Synopsis des espèces du g. *Ischnodemus* Fieb.]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 207. — Latin.

Subf. **Henestarinae.**

Synopsis des espèces des genres:

383. [*Henestaris* Spin.] Horváth. Rev. d'Ent. 11, 1892, pp. 137—138. — Français.
384. [*Engistus* Fieb.]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 9, 1911, pp. 581—582. — Latin.

Subf. **Geocorinae.**

385. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 133. — Latin.

386. [Synopsis des genres voisins du g. *Germalus* Stål]. Montandon. Bull. Sect. Sc. Acad. Roumaine 2, 1913, pp. 49—50. — Français.
387. [Monographie du g. *Geocoris* Fall. = *Ophthalmicus* Schill.]. Fieber. Entom. Monogr. 1844, pp. 112—125, tt. 9, 10.—Trop. ancien. Allemand.

Synopsis des espèces des genres:

388. [*Geocoris* Fall. = *Ophthalmicus* Schill.]. Fieber. Wien. Ent. Monatsch. 5, 1861, pp. 266—284. — Allemand.
389. [*Geocoris* Fall.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 6, 1874, pp. 153—154. — Latin.
390. [*Piocoris* Stål]. Jakovlev. Rev. Russe d'Ent. 4, 1904, p. 171. — Espèces paléarctiques. Français.

Subf. **Heterogastrinae.**

391. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 168. — Latin.
392. [Synopsis des espèces du g. *Heterogaster* Schill.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1881, 1, pp. 201—202. — Allemand.

Subf. **Pachygronthinae.**

393. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 138. — Latin.

Subf. **Oxycareninae.**

394. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 141. — Latin.
395. [Monographie]. Fieber. Abh. Böhm. Ges. Wissensch. (5), 7, 1851, pp. 462—469. — Descriptions des espèces. Allemand.
396. Van Duzee. Monograph of the genus *Crophius* Stål. Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc. 9, 1910, pp. 389—398. — Synopsis et descriptions des espèces; toutes ces dernières figurées dans le texte. Anglais.
397. [Synopsis des espèces éthiopiennes du g. *Oxycarenum* Fieb.]. Schouteden. Rev. Zool. Afric. 1, 1912, p. 315. — Je n'ai pas vu cet article. Français.

Subf. **Aphaninae.**

= *Myodochinae.*

398. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 142—143. — Latin.
399. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Hem. afr. 2, 1865, pp. 152—155. — Latin.

Trib. Cleradaria.

400. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 143. — Latin.
401. Horváth. Species generis *Lygaeidarum Clerada*. Ann. Mus. Nat. Hung. 7, 1909, pp. 622—625. — Synopsis et énumération des espèces connues; descriptions des formes nouvelles. Latin.

Trib. Myodocharia.

= *Plociomeraria*.

402. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 144—145. — Latin.

Trib. Rhyparochromaria.

403. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. L. c., pp. 154—156.
404. [Synopsis des genres voisins du g. *Peritrechus* Fieb.]. Jakovlev. Труды Русск. Энтомол. Общ. 13, 1882, p. 147. — Allemand.

Synopsis des espèces des genres:

405. [*Proderus* Fieb.]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 213—214. — Latin.
406. [*Pionosomus* Fieb.]. Horváth. Termész. Füzet. 18, 1895, pp. 39—41. — Latin.
407. [*Rhyparochromus* Curt. voisins de *R. chiragra* Fabr.]. Rey. Rev. d'Ent. 7, 1888, pp. 100—101. — Français.
408. [*Dinia* Stål]. Reuter. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. 25, 1882, pp. 23—24. — Latin.
409. [*Plinthisus* Fieb.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 6, 1874, p. 158; ibid. 12, 1878, pp. 77—79. — Latin.
410. [*Plinthisus*]. Horváth. Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 26, 1876, pp. 721—726; Revue d'Ent. 5, 1886, pp. 215—222. — Le premier synopsis est en latin, le second en français.
411. [*Stygnocoris* Dgl. and Scott]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, pp. 79—80. — Latin.
412. [*Hadrocnemis* Jak.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1883, 1, p. 433. — Russe.
413. [*Peritrechus* Fieb.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, p. 80. — Latin.
414. [*Peritrechus* Fieb. de Russie]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 26, 1892, pp. 229—230. — Allemand.

Trib. Aphanaria.

= *Beosaria*.

415. [Synopsis des genres paléarctiques]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 217—220. — Latin.
416. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 158—159. — Latin.

417. [Synopsis des sous-genres et des espèces du g. *Aphanus* Lap. = *Pachymerus* Lap. et Serv.]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 221—229. — Espèces paléarctiques. Latin.

Trib. Gonianotaria.

Synopsis des espèces des genres:

418. [*Ischnopeza* Fieb.]. Jakovlev. Rev. Russe d'Ent. 7, 1907, p. 23. — Français.
 419. [*Emblethis* Fieb.]. Horváth. Termész. Füzet. 8, 1884, p. 13. — Latin.
 420. [*Emblethis*]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1883, 2, pp. 126—127. — Russe.
 421. [*Emblethis* voisins de l'*E. verbasci* Fieb.]. Montandon. Rev. d'Ent. 9, 1890, pp. 176—177. — Français.

Trib. Lethaearia.

422. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 163—164. — Latin.
 423. Horváth. Révision du genre *Eremocoris* Fieb. Rev. d'Ent. 2, 1883, pp. 1—13, tab. 1. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Latin et français.

Synopsis des espèces du genre *Scolopostethus* Fieb.

424. [d'Europe]. Horváth. Ent. Month. Mag. 12, 1881, pp. 117—119. — Latin.
 425. [d'Europe]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, pp. 81—82. — Latin.
 426. [d'Angleterre]. Edwards. Ent. Month. Mag. 25, 1889, p. 279. — Anglais.
 427. [de France]. Lethierry. Catal. Hém. dép. du Nord. 2 éd. 1874, pp. 18—20. — Français.

Fam. Pyrrhocoridae.

428. [Synopsis des sous-familles]. Stål. Hem. afr. 3, 1865, p. 1. — Latin.
 429. [Synopsis des genres]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1861, pp. 195—196. — Latin.
 430. [Énumération des espèces]. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, pp. 90—124 et 4, 1874, pp. 167—168. — Synopsis partiels des espèces de plusieurs genres. Latin.
 431. [Supplément au catalogue de Lethierry et Sévérin]. Bergroth. Conf. n° 245, pp. 165—174. — Latin.

Faune.

432. Mulsant et Rey. Histoire Naturelle des Punaises de France. Lygéides, 1879, pp. 1—11. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Français.

Subf. **Larginae.**

433. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, pp. 90—91. — Latin.

Subf. **Pyrrhocorinae.**

434. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 1, 1870, pp. 101—103. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

435. [*Ectatops* Am. et Serv.]. Stål. Berl. Ent. Zeit. 7, 1863, pp. 396—397. — Latin.
436. [*Odontopus* Am. et Serv.]. Stål. L. c. pp. 390—392.
437. [*Dindymus* Stål]. Stål. L. c. p. 397—401.
438. [*Pyrrhocoris* Fall.]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1880, pp. 159—160. — Allemand.
439. [*Pyrrhocoris*]. Reuter. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 231—232. — Latin.
440. [*Dysdercus* Am. et Serv.]. Schouteden. Rev. Zool. Afr. 1, 1912, pp. 303—305. — Espèces éthiopiennes. Je n'ai pas vu l'article en question. Français?

Superf. **Tingitoideae.**

441. [Synopsis des familles = sous-familles sens. Stål]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, p. 115. — Latin.
442. [Synopsis des genres européens]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1874, № 3, pp. 43—59. — Latin.
443. [Énumération des espèces extra-européennes]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 115—134. — Synopsis partiels de plusieurs genres. Latin.
444. [Monographie]. Fieber. Entom. Monogr. 1844, pp. 20—111, tt. 2—9. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Allemand.

Faunes.

445. Horváth. Synopsis *Tingitidarum* regionis palaearticae. Ann. Mus. Nat. Hung. 4, 1906, pp. 1—118, tab. 1. — Synopsis des genres et des espèces; données bibliographiques et géographiques très complètes; la faune de la sous-région mandjoue reste en dehors de cet ouvrage important. Latin.
446. [La Bohémie]. Mužik. Česke Sitnatky *Tingitidae*. Praga, 1902, 21 pp., 5 ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions. Bohémien.

Fam. **Piesmidae.**

447. [Synopsis des espèces du g. *Piesma* Lap. et Serv. = *Zosmenus* Lap.]. Jakovlev. Труды Русск. Энт. Общ. 7, 1873, pp. 23—26. — Russe.

Fam. Tingitidae.

448. [Synopsis des tribus]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 116. — Latin.

Trib. Cantacaderaria.

449. [Synopsis des genres]. Stål. L. c. p. 116.
450. [Synopsis des espèces du g. *Phatnoma* Fieb. de l'Amér. centr.].
Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1897, p. 3. — Anglais.

Trib. Tingitaria.

451. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873,
pp. 118—122. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

452. [*Campylostira* Fieb.]. Horváth. Wien. Ent. Zeit. 11, 1892,
pp. 309—313. — Latin.
453. [*Acalypta* Westw. = *Orthostira* Fieb.]. Ferrari. Ann. Mus.
Civ. Genova. 12, 1878, pp. 82—84. — Latin.
454. [*Acalypta* = *Orthostira* voisines de l'*A. cervina* Germ.]. Jakov-
lev. Horae Soc. Ent. Ross. 27, 1893, pp. 301—302. — Allemand.
455. [*Dictyonota* Curt. in spec. = sbg. *Scraulia* Stål]. Ferrari.
Ann. Mus. Civ. Genov. 12, 1878, pp. 84—85. — Latin.
456. [*Dictyonota* subg. *Elina* Ferr.]. Puton. Rev. d'Ent. 14, 1895,
pp. 86—87. — Français.
457. [*Galeatus* Curt. de Russie]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Mos-
cou, 1880, 1, pp. 129—131. — Russe.
458. [*Galeatus*]. Horváth. Termész. Füzet. 20, 1897, pp. 455—457. —
Latin.
59. Horváth. Species generis Tingitidarum *Stephanitis*. Ann. Mus.
Nat. Hung. 10, 1912, pp. 319—339, ff. 1—3. — Monographie; en
outre du tableau synoptique sont données des descriptions très dé-
taillées. — Latin.
460. [*Corythucha* Stål]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2,
1897, p. 6. — Anglais.
461. [*Leptobyrsa* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 25.
462. [*Gargaphia* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 9.
463. [*Amblystira* Stål]. Champion. L. c. pp. 29—30.
464. [*Leptostyla* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. pp. 11—13.
465. [*Phyllontochila* Fieb. de la rég. éthiopienne]. Horváth. Ann.
Mus. Nat. Hung. 9, 1911, pp. 327—333. — Latin.
466. [*Eurycera* Lap.]. Rey. Rev. d'Ent. 7, 1888, pp. 190—191. —
Français.
467. [*Eurycera* Lap.]. Jakovlev. Труды Русск. Энт. Общ. 12,
1879. p. 103. — Russe.
468. [*Leptodictya* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr.
Amer. 2, 1897, p. 23. — Anglais.
469. [*Atheas* Champ.]. Champion. L. c. 1898, p. 40.

470. [*Teleonemia* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. pp. 35—36.

Trib. **Serenthiaria.**

471. [Synopsis des genres]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, p. 117. — Latin.

Fam. **Henicocephalidae.**

472. [Synopsis des genres]. Enderlein. Zool. Anz. 27. 1904, pp. 785—786. — Allemand.

Synopsis des espèces du genre *Henicocephalus* Westw.

473. Johannsen. Psyche 16, 1909, p. 2, tab. 1. — Espèces néarctiques. Anglais.
474. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, p. 159. — Espèces de l'Amérique centrale. Anglais.

Fam. **Phymatidae.**

= *Macrocephalidae.*

475. Handlirsch. Monographie der Phymatiden. Ann. Hofmus. Wien 12, 1897, pp. 127—230, tab. 4—11. — Synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces; beaucoup d'espèces très bien figurées sur les planches. Allemand.
476. [Synopsis des genres]. Bianchi. Ann. Mus. Zool. St.-Petersbourg 4, 1899, pp. 222—224. — Latin.
477. [Synopsis des genres et énumération des espèces]. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 131—136. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

478. [*Phymata* Latr. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, pp. 49—50. — Anglais.
479. [*Macrocephalus* Swed. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. pp. 55—56.

Fam. **Reduviidae.**

480. [Synopsis des sous-familles]. Stål. Berl. Ent. Zeit. 3, 1859, p. 328; Hem. afr. 3, 1865, pp. 43—45; Enum. Hem. 2, pp. 66—67; 4, 1874, pp. 3—4. — Latin.
481. Stål. Genera Reduviidarum Europae. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1872, № 6, pp. 43—48. — Synopsis des genres. Latin.
482. [Énumération des espèces de l'Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 3—97. — Synopsis partiels des espèces de plusieurs genres. Latin.
483. [Énumération des espèces d'Amérique]. Stål. L. c. 2, 1871, pp. 70—128. — Synopsis partiels des espèces de plusieurs genres. Latin.

Faunes.

484. [Finlande et Scandinavie]. Reuter. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1872, № 6, pp. 59—66. — Synopsis et description des genres et des espèces. Latin.

485. [France]. Mulsant et Rey. Histoire Naturelles des Punaises de France. Réduvides, Emésides. Paris. 1873, 8°, pp. 100+18. — Synopsis et descriptions très détaillées des genres et des espèces. Contient en outre les Nabides. Français.

Subf. *Emesinae*.

486. A. Dohrn. Beiträge zu einer monographischen Beschreibung der Familie der *Emesina*. Linnea entomol. **14**, 1860, pp. 206—255, tab. 1; **15**, 1863, pp. 72—76. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Latin et allemand.
487. [Synopsis des tribus et des genres de l'Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. **4**, 1874, pp. 92—94. — Latin.
488. [Synopsis des genres d'Amérique]. Stål. L. c. **2**, 1871, pp. 125—126.
489. [Synopsis des genres et des espèces des États Unis]. Banks. Psyche, **16**, 1909, pp. 43—48, ff. 1—2. — Anglais.
490. Baker. Californian *Emesidae*. Pomona Journ. **2**, 1910, pp. 225—227.—Je n'ai pas vu cet article.

Trib. *Stenolemaria*.

= *Ploiariaria*.

Synopsis des espèces des genres:

491. [*Ploiariola* Reut.=*Ploiaria* Stål]. Lethierry. Cat. Hém. dép. du Nord. 2 éd., 1874, p. 43. — Français.
492. [*Ploiariola* de Russie]. Jakovlev. Rev. Russe d'Ent. **6**, 1906, pp. 157—158. — Français.
493. [*Westermannia* Dhrn.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. **2**, 1898, p. 164. — Anglais.
494. [*Ploiariodes* White]. Kirkaldy. Faun. Hawaiiensis **3**, prt. **2**, 1902, p. 151. — Anglais.

Trib. *Leistarcharia*.

495. [Synopsis des espèces du g. *Nosita* Bergr.]. Bergroth. Verh. Zool. Bot. Gesell. Wien **56**, 1906, p. 307. — Latin.
496. [Synopsis des espèces du g. *Eugubinus* Dist.]. Distant. Entomol. **48**, 1915. p. 8. — Anglais.

Trib. *Emesaria*.

497. [Synopsis des genres]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1870, p. 704. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

498. [*Ploiaria* Scop. sens. Reut.]. Noualhier. Rev. d'Ent. **14**, 1895, pp. 167—170, tab. 1. — Français.
499. [*Lutevopsis* Champ.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. **2**, 1898, p. 166. — Anglais.

500. [*Ghilianella* Spin. de l'Amér. centr.]. *Champion*. L. c. p. 170.
501. [*Ploiariopsis* Champ.]. *Champion*. L. c. p. 179.

Subf. **Bactrodinae.**

502. [Synopsis des espèces du g. *Bactrodes* Stål de l'Amér. centr.]. *Champion*. L. c. p. 175.

Subf. **Saicinae.**

503. [Synopsis des genres]. Stål. *Hem. Fabr.* 1, 1868, pp. 129—130; *Enum. Hem.* 4, 1874, pp. 90—91. — Latin.
504. [Synopsis des espèces du g. *Saica* Am. et Serv.]. *Champion*. *Biol. Centr. Amer. Heter.* 2, 1898, p. 176. — Anglais.

Subf. **Tribelocephalinae.**

505. [Synopsis des genres]. Stål. *Enum. Hem.* 4, 1874, p. 90. — Latin.

Subf. **Stenopodinae.**

Synopsis des genres:

506. [du globe terrestre]. Stål. *Hem. afr.* 3, 1865, pp. 148—151. — Latin.
507. [de l'Acien Monde]. Stål. *Enum. Hem.* 4, 1874, pp. 83—85. — Latin.
508. [d'Amérique]. Stål. *Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh.* 1859, p. 383; *Hem. Fabr.* 1, 1868, pp. 126—129. — Latin.
509. Reuter. Monographia generis *Oncocephalus* Klug. proximeque affinium. *Acta Soc. Scient. Fenni* 12, 1882, pp. 673—758, tab. 1—3. Tirage à part 4°, 86 pp. — Synopsis et descriptions très détaillées des espèces. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

510. [*Pygolampis*]. Stål. *Öfv. Vet. Akad. Förh.* 1859, pp. 378—379. — Latin.
511. [*Pnirontis* Stål.]. Stål. L. c. 1859, pp. 381—382. — Latin.
512. [*Pnirontis* de l'Amér. centr.]. *Champion*. *Biol. Centr. Amer. Heter.* 2, 1898, p. 132. — Anglais.
513. [*Gnathobleda* Stål de l'Amér. centr.]. *Champion*. L. c. p. 134.
514. [*Diaditus* Stål de l'Amér. centr.]. *Champion*. L. c. pp. 138—139.

Subf. **Salyavatinae.**

515. [Synopsis des genres]. Stål. *Enum. Hem.* 4, 1874, pp. 80—81. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

516. [*Petalochirus* Pal. Beauv. de la faune éthiopienne]. Varela. *Mem. Soc. Españ. d. Hist. Nat.* 1, 1903, p. 130. — Espagnol.
517. [*Lisarda* Stål.]. Stål. *Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh.* 1859, p. 192. — Latin.

Subf. **Holoptilinae.**

518. [Synopsis des genres]. Stål. En. Hem. 4, 1874, p. 5. — Latin.
519. [Synopsis des espèces du g. *Ptilocerus* Gray]. Montandon. Ann. Mus. Nat. Hung. 5, 1907, pp. 417—421. — Français.

Subf. **Reduviinae.**

= *Acanthaspidina*.

Synopsis des genres.

520. [du globe]. Stål. Hem. afr. 3, 1865, pp. 119—123; [Addenda] Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 123 et 125. — Latin.
521. [de l'Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 63—67. — Latin.
522. [d'Amérique]. Stål. L. c. 2, 1871, pp. 108—110.
523. [voisins du g. *Reduvius* Fabr.]. Jakovlev. Rev. Russe d'Ent. 1, 1901, pp. 101—102. — Français.
524. [voisins du g. *Durganda* Am. et Serv.]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1870, pp. 693—694. — Latin.
525. Stål. Monographie der Gattung *Conorhinus* und Verwandten Berl. Ent. Zeit. 3, 1859, pp. 99—117. — Synopsis des genres, description des espèces. Allemand et latin.
526. Reuter. Monographia generis *Reduvius* Fabr. Lam. Acta Soc. Sc. Fenn. 19, № 15, 1892, 36 pp. — Descriptions détaillées disposées synoptiquement. Latin.
527. Reuter. Monographia generis *Holotrichius* Burm. L. c. 19, № 3, 1891, 39 pp., 2 tt. — Synopsis et descriptions très détaillées. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

528. [*Nalata* Stål]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, p. 191. — Anglais.
529. [*Microlestria* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 195.
530. [*Acanthaspis* Am. et Serv. subg. *Tetroxia* A. S.]. Varela. Bol. Soc. Españ. de Hist. Nat. 3, 1903, pp. 61—62. — Latin.
531. [*Reduvius* F. = *Opsicoetus* Klug]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 125. — Latin.
532. [*Reduvius* = *Opsicoetus* de Russie]. Jakovlev. Bull. Soc. Nat. Moscou 1885, 2, pp. 86—89. — Allemand.
533. [*Leogorrus* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, p. 198. — Anglais.
534. [*Spiniger* Burm.]. Stål. Stett. Ent. Zeit., 1859, pp. 395—404. — Latin.
535. [*Spiniger* de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, p. 202. — Anglais.

536. [*Macrophthalmus* Lap. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 205.
537. [*Meccus* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 209.

Subf. Piratinae.

Synopsis des genres.

538. [du globe terrestre]. Stål. Hem. afr. 3, 1865, pp. 112—113; Öfv. Sv. Vet. Ak. Förh. 1866, pp. 250—252. — Latin.
539. [de l'Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 56. — Latin
540. [d'Amérique]. Stål. L. c. 2, 1871, pp. 104—105.

Species des genres:

541. Horváth. Species generis Reduviidarum *Sirthenea*. Ann. Mus. Nat. Hung. 7, 1909, pp. 356—368. — Monographie; synopsis suivi d'une description très détaillée de toutes les espèces connues. Latin.
542. [*Rasahus* Am. et Serv. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, pp. 214—215. — Synopsis. Anglais.

Subf. Ectrichodiinae.

Synopsis des genres:

543. [du globe terrestre]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1859, pp. 175—176; Hem. afr. 3, 1865, pp. 101—102; [Addenda au précédent]. Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 117—118. — Latin.
544. [de l'Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 45—48. — Latin.
545. [d'Amérique]. Stål. L. c. 2, 1871, p. 101.

Synopsis des espèces des genres:

546. [*Pothea* Am. et Serv. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, p. 211. — Anglais.
547. [*Ectrychotes* Burm. = *Larymna* Stål]. Mayr. Novara-Exped. Zool. 2, Abth. 1, 1866, pp. 156—157. — Allemand.
548. [*Glymmatophora* Stål de la rég. éthiopienne]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 12, 1914, pp. 134—135. — Ce synopsis ne se rapporte qu'aux femelles. Latin.
549. [*Mesonitys* Schmidt]. Schmidt. Zoologischer Anzeiger 32. 1908, pp. 512—513. — Allemand.

Subf. Hammatocerinae.

550. [Synopsis des espèces du g. *Homalocoris* Perty de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, p. 228. — Anglais.

Subf. **Apiomerinae.**

Synopsis des genres.

551. [du globe terrestre]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Soc. Förh. 1866, pp. 247—248; [Addenda au précédent]. Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 114, 116—117. — Latin.
552. [de l'Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, p. 44. — Latin.
553. [d'Amérique]. Stål. L. c. 2, 1871, pp. 92—94.
554. [Synopsis des espèces du g. *Apiomerus* Hhn. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, pp. 231—233. — Anglais.

Subf. **Harpactorinae.**

= *Reduviina* Stål.

Synopsis des genres.

555. [d'Afrique, d'Asie et d'Australie]. Stål. Hem. afr. 3, 1865, pp. 46—57; [Addenda au précédent]. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 101; Öfv. Sv. Vet. Soc. Förh. 1870, pp. 676—677, 684, 689—690. — Latin.
556. [de l'Ancien Monde]. Stål. Enum. Hem. 4, 1874, pp. 6—14.
557. [d'Amérique]. Stål. L. c. 2, 1871, pp. 67—70. — Ce synopsis avec le précédent sont indispensables à consulter, le premier synopsis générique de Stål n° 555, comme plus ancien, est bien moins important. Latin.
558. [de l'Ancien Monde qui ont la tête bi-épineuse ou bituberculée derrière les antennes]. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1861, pp. 129—131. — Latin.
559. [d'Amérique non munis d'un tubercule sur les mésopleures]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1866, pp. 292—296; [Addenda au précédent] Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 104—105. — Latin.
560. [voisins du g. *Eulyes* Am. et Serv.]. A. Dohrn. Stett. Ent. Zeit. 1859, pp. 91—99. — Latin et allemand.
561. [voisins du g. *Rhinocoris* Hhn. = *Reduvius* Stål et habitant l'Ancien Monde]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1866, pp. 283—285. [Addenda au précédent]. Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 110—111. — Latin.
562. [voisins du g. *Myocoris* Burm.]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1859, pp. 366—367. — Latin.
563. [voisins du g. *Sinea* Am. et Serv.]. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1861, p. 137. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

564. [*Rhaphidosoma* Am. et Serv. d'Afrique]. Jeannel. Bull. Soc. Ent. France, 1914, pp. 154—156. — Français.
565. [*Vachiria* Stål]. Poppius. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. 51, № 20, 1908, 16 pp. — En outre du synopsis il s'y trouve des descriptions de toutes les espèces. Allemand.

566. [*Vachiria* Stål]. Jakovlev. Horae Soc. Ent. Ross. 36, 1903, p. 200. — Français.
567. [*Zelus* Fabr. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, pp. 251—252. — Anglais.
568. [*Milyas* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. pp. 244—245.
569. [*Notocyrtus* Burm.]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, pp. 105—106. — Latin.
570. [*Notocyrtus* de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Americ. Heter. 2, 1899, pp. 263. — Anglais.
571. [*Castolus* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 278.
572. [*Graptocleptes* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 281.
573. [*Repipta* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. pp. 267—268.
574. [*Rocconota* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 272.
575. [*Heza* Am. et Serv. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 285.
576. [*Heza*]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 100. — Latin.
577. [*Coranus* Curt. d'Europe]. Reuter. Berl. Ent. Zeit. 25, 1881, pp. 162—163]. — Latin.
578. [*Margasus* Stål]. Varela. Bolet. Socied. Españ. Hist. Nat. 5, pp. 148—149. — Espagnol.
579. [*Ploeogaster* Am. et Serv.]. Stål. Hem. Fabr. 1, 1868, p. 98. — Latin.
580. [*Aristippus* Stål]. Stål. L. c. p. 99.
581. [*Arilus* Hhn. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, p. 287. — Anglais.
582. [*Acholla* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 289.
583. [*Nagusta* Stål]. Bergroth. Deut. Ent. Zeit. 1907, pp. 581—582. — Allemand.
584. [*Sinea* Am. et Serv. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 291.
585. [*Sinea*]. Caudell. Journ. New York Ent. Soc. 9, 1901, pp. 1—12, tab. 1—2. — Synopsis et descriptions des espèces. Anglais.

Fam. Nabidae.

586. Reuter et Poppius. Monographia Nabidarum orbis terrestris. Pars prior. Acta Soc. Scient. Fenn. 37, № 2, 1909, 62 pp. 1 t. col. — Synopsis et descriptions très détaillées des genres et des espèces; ouvrage le plus important pour l'étude des *Pachynominae* et des *Prostemminae*, la sous-f. *Nabinae* n'ayant pas encore paru. Latin.
587. [Synopsis des sous-familles]. Stål. En. Hem. 3, 1873, p. 106. — Latin.
588. [Énumération des espèces extra-européennes]. Stål. L. c. pp. 106—114.

Faunes.

589. [Finlande et Suède]. Reuter. Öfv. Sv. Vet. Soc. Akad. Förh. 1872, № 6, pp. 67—77. — Latin et suédois.
590. [France]. Mulsant et Rey. Conf. n° 485, pp. 61—100. — Français.

Subf. **Pachynominae.**

591. [Monographie]. Reuter et Poppius. Conf. n° 586, pp. 4—7.

Subf. **Prostemminae.**

= *Nabinae* Stål, Reut.

592. [Monographie]. Reuter et Poppius. Conf. n° 586, pp. 7—60.
593. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, p. 107. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

594. [*Pagasa* Stål de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, p. 298. — Anglais.
595. [*Phorticus* Stål de la rég. éthiopienne]. Reuter. Wien. Ent. Zeit. 12, 1893, pp. 316—320. — Outre le synopsis, contient des descriptions détaillées. Le premier est en allemand, les secondes en latin.
596. [Synopsis des variétés de la *Prostemma guttula* Fabr.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, p. 96. — Latin.

Subfam. **Nabinae.**

= *Coriscina* Stål = *Reduviolinae* Reut.

597. [Synopsis des genres extra-européens]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 110—111. — Latin.

Synopsis des sous-genres du g. *Nabis* Latr.

598. Reuter. Rev. d'Ent. 9, 1890, pp. 203—205. — Latin.
599. Kirkaldy. Faun. Hawaiiensis 2, prt. 6, 1908, p. 546. — Sont traitées les sous-gg. de la faune de Hawaii. → Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

600. [*Gorpis* Stål]. Reuter. Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 1909, pp. 423—430. — Latin.
601. [*Nabis* Latr.]. Reuter. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1872, № 6, pp. 80—81. — Latin.
602. [*Nabis* subg. *Hoplistoscelis* Reut.]. Reuter. Rev. d'Ent. 9, 1890, pp. 295—296. — Latin.
603. [*Nabis* subg. *Nabis* Latr. = *Aptus* Hhn. de la rég. paléarctique]. Reuter. L. c. p. 301.
604. [*Nabis* voisins de *N. ferus* L.]. Reuter. Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. 5, 1880, pp. 189—190. — Latin.

605. [*Nabis*=*Reduviolus* Kirk. de l'arch. Hawaiien]. Kirkaldy. Fauna. Hawaiens. 3, prt. 2, 1902, pp. 153—154; Proceed. Hawaiian Ent Soc. 2, 1908, pp. 49—69, tab. 1. — Dans le second article les synopsis est suivi de descriptions des espèces. Anglais.
606. [*Nabis* de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1899, pp. 301—302. — Anglais.
607. [Synopsis des variétés de *Nabis lativentris* Boh.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, p. 95. — Latin.

Fam. Hebridae.

= *Naeogetidae*.

608. [Synopsis des genres]. De la Torre Bueno. Canad. Ent. 1912, pp. 32. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

609. [*Hebrus* Curt. d'Europe]. Péneau. Bull. Soc. Nat. Ouest. (2), 4, 1904, pp. 257—258. — Je n'ai pas vu cet article.
610. [*Hebrus* Curt. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, p. 118. — Anglais.
611. [*Merragata* White de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 121.
612. [*Merragata*]. De la Torre Bueno, Canad. Entom. 1912, p. 32; Bol. d. l. Socied. Aragonesa d. Cienc. Natur. 11, 1912, p. 176. — Ces deux synopsis sont identiques, mais le premier est en anglais, et le second en espagnol.

Superf. Cimicoideae.

613. Kirkaldy. List of the genera of the Pagiopodous *Hemiptera-Heteroptera*... and also of the aquatic and semiaquatic *Trochalopoda*. Trans. Amer. Ent. Soc. 32, 1906, pp. 117—156 b. — Énumération des genres avec indication de leurs synonymes et de leurs types spécifiques; contient, outre la superfam. *Cimicoideae*, les familles *Hebridae* et *Mesoveliidae* et les series *Trichotelocera*, *Hydrobiotica* et *Sandaliorhyncha*. Anglais.
614. Reuter. Genera Cimicidarum Europae. Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handl. 3, № 1, 1873, 66 pp. — Synopsis des genres. Latin.
615. Reuter. Skandinaviens och Finlands Acanthiider. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1871, pp. 403—429. — Descriptions des genres et des espèces; l'article contient la superfamille des *Cimicoideae* à l'exception des Capsides et en outre la fam. des *Ceratocombidae*. Latin et suédois.

Fam. Polytectidae.

616. Jordan. Contribution to our knowledge of the morphology and systematics of the *Polytectidae*, a family of Rhynchota parasitic on Bats. Novit. Zool. 18, 1912, pp. 555—579, tt. 11—12. — Descriptions détaillées de la famille, des genres et des espèces. Anglais.

617. [Synopsis des genres]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 8, 1910, pp. 573—574. — Français.

Fam. Cimicidae.

= *Acanthiidae* = *Clinocoridae*.

618. Jordan and Rotshild. Notes on the *Clinocoridae*, a family of Rhynchota. Novit. Zool. 19, 1913, pp. 352—356. — Contient un synopsis des sous-familles. Anglais.
619. [Synopsis des genres et énumération des espèces extra-européennes]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 103—104. — Latin.
620. [Synopsis des genres et des espèces d'Amérique]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 10, 1912, pp. 257—262. — Contient des données bibliographiques complètes. Anglais.
621. [Synopsis des espèces européennes du g. *Cimex* L. = *Clinocoris* Fall.]. Horváth. L. c. 8, 1910, p. 362. — Latin.
622. [Traduction du synopsis précédent]. Reuter. Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. 37, 1911, pp. 137—138. — Suédois.

Fam. Anthocoridae.

623. Reuter. Monographia Anthocoridarum orbis terrestris. Acta Soc. Scient. Fenn. 14, 1884, pp. 555—758. [Tirage à part pp. 1—204]. — Synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces; contient les familles actuelles: *Anthocoridae*, *Microphysidae* et *Termtophyllidae*. Latin.
624. Poppius. Beiträge zur Kenntnis der Anthocoriden. L. c. 37, № 9, 1909, pp. 1—43. — Beaucoup d'additions à l'ouvrage précédent; l'arrangement des genres est complètement différent. Ces deux travaux constituent la base de nos connaissances des Anthocorides. Allemand.
625. [Synopsis des tribus]. Poppius. L. c. p. 2.
626. [Synopsis des genres]. Fieber. Wien. Ent. Monat. 4, 1860, pp. 262—267, tab. 2. — Les Microphysides y sont incluses. Allemand.
627. [Synopsis des genres d'Europe]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, pp. 90—91. — Latin.

Trib. Lyctocoraria Reut. sens. Popp.

628. [Synopsis des genres]. Poppius. Acta Soc. Sc. Fenn. 37, № 9, 1909, pp. 3—6. — Allemand.

Synopsis des espèces des genres:

629. [*Lasiochilus* Reut. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1900, pp. 307. — Anglais.
630. [*Piezostethus* Fieb. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 315.
631. [*Asthenidea* Reut. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 317.

632. [*Cardiastethus* Reut. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 330.
 633. [*Solenonotus* Reut. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 334.

Trib. **Anthocoraria** Reut. sens. Popp.

634. [Synopsis des genres]. Poppus. Acta Soc. Sc. Fenn. 37, № 9, 1909, pp. 27—29. — Allemand.

Synopsis des espèces des genres:

635. [*Macrotrachelia* Reut. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1900, p. 319. — Anglais.
 636. [*Anthocoris* Fall. d'Europe]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, pp. 91—92. — Latin.
 637. [*Anthocoris* d'Angleterre]. Edwards. Entom. Month. Mag. (2), 1, 1890, p. 236. — Anglais.
 638. [*Anthocoris* d'Allemagne]. Gulde. Deut. Ent. Zeit. 1912, pp. 328—330. — Allemand.
 639. [*Anthocoris* de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1900, p. 323. — Anglais.
 640. [*Triphleps* Fieb. d'Europe]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova 12, 1878, pp. 92—93. — Latin.
 641. [*Triphleps* de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1900, p. 326. — Anglais.

Fam. **Microphysidae**.

642. [Monographie]. Reuter. Conf. n° 623, pp. 723—744 [tir. à part, pp. 169—190]. — Latin.

Fam. **Teratophylidae**.

643. Reuter et Poppus. Zur Kenntnis der Teratophyliden. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. 54, № 1, 1911, pp. 1—17. — Synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces connues. Allemand.

Fam. **Capsidae**.

= *Miridae* = *Phytocoridae*.

644. Atkinson. Catalogue of the *Capsidae*. Suppl. Journ. Asiat. Soc. of Bengal 58, prt. 2, 1889, pp. 25—200. — Énumération des espèces du monde entier et de leurs synonymes.
 645. Reuter. Hemipterologische Spekulationen. I. Die Klassifikation der Capsiden [dans] Festschrift für Palmén 1905, № 1, pp. 1—58. — Classification et phyllogénèse des tribus. Allemand.
 646. [Synopsis des sous-familles et des tribus]. Reuter. Conf. n° 35, Acta Soc. Scient. Fenn. 37, № 3, 1910, pp. 109—134. — Contient les tribus du monde entier et leurs caractéristiques détaillées; exposition des derniers résultats de l'auteur sur la classification des Capsides; plusieurs changements dans la nomenclature que je ne puis pas adopter. Tout-à-fait indispensable. Latin.

Synopsis des tribus.

- 647. Reuter. Hemipt. Gymnoc. Europae 3, 1883, pp. 564—568. — Latin.
- 648. Reuter. Festschr. f. Palmén № 1, 1905, pp. 26—29. — Allemand.
- 649. Kirkaldy. [Traduction du synopsis précédent]. Canad. Entom. 38, 1906, pp. 370—372. — Anglais.
- 650. [Synopsis des genres]. Fieber. Kriterien zur generischen Theilung der Phytocoriden, Wien. Ent. Monat. 2, 1858, pp. 300—327, tab. 6. — Allemand.
- 651. [Énumération de tous les genres]. Reuter. Acta Soc. Scient. Fenn. 37, № 3, 1910, pp. 141—167. — Les genres sont répartis par tribus. Allemand.

Faunes.

- 652. [Rég. paléarctique]. Reuter. Hemiptera Gymnocerata Europae. Acta Soc. Scient. Fenn. Vol. I l. c. 13, 1883 [tir. à part 1878], pp. 1—187, tab. 1—8 col.; Vol. II l. c. 13, 1883 [tir. à part 1879], pp. 189—312, tab. 1—5 col.; Vol. III l. c. 13, 1883, pp. 313—563, tab. 1—5 col.; Vol. IV l. c. 23, № 1, 1891, pp. 1—179, tab. 1—6 col.; Vol. V l. c. 33, № 2, 1896, pp. 1—392, tab. 1—10 col. — Ouvrage le plus important sur les Capsides; les espèces de la sous-région mandjoue en sont exclues. Œuvre presque terminée. Synopsis et descriptions très détaillées des tribus, des genres et des espèces. — Latin.
- 653. [Scandinavie et Finlande]. Reuter. Hemiptera Gymnocerata Scandinaviae et Fenniae. I. *Cimicidae* (*Capsina*). Acta Soc. Sc. Fenn. 1—206. — Synopsis et description des genres et des espèces. Latin.
- 654. [Allemagne]. Kirschbaum. Rhynchographische Beiträge. I. Die Capsinen der Gegend von Wiesbaden. Jahrb. Ver. f. Nat. Herz. Nassau. 10, 1855, pp. 161—345. — Synopsis des espèces. Allemand.
- 655. [Allemagne]. Hüeber. Synopsis der deutschen Blindwanzen. Jahrb. Ver. f. Vaterl. Naturk. in Württemberg 1894—1914. Edition séparée, Stuttgart, 2 Vol. (17 livr.) 1894—1914. 8°, 1, 480 pp., 2, 646 pp. — Ouvrage basé sur les Hem. Gymnoc. Europae de Reuter. Synopsis et descriptions des tribus, des genres et des espèces; données très détaillées sur la distributions des dernières dans l'Europe centrale. Allemand.
- 655 a. [Suisse]. Meyer. Verzeichniss der in der Schweiz einheimischen Rhynchoten. Erstes Heft. Die Familie der *Capsini*. Solothurn. 1843, 8°, 115 pp., 7 tt. col. — Diagnoses très courtes des espèces; ouvrage n'ayant actuellement qu'une certaine valeur historique. Allemand.
- 656. [Turkestan]. Reuter. — Рейтеръ [in] Путешествіе въ Туркестанъ А. П. Федченко. Вып. 19, 2, ч. 5, Полужесткокрылыя. Москва. 1887, 39 pp. — *Capsidae* du Turkestan; descriptions détaillées des espèces. Russe, diagnoses des espèces nouvelles seules en latin.

657. [Rég. néarctique]. Reuter. Bemerkungen über nearctischen Capsiden nebst Beschreibungen neuer Arten. Acta Soc. Sc. Fenn. **36**, № 2, 1909, pp. 1—86. — Plusieurs synopsis des genres et des espèces. Latin.

Trib. Capsaria.

658. [Synopsis des genres paléarctiques]. Reuter. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. **38**, 1896, pp. 156—171. — Latin.
659. [Synopsis des genres et des espèces paléarctiques]. Reuter. Hem. Gymn. Eur. **5**, 1896, pp. 347—392. — Latin.
660. [Synopsis des genres néarctiques]. Reuter. Acta Soc. Scient. Fenn. **36**, № 2, 1909, pp. 8—13. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

661. [*Pithanus* Fieb.]. Reuter. Natural. Siciliano **10**, 1890, p. 2. — Latin.
662. [*Hyalopeplus* Stål]. Reuter. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. **47**, № 12, 1905, p. 2—3. — Latin.
663. [*Hyalopeplus*]. Poppius. Ann. Mus. Nat. Hung. **10**, 1912, pp. 416—417. — Allemand.
664. [*Phytocoris* Fall. paléarctiques]. Reuter. Ann. Soc. Ent. France (5), **7**, 1877, pp. 13—34, tab. 2 col. — Latin.
665. [*Phytocoris* paléarct.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova. **12**, 1878, pp. 85—87. — Latin.
666. [*Phytocoris* néarctiques]. Reuter. Acta Soc. Sc. Fenn. **36**, № 2, 1909, pp. 14—18. — Latin.
667. [*Adelphocoris* Reut. de Chine]. Reuter. Ann. Mus. Zool. St.-Petersb. **10**, 1906, pp. 8—11. — Latin.
668. [*Grypocoris* Dgl. and Sc.]. Reuter. Wien. Ent. Zeit. **15**, 1896, pp. 255—256. — Latin.
669. [*Calocoris* Fieb. voisins de *C. costae* Reut.]. Reuter. L. c. **7**, 1888, pp. 99—100. — Latin.
670. [*Eurystylus* Stål]. Poppius. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. **53**, № 4, 1910, pp. 1—20. — Monographie; outre le synopsis descriptions de toutes les espèces. Allemand.
671. [*Lygus* Hhn. de Chine]. Reuter. Ann. Mus. Zool. St.-Petersbourg. **10**, 1906, pp. 24—28. — Latin.
672. [*Lygus* des rég. orientale et australienne]. Poppius. Ann. Mus. Nat. Hung. **12**, 1914, pp. 337—343. — Allemand.
673. [*Camptobrochis* Fieb. néarctiques]. Reuter. Acta Soc. Sc. Fenn. **36**, № 2, 1909, pp. 52—54. — Latin.

Trib. Restheniaria.

674. [Synopsis des genres américains]. Reuter. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. **55**, № 18, 1913, pp. 7—11. — Latin.

675. [Synopsis des espèces du g. *Lopus* Hhn.]. Reuter. Hem. Gymn. Eur. 5, 1896, pp. 391—392. — Latin.

Trib. Dionconotaria.

676. [Synopsis des espèces du g. *Dionconotus* Reut.]. Reuter. L. c. p. 392.

Trib. Miraria.

677. Reuter. Übersicht der paläarktischen *Stenodema* Arten. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 46, № 15. 1904, pp. 1—21. — Monographie du genre; synopsis et descriptions détaillées des espèces. Latin.
678. [Synopsis des espèces paléarctiques du g. *Trigonotylus* Fieb.]. Reuter. Ent. Month. Mag. (2), 4, 1893, p. 110. — Latin.

Subf. Cylapinae.

679. Poppus. Zur Kenntnis der Miriden-Unterfamilie *Cylapinae*. Acta Soc. Sc. Fenn. 37, № 4, 1909, pp. 1—45, tab. 1 col. — Plusieurs synopsis; beaucoup d'espèces nouvelles. Allemand.

Trib. Cylaparia.

680. [Synopsis des genres]. Poppus. L. c. pp. 2—3.

Synopsis des espèces des genres:

681. [*Rhinocylapus* Popp.]. Poppus. L. c. p. 5.
682. [*Rhinomiris* Kirk.]. Poppus. L. c. p. 7 et Ann. Soc. Ent. Belg. 54, 1910, pp. 236—237. — Allemand.
683. [*Vannius* Dist.]. Poppus. L. c., p. 14.

Trib. Fulviaria.

684. [Synopsis des genres]. Poppus. L. c. p. 19.
685. Reuter. Zur Kenntnis der Gattung *Fulvius*. Entom. Tidskr. 1895, pp. 129—154. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

686. [*Fulvius* Stål]. Poppus. L. c. pp. 29—32.
687. [*Peritropis* Uhl.]. Poppus. L. c. p. 24.

Trib. Bryocoraria.

688. Poppus. Die afrikanischen Arten der Miriden-Gattung *Helopeltis* Sign. Rev. Zool. afric. 1, 1911, pp. 38—45. — Synopsis et description des espèces. Allemand.

Trib. Dicypharia.

= *Macrolopharia*.

689. [Synopsis des genres et des espèces paléarctiques]. Reuter. Hem. Gymn. Eur. 3, 1883, pp. 559—563. — Latin.

690. Poppus. Über die Gattung *Araspus* Dist. Wien. Ent. Zeit. 31, 1912, pp. 227—232. — Synopsis et descriptions de toutes les espèces connues. Allemand.

Trib. *Cyllocoraria*.

691. [Synopsis des genres et des espèces paléarctiques]. Reuter. Hem. Gymn. Europae 3, 1883, pp. 543—558. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

692. [*Pilophorus* Hhn. paléarctiques]. Reuter. L. c. 4, 1891, pp. 175—176. — Latin.
693. [*Orthotylus* Fieb. hawaiiens]. Kirkaldy. Fauna Hawaiiensis 3, prt. 2, 1902, pp. 132—133. — Anglais.

Trib. *Laboparia*.

= *Laboparia* + *Myrmecophyaria* + *Hypseloecaria*.

694. [Synopsis des genres et des espèces paléarctiques]. Reuter. Hem. Gymn. Eur. 4, 1891, pp. 157—172. — Latin.

Trib. *Plagiognatharia*.

= *Cremnorrhinaria* + *Oncotylaria* + *Exaeretaria* + *Nasocoraria* + *Plagiognatharia* = *Phylaria*.

695. [Synopsis des genres et des espèces paléarctiques]. Reuter. Hem. Gymn. Eur. 3, 1873, pp. 499—542; 4, 1891, pp. 155—156 et 179. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

696. [*Psallus* Fieb. de Finlande]. Reuter. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 5, 1880, pp. 178—182. — Latin.
697. [*Excentricus* Reut.]. Horváth. Rev. d'Ent. 7, 1888, p. 185. — Latin.
698. [Synopsis des variétés du *Macrotylus nigricornis* Fieb.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova (2), 1, 1884, pp. 485—486. — Latin.

Trib. *Sulamitaria*.

699. [Synopsis des espèces du g. *Sulamita* Kirk.]. Kirkaldy. Faun. Hawaiiensis 3, prt. 2, 1902, p. 130. — Anglais.

Séries Trichotelocera.

700. Reuter. Monographia *Ceratocombidarum* orbis terrestris. Acta Soc. Sc. Fenn. 19, № 6, 1891, pp. 1—27, tab. 1. — Synopsis et descriptions des espèces connues de toute la série. Latin.
701. [Synopsis des genres]. Fieber. Wien. Ent. Mon. 4, 1860, pp. 267—269, tab. 7. — Allemand.
702. [Énumération des genres]. Conf. Kirkaldy n° 613, pp. 147—148.
703. [Faune de la Finlande et de la Scandinavie]. Conf. Reuter n° 615, pp. 405—407. — Latin.

Series Hydrobiotica.

704. [Énumération des genres]. Conf. Kirkaldy n° 613.
705. Kirkaldy and De la Torre Bueno. Catalogue of the american aquatic and semiaquatic Hemiptera. Proc. Amer. Ent. Soc. **10**, 1909, pp. 173—215. — Énumération des espèces néarctiques. Anglais.

Faunes.

706. [Finlande]. J. Sahlberg. Synopsis *Amphibicorisarum* et *Hydrocorisarum* Fenniae. Notis. Sällstr. Fn. Fl. Fenn. Förh. **14**, 1875, pp. 241—301. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces; les fam. *Hebridae*, *Mesoveliidae* et *Corixidae* y sont incluses, mais la fam. *Acanthiidae* manque. Latin, données géographiques en suédois.
707. [Allemagne]. Kuhl-gatz. Rhynchota [in] Brauer. Süßwasserfauna Deutschlands, Heft **7**, 1909, pp. 37—110, avec ff. dans le texte. — Synopsis des genres et des espèces. Allemand.

Superf. Gerroideae.

708. Schummel. Versuch einer genaueren Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten der Fam. der Ruderwanzen *Ploteres* Latr. 1832, 54 pp., 4 tt. — Descriptions des espèces. Allemand.
709. [Synopsis des familles, des sous-familles et des tribus]. De la Torre Bueno. Trans. Amer. Ent. Soc. **37**, 1911, pp. 243—244. — Contient outre les *Gerroideae*, les fam. *Hebridae* et *Mesoveliidae*. Anglais.

Fam. Hydrometridae.

710. [Synopsis des espèces de l'Amér. centr. du g. *Hydrometra* Latr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. **2**, 1898, p. 124. — Anglais.

Fam. Gerridae.

= *Hydrometridae* Fieb.

711. [Synopsis des genres]. Mayr. Novara-Exped. Zool. **2**, Abth. 1, 1866, p. 169. — Allemand.
712. [Synopsis des genres voisins du g. *Halobates* Esch.]. Bianchi. Ann. Mus. Zool. St.-Pétersb. **1**, 1896, pp. 70—71. — Anglais.
713. De la Torre Bueno. The Gerrids of the Atlantic States. Trans. Am. Ent. Soc. **37**, 1911, pp. 243—252. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Anglais.
714. Buchanan White. Report on the Pelagic Hemiptera [in] Voyage of H. M. S. Challenger. Zool. **7**, prt. 19, 1883, 82 pp., 3 tt. — Monographie des genres *Halobates* Eschsch. et *Metrocoris* Mayr (= *Halobatodes* White); synopsis des espèces. Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

715. [*Gerris* Fabr. de Suède]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1868, pp. 395—398. — Latin.

716. [*Gerris* subg. *Gerris* = sbg. *Limnotrechus* Stål de Finlande]. Reuter. Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. 5, 1880, pp. 191—192. — Latin.
717. [*Gerris* in sp. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, p. 145. — Anglais.
718. [*Gerris* subg. *Limnometra* Mayr de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 152.
719. [*Potamobates* Champ.]. Champion. L. c. p. 154.
720. [*Rheumatobates* Bergr.]. De la Torre Bueno. Ohio Natur. 8, 1908, pp. 380—382, ff. 1—5. — Anglais.
721. [*Metrocoris* Mayr.]. Kirkaldy. Entomol. 37, 1904, pp. 61—62. — Anglais.

Fam. Veliidae.

Synopsis des espèces des genres:

722. [*Velia* Latr. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1898, p. 141. — Anglais.
723. [*Rhagovelia* Westw. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 131—132.
724. [*Rhagovelia*]. Kirkaldy. Entomol. 34, 1901, pp. 308—310. — Anglais.
725. [*Microvelia* Westw. de l'Amér. centr.]. Champion. L. c. p. 126—127.

Fam. Leptopodidae.

726. Horváth. Révision des Létopodes. Ann. Mus. Nat. Hung. 9, 1911, pp. 358—370, ff. 1—5. — Synopsis des genres et des espèces. Français.

Fam. Acanthiidae.

= *Saldidae*.

727. Reuter. Zur generischer Theilung der paläarktischen und nearktischen Acanthiaden. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 54, № 12, 1912, pp. 1—12. — Synopsis et caractéristiques détaillées des genres. Latin et allemand.
728. [Synopsis des genres]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 9, 1911, p. 335, tab. 1. — Latin.
729. [Énumération des espèces extra-européennes]. Stål. Enum. Hem. 3, 1873, pp. 148—149. — Latin.
730. Reuter. Species palaearticae generis *Acanthia* Fabr., Latr. Acta Soc. Sc. Fenn. 21, № 2, 1895, pp. 1—58, tab. 1. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces paléarctiques du g. *Acanthia* s. l. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

731. [*Acanthia* Fabr. Latr. sens. lat. = *Salda* F.]. Fieber. Wien. Ent. Monat. 3, 1859, pp. 233—241. — Allemand.

732. [*Acanthia* s. lat. = *Salda* de la Suède]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1868, pp. 387—393. — Latin.
733. [*Acanthia* finlandaises voisines de l'*A. saltatoria* L.]. Reuter. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 5, 1880. pp. 155—157. — Latin.
734. [*Acanthia* des îles Hawaii]. Kirkaldy. Fauna Hawaiiensis 3, prt. 1, 1902, p. 146. — Anglais.
735. [*Acanthia* s. l. = *Salda* néarctiques]. Uhler. Bull. Geol. and Geogr. Survey Territ. (2), 3, 1877, pp. 429—453. — Synopsis accompagné de descriptions des espèces. Anglais.
736. [*Acanthia* s. l. = *Salda* de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1900, p. 338. — Anglais.
737. [*Chiloxanthus* Reut.]. Kiritschenko. Ann. Mus. Zool. St. Pétersb. 16, 1911, pp. 545—546. — Latin.

Superff. **Notonectoideae + Ochteroideae + Corixoideae.**

= *Cryptocerata*.

738. Fieber. Genera Hydrocoridum secundum ordinem naturalem in familias disposita. Abh. Böhm. Ges. Wissensch. Prag. (5), 7, 1851, pp. 181—212, tt. 1—4. — Caractéristiques détaillées des familles et des genres. Latin.
739. Hüeber. Deutsche Wasserwanzen. Jahrb. Ver. f. Vaterl. Naturk. in Württemberg. 61, 1905, pp. 91—176. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces d'Allemagne. Allemand.
740. Kirkaldy. A guide to the study of British Waterbugs (Aquatic Rhynchota). Entomologist 31, 1898, pp. 177—180, 203—205; 32, 1899, pp. 3—8, 108—115, 151—154, 200—214, 296—300; 33, 1900, pp. 148—152; 38, 1905, pp. 173—178, 230—236, t. 2; 39, 1906, pp. 60—64, 79—83, 154—157; 41, 1908, p. 37. — Contient outre le groupe des *Cryptocerata*, la phalange des *Hebriformes*, et la superf. *Gerroideae* de la faune anglaise; synopsis des familles, des genres et des espèces. Anglais.

Fam. **Notonectidae.**

Monographies de la familles.

741. Kirkaldy. Revision of the *Notonectidae*. Part I. Introduction and systematic Revision of the genus *Notonecta*. Trans. Ent. Soc. London 1897, pp. 393—426. — Synopsis des genres et des espèces du g. *Notonecta*; description de ces dernières. Anglais.
742. Kirkaldy. Über Notonectiden. II. Teil. Wien. Ent. Zeit. 23, 1904, pp. 111—135. — Contient la description de la majeure partie des genres: *Anisops*, *Buenoa*, *Nychia*, *Martarega* et *Ploa*; continuation de l'article précédent. Allemand.

743. Fieber. Die Gruppe der *Notonectae*. Abhandl. Böhm. Ges. Wissensch. Prag (5), 7, 1851, pp. 470—485. — Description des genres et des espèces. Allemand.
744. Fieber. Monographie der Gattung *Ploa* [= *Plea* Leach.]. Entom. Mon. 1844, pp. 16—19, tt. 1—2. — Allemand.
745. Bueno, de la Torre. The genus *Notonecta* in America North of Mexico. Journ. New York Ent. Soc. 13, 1905, pp. 143—167, t. 7. — Synopsis et description détaillées des genres et des espèces de la faune néartique. Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

746. [*Anisops* Spin. de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2, 1901, pp. 371—372. — Anglais.
747. [*Buenoa* Kirk. des États Unis.]. De la Torre Bueno. Journ. New York Ent. Soc. 17, 1910, pp. 74—77. — Anglais.

Fam. Naucoridae.

748. [Synopsis des genres]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Soc. Förh. 1861, pp. 201—202. — Latin.
749. [Synopsis des genres et énumération des espèces]. Stål. Enum. Hem. 5, 1876, pp. 141—147. — Latin.
750. Montandon. Hemiptera Cryptocerata. Fam. Naucoridae. Sous-fam. *Cryptocricinae*. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1897, pp. 6—23. — Synopsis et description détaillées des genres, synopsis des espèces du g. *Ambrysus* Stål. Français.
751. Horváth. Monographia generis *Aphelocheirus* West. — Termesz. Füzet. 22. 1899, pp. 256—267, ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Latin.

Synopsis des espèces des genres:

752. [*Naucoris* Fabr.]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova. 12, 1878, p. 96. — Espèces d'Italie. Latin.
753. [*Ambrysus* Stål]. Montandon. Bulet. Soc. Sciint. d. Bucuresci 17, 1898, pp. 317—323 et 329. — Français.
754. [*Limnocoris* Stål]. Montandon. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 48, 1898, pp. 415—425. — Français.

Fam. Nepidae.

755. [Synopsis des genres]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1861, pp. 202—203; Hem. afr. 3, 1865, pp. 185—186. — Latin.
756. Eug. v. Ferrari. Die Hemipteren-Gattung *Nepa* Latr. (sens. natur.) monographisch bearbeitet. Annal. Naturh. Hofmus. Wien 3, 1888, p. 161—194, tt. 8, 9. — Synopsis et descriptions des espèces Latin et allemand.

Synopsis des espèces du g. *Ranatra* Fabr.

757. Mayr. Novara-Exped. Zoologie 2, Abth. 1, 1866, pp. 190—193.—
Allemand.
758. [de la rég. paléarctique]. Bergroth. Rev. d'Ent. 11, 1912,
p. 127. — Latin.
759. [de la partie Nord-Est des États Unis]. De la Torre Bueno.
Canad. Entom. 37, 1905, p. 188. — Anglais.

Fam. Belostomatidae.

760. Mayr. Die Belostomiden monographisch bearbeitet. Verh. zool.-
bot. Ges. Wien 21, 1871, pp. 399—440. — Synopsis des genres et
des espèces. Allemand.

Synopsis des genres.

761. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1861, pp. 204—205; Hem. afr.
3, 1865, pp. 178—180. — Latin.
762. Mayr. Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 13, 1863, pp. 341—343. —
Allemand.
763. De la Torre Bueno. Canad. Ent. 39, 1907, p. 336. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

764. [*Belostoma* Latr.]. Mayr. Hemiptera Novara-Exped. Zool. 2,
Abth. 1, 1866, pp. 184—186. — Allemand.
765. [*Hydrocyrius* Stål = *Diplonychus* Bueno]. De la Torre Bueno,
Canad. Entom. 39, 1907, p. 339. — Anglais.

Fam. Mononychidae

= *Nerthridae*.

766. [Synopsis des genres], Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1861,
p. 201. — Latin.
767. [Synopsis des genres et énumération des espèces]. Stål. Berl.
Ent. Zeit. 7, 1863, pp. 405—408; Enum. Hem. 5, 1876, pp.
137—140. — Latin.

Fam. Ochteridae

= *Pelagonidae*.

768. [Synopsis des espèces du g. *Ochterus* Latr. = *Pelogonus* Latr.
de l'Amér. centr.]. Champion. Biol. Centr. Amer. Heter. 2,
1900, pp. 344—345. — Anglais.

Fam. Corixidae.

769. [Énumération des genres]. Conf. Kirkaldy n°. 613.
770. [Synopsis des genres]. Kirkaldy. Canad. Entom. 40, 1908, pp.
117—118. — Anglais.

Faunes:

771. [Finlande]. J. Sahlberg. Conf. n° 706.
772. [Allemagne]. Conf. Kuhlitz n° 707 et Hübner n° 739.
773. [Angleterre]. Buchanan White. Ent. Month. Mag. 10, 1873, pp. 75—77. — Synopsis des genres et des espèces. Anglais.
773a. [Anglererre]. Kirkaldy. Conf. n° 740.
774. [Région néarctique]. Conf. Kirkaldy and De la Torre Bueno n° 705.

Monographies des genres.

775. Fieber. Species generis *Corixa* monographice dispositae. Abh. Böhm. Ges. Wissensch. (5), 7, 1851, pp. 213—260, tt. 1—2. — Latin et allemand.
776. Fieber. Monographie der Gattung *Sigara* [= *Micronecta*]. Entom. Monogr. 1844, pp. 11—16, tab. 1. — Allemand.

Synopsis des espèces des genres:

777. [*Corixa* Latr. sens. lat. = *Corisa* Geoffr.]. Fieber. Bull. Soc. Nat. Moscou. 1848, pp. 505—539, t. 10. — Allemand.
778. [*Corixa* d'Europe]. Fieber. Wien. Ent. Monats. 1864, pp. 205—210. — Addenda au synopsis de son ouvrage Europ. Hemipteren. Allemand.
779. [*Corixa* de Suède]. Thomson. Opusc. entom. 1869, pp. 26—40. — Latin.
780. [*Corixa* de Suède]. Wallengren. Ent. Tidskr. 1894, pp. 129—164. — Synopsis et description des sous-genres et des espèces. Suédois.
781. [*Corixa* de la France septentr.]. Lethierry. Catal. Hém. dép. du Nord. 1874, pp. 49—50. — Français.
782. [*Micronecta* Kirk. = *Sigara* Fabr.]. Rey. Rev. d'Ent. 9, 1890, pp. 31—32. — Français.
783. [*Micronecta* paléarctiques]. Horváth. Rev. d'Ent. 18, 1899, pp. 101—104. — Français.
784. [*Micronecta* de Java]. Breddin. Societas Entom. 20, 1905, p. 57. — Allemand.

Subordo HOMOPTERA.

Series Auchenorrhyncha.

= *Cicadariae*.

Catalogues.

785. Walker. List of the specimens of Homopterous Insects in the collection of the British Museum. 1—4. London 1850—1852, 12°, 1188 pp., 8 tt.; and Supplement 1858, 369 pp. — Énumération des espèces connues, descriptions des espèces nouvelles; les Psyllides y sont incluses, défaux nombreux. Latin et anglais.
786. Fieber. Katalog der europäischen Cicadinen nach Originalien mit Benutzung der neuesten Literatur. Wien 1872, 19 pp. — Liste des espèces. Latin.
787. Hüeber. Systematisches Verzeichnis der deutschen Zikadinen. Jahresh. Ver. f. Vaterl. Naturk. Württemb. 16, 1904, pp. 253—274. — Énumération des espèces. Allemand.

Familles.

788. Hansen. Gamle og nye Hovedmomenter til Cicadariernes Morphologi og Systematik. Ent. Tidskr. 1890, pp. 19—76, tt. 1, 2. — Caractères morphologiques et leur valeur systématique. Synopsis des familles. Le dernier est en latin, le reste de l'ouvrage en danois. Une traduction anglaise de la partie essentielle de cet article a été publiée par Kirkaldy dans l'„Entomologist“ 33—36, 1900—1906.
789. [Synopsis des familles]. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1858, pp. 233—234. — Latin.

Synopsis des genres.

790. [d'Europe]. Fieber. Revue et Mag. d. Zool. 1875, pp. 288—416, tt. 10—13; 1876, tt. 3—13. — Français.
791. [de l'Europe centrale]. Math. Mayr. Tabellen zum Bestimmen der Familien und Gattungen der Cicadinen von Centraleuropa. Programm d. Gymnasiums von Hall in den Schulj. 1882—83, 1883—84; éditions séparée: Innsbruck 1884, 8°, 41 pp. — Basé sur le synopsis précédent. Allemand.

Faunes.

792. [Europe]. Fieber. Les Cicadines d'Europe d'après les originaux et les publications les plus récentes. Traduit de l'allemand par

- Reiber. Rev. et Mag. de Zool. 1875, pp. 288—416, tt. 10—13; 1876, pp. 11—268, tt. 3—13; 1877, pp. 1—45; 1878, pp. 270—308; 1879, pp. 65—160. — Description des espèces disposée selon la méthode analytique; ouvrage resté incomplet; n'ont paru que les synopsis des familles et des genres et ceux des espèces appartenant aux fam. *Cicadidae* et *Membracidae* et à la superf. *Fulgoroideae*. Français.
793. [Finlande et Scandinavie]. J. Sahlberg. Öfversigt af Finlands och den Skandinaviska halföns *Cicadariae*. Notis. ur Sällsk. p. Fn. Fl. Fenn. Förh. 12, 1871, pp. 1—506, tt. 1, 2. — Synopsis et descriptions détaillées des genres et des espèces; indispensable pour l'étude de faune de l'Europe septentrionale. Latin et suédois.
794. [Angleterre]. Marshall. An Essay towards a knowledge of British *Homoptera*. Entom. Month. Mag. 1—3, 1864—67, passim. — Trop ancien pour avoir actuellement une valeur pratique. Anglais.
795. [Angleterre]. J. Edwards. A Synopsis of British *Homoptera-Cicadina*. Trans. Ent. Soc. Lond. 1886, pp. 41—129, tt. 1, 2; 1888, pp. 13—108, t. 3. — Synopsis et courtes descriptions des genres et des espèces. Anglais.
796. [Angleterre]. J. Edwards. The *Hemiptera Homoptera (Cicadina and Psyllina)* of the British Islands. London 1896, 8°, 271 pp., 29 tt. color. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces; un grand nombre de ces dernières représentées sur les planches coloriées; les Psyllides, y sont incluses. Anglais.
797. [Angleterre]. Buckton. Monograph of the British Cicadae or Tettigidae. London 8°, I, 1890, 127 pp., tt. A—C, 1—28; II, 1891, pp. 1—206, tt. D—H, 39—74, dont 74 color. — Descriptions insuffisantes, desseins de peu de valeur. Anglais.
798. [Europe centrale]. Melichar. Cicadinen (*Hemiptera-Homoptera*) von Mittel-Europa. Berlin, 1896, 8°, 364 pp., 12 tt. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces appartenant au faunes de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche Hongrie. Allemand.
799. [Allemagne centrale]. Kirschbaum. Die Cicadinen der Gegend von Wiesbaden und Frankfurt a. M., nebst einer Anzahl neuer oder schwer zu unterscheidender Arten aus anderen Gegenden Europas, tabellarisch beschrieben. Jahrb. d. Nassau. Ver. f. Naturk. 21—22. Édition séparée: Wiesbaden, 1868, 8°, 202 pp. — Descriptions disposées selon la méthode analytique; nombre assez considérable d'espèces habitant l'Europe méridionale y sont incorporées. Allemand.
800. [Nord-Ouest d'Italie]. Ferrari. Cicadaria agri Ligustici hucusque lecta. Ann. Mus. Civ. Genova 18, 1882, pp. 73—93. — Synopsis des familles, tribus, genres et espèces. Latin.
801. [Russie centrale: environs de Kupjansk]. Ивановъ. — Ивановъ. Списокъ Кобылокъ, *Cicadina*, окрестностей Купянска съ табли-

- цами для опредѣленія родовъ и видовъ этихъ насѣкомыхъ. Харьковъ, 1888, 8°, 76 pp., 2 tt. — Synopsis des genres et des espèces; quantité des dernières assez restreinte. Russe.
802. [Japon]. Matsumura. Die Cicadinen Japans. Annot. Zool. Japon. 6, 1907, pp. 83—116; 8, 1912. pp. 15—51. — La première partie contient les fam. *Cicadidae* et *Cercopidae*, la seconde les *Membracidae* et les *Jassidae*; énumération des espèces, descriptions des formes nouvelles. Allemand.
803. [Transvaal]. Insecta Transvaalensia. A contribution to a knowledge of the Entomology of S. Africa. London. 4°, 1906—1908, pp. 159—252, tt. 16—23. — Énumération des espèces connues, descriptions des formes nouvelles; presque toutes les espèces sont figurées. Je n'ai pas vu cet ouvrage. Anglais.
804. [Ceylan]. Melichar. Homopteren-Fauna von Ceylon. Berlin. 1903, 8°, 233 pp., 6 tt. — La majeure partie des espèces est décrite, le reste avec citations bibliographiques. Allemand.
805. [Australie et Océanie]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers and their Natural Enemies (Part IX. Leaf-Hoppers-*Hemiptera*). Report of Work of the Experiment Station of the Hawaiian Sugar-Planters Association. Divis. of Entom. Bull. № 1, prt. 9, 1906, pp. 271—479, tt. 21—32. Supplement. L. c. Bull. № 3, 1907, pp. 1—187, tt. 1—20. — Plusieurs synopsis de genres et d'espèces; beaucoup de formes nouvelles décrites. Anglais.
806. [Amérique centrale]. Distant and Fowler. Hemiptera-Homoptera [in] Godman and Salvin. Biologia Centrali-Americana. Insecta Rhynchota 4°, I, 1881—1905, 147 pp., 13 tt. col.; II, 1894—1909, 339 pp., 21 tt. color. — Plusieurs synopsis, beaucoup de genres et d'espèces [nouvelles décrites; grand nombre d'espèces représentées sur les planches, dont l'exécution est fort belle. Anglais.

Superf. **Cicadoideae.**

807. [Synopsis des familles à l'état adulte ainsi que de leurs larves]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers. Suppl. 1907, pp. 14—15. — Anglais.

Fam. **Cicadidae.**

808. Distant. A synonymic Catalogue of *Homoptera* Prt. 1 *Cicadidae*. London, 1906, 8°, 207 pp. — Synopsis des genres; énumération des espèces avec synopsis partiels. Anglais.

Synopsis des genres.

809. [du globe terrestre]. Stål. Hemiptera afr. 7, 1866, pp. 1—9; [Addenda au précédent] Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 1—9. — Latin.
810. [de la rég. paléarctique]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 10, 1912, pp. 602—606. — Les genres de la sous-région mandjoue ne sont pas inclus dans ce synopsis. Latin.

811. [de Ceylan]. Melichar. Homopt.-Fauna v. Ceylon. 1903, p. 1.— Allemand.

Faunes.

812. [Europe]. Fieber. Rev. et Magas. Zool. 1876, pp. 23—121. — Synopsis des espèces. Français.
813. [Europe]. Hagen. Die Singcicaden Europas. Stett. Ent. Zeit. 1855, pp. 340—358, 379—386; 1856, pp. 27—37, 66—91, 131—142, 379—385, t. 2; 1858, pp. 135—137. — Diagnoses latines, descriptions allemandes.
814. [Europe]. Melichar. Razbor Křisu palearktickyh z Čeledi *Cicadidae* Fieb. Vestn. Klubu přírod. v Prostejově 4, 1904, pp. 12—27. — Synopsis des genres et des espèces. Je n'ai pas vu cet article. Bohémien.
815. [Caucase]. Kolenati. Bull. Soc. Nat. Moscou 1857, 1, pp. 399—426, tt. 5, 6 col. — Synopsis des genres et des espèces. Latin
816. [Japon]. Matsumura. A Summary of Japanese Cicadidae with description of a new Species. Annot. Zool. Japon. 2, 1898, pp. 1—20, t. 1. — Descriptions de toutes les espèces connues d'après Distant. Anglais. Conf. n° 802.
817. [Afrique]. Karsch. Beiträge zur Kenntnis der Singcicaden Afrika's und Madagaskars. Berl. Ent. Zeit. 35, 1890, pp. 85—130, tt. 3, 4. — Synopsis des genres et des espèces de la faune de toute l'Afrique, la partie septentrionale non exceptée. Allemand.
818. [Rég. orientale]. Distant. A Monograph of Oriental Cicadidae London 1889—1892, fol., 158 pp., 15 tt. en part. color. — Synopsis des genres, descriptions des espèces; les espèces du Japon et de la Chine y sont incluses; desseins très réussis. Anglais.
819. [Australie]. Goding and Froggat. Monograph of the Australian Cicadidae. Proc. Linn. Soc. New. S. Wales 1904, pp. 561—670, tt. 18, 19. — Synopsis et description des genres et des espèces. Anglais.
820. [Rég. néarctique]. Macgillivray. *Cicadidae* americanae, genera and species. Canad. Entom. 33, 1901, pp. 74—84. — Synopsis des genres et des espèces. Anglais.
821. [États Unis]. Ashmead. Entomologica americ. 4, 1888, pp. 140—141. — Synopsis des genres et des espèces. Anglais.
822. [États de Washington, d'Oregon et de Californie]. Van Duzee. A preliminary report on the West Coast *Cicadidae*. Journ. New York Ent. Soc. 23, 1915, pp. 21—44. — Synopsis des sous-f., des genres et des espèces. Anglais.
823. [Rég. néotropicale]. Jacobi. Homoptera andina. Die Zikaden des Cordillera-Gebietes von Südamerika nach Systematik und Verbreitung. I. *Cicadidae*. Abh. Zool. Mus. Dresden 11, № 5, 1907, pp. 1—20. — Ja n'ai pas vu cet article.

Subf. **Cicadinae.**

824. Distant [in]. *Genera Insectorum* dirigés par Wytsman, fasc. 142, *Homoptera*, Fam. *Cicadidae*, Subf. *Cicadinae*. Bruxelles, 1912, 4°, 64 pp., 7 tt. color. — Synopsis et description des genres, énumération des espèces. Anglais.

Synopsis des genres des divisions¹⁾:

825. [*Polyneuraria*]. Distant. Ann. and Mag. Nat. Hist. (7), 14, 1904, p. 293. — Anglais.
826. [*Tacuaria*]. Distant. L. c. p. 300.
827. [*Thopharia*]. Distant. L. c. p. 301.
828. [*Cyclochilaria*]. Distant. L. c. p. 302.
829. [*Cicadaria*]. Distant. L. c. p. 309.
830. [*Dundubiarina*]. Distant. L. c. (7), 15, 1905, pp. 58—59.

Synopsis des sous-genres des genres:

831. [*Cosmopsaltria* Stål]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1870, p. 708. — Latin.
832. [*Cicada* L.]. Stål. L. c. p. 714.

Synopsis des espèces des genres:

833. [*Cicada* L. voisines de *C. hilaris* Dist.]. Distant. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1881, p. 10. — Anglais.
834. *Dokuma* Dist.]. Distant. Ann. Mag. Nat. Hist. (7), 17, 1906, p. 183. — Anglais.

Subf. **Gaeaninae.**

Synopsis des genres des divisions:

835. [*Cicadatraria*]. Distant. L. c. (7), 15, 1905, pp. 305—306.
836. [*Fidicinaria*]. Distant. L. c. pp. 310—311.
837. [*Zammararia*]. Distant. L. c. p. 380.
838. [*Gaeanaria*]. Distant. L. c. p. 383.
839. [*Moganniaria*]. Distant. L. c. p. 385.

Subf. **Tibicininae.**

Synopsis des genres des divisions:

840. [*Hyantiaria*]. Distant. L. c. p. 178.
841. [*Tettigadesaria*]. Distant. L. c. pp. 479—480.
842. [*Huechysaria*]. Distant. L. c. pp. 481—482.

¹⁾ Ces divisions de Distant sont des groupes artificiels et ne peuvent pas être considérés comme équivalents des tribus. Leurs caractéristiques se trouvent dans Ann. and Mag. of Nat. History. Les synopsis génériques sont reproduits par Distant dans les ouvrages désignés par les nn° 808, 825—830.

- 843. [*Carinetaria*]. Distant. L. c. p. 484.
- 844. [*Tibicinaria*]. Distant. L. c. (7), 16, 1905, p. 22.
- 845. [*Taphuraria*]. Distant. L. c. pp. 25—27.
- 846. [*Parnisaria*]. Distant. L. c. pp. 203—204.
- 847. [*Chlorocystaria*]. Distant. L. c. pp. 212—213.
- 848. [*Tettigomyiaria*]. Distant. L. c. pp. 265—266.
- 849. [*Melampsaltaria*]. Distant. L. c. p. 269.
- 850. [*Hemidictyaria*]. Distant. L. c. pp. 275—276.

Fam. Cercopidae.

- 851. Lallemant. Genera Insectorum dirigés par Wytsman, fasc. 143: Homoptera. Fam. *Cercopidae*. Bruxelles, 1912, 4°, 167 pp., 8 tt. col. — Synopsis et descriptions détaillées des sous-familles, des tribus et des genres; énumération de toutes les espèces connues. — Français.
- 852. [Synopsis des sous-familles]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, p. 55. — Latin.
- 853. [Synopsis des genres de la rég. australienne]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 19—20. — Ne contient que les genres des sous-fam. *Cercopinae* et *Aphrophorinae*. Anglais.

Faunes.

- 854. [Rég. paléarctique]. Melichar. Razbor křišů palearktických z čeledi *Membracidae* a *Cercopidae*. Věstník klubu přírodovědeckého v Prostějově. 1901, pp. 17—34, tt. 1, 2. — Synopsis des genres et des espèces. Bohémien.
- 855. [Japon]. Matsumura. Monographie der Cercopiden Japans. Journ. Sapporo Agric. Colledge 2, 1903, pp. 15—52, ff. 1—22. — Synopsis des genres et des espèces. Allemand.
- 856. [Japon]. Matsumura. Additamenta zur Monographie der Cercopiden Japans. Annot. Zool. Japonens. 5, 1904, pp. 31—54. — Allemand. Conf. en outre n° 802, pp. 104—116.
- 857. [Amérique du Nord]. Goding. Synopsis of the Subfamilies and Genera of the North American *Cercopidae* with a bibliographical and synonymical Catalogue of the described Species of North America. Bull. Illinois State Labor. of Nat. Hist. 3, 1892, pp. 483—501. — Synopsis des sous-familles et des genres et énumération des espèces appartenant à la faune de l'Amérique du Nord, jusqu'à l'isthme de Panama. Anglais.
- 858. [États Unis]. Ball. Rep. Iowa Acad. Sc. 1898, pp. 204—226. — Synopsis des genres et des espèces. Anglais.

Subf. Cercopinae.

Synopsis des espèces des genres:

- 859. [*Cosmoscarta* Stål. voisines de *C. guttata*]. Breddin. Deutsch. Ent. Zeit. 1903, pp. 94—95. — Latin.

860. [*Sialoscarta Jacobi*]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1906, pp. 277—278. Allemand.
861. [*Gynopygoplax Schmidt*]. Schmidt. L. c. pp. 149—152.
862. [*Ectemnonotum Schmidt*]. Schmidt. L. c. pp. 294—323. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces.
863. [*Megastethodon Schmidt*]. Schmidt. L. c. 1911, pp. 68—77.— Synopsis et descriptions détaillées des espèces.
864. [*Simeliria Schmidt*]. Schmidt. L. c. 1909, pp. 285—294. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces.
865. [*Serapita Schmidt*]. Schmidt. L. c. pp. 183—184.
866. [*Suracatra Schmidt*]. Schmidt. L. c. p. 168.
867. [Synopsis des sous-espèces de *Suracatra tricolor* Lep. et Serv.]. Schmidt. L. c. pp. 173—174.

Subf. Aphrophorinae.

868. [Synopsis des genres du globe terrestre]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 66—69; [Addenda au précédent]. Hem. Fabr. 2, 1869, p. 17; Öfv. Vet. Akad. Förh. 1870, pp. 722, 723.
869. [Synopsis des genres de l'Amérique centrale]. Fowler. Biologia Centr. Amer. 2, 1897, p. 190. Anglais.
870. [Synopsis des genres et des espèces d'Angleterre]. Scott. Ent. Month. Mag. 7, 1871, pp. 241, 270. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

871. [*Aphrophora* Germ. d'Europe]. Melichar. Wien. Ent. Zeit. 19, 1900, p. 60. — Allemand.
872. [*Poophilus* Stål d'Afrique]. Jacobi [in] Sjöstedt. Wiss. Ergebn. Zool. Exped. Kilimandjaro, 12, Hemiptera, 7, 1913, pp. 115—118. — Allemand.
873. [*Carystus* Stål]. Spångberg. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1877, № 9, pp. 11—14. — Synopsis et descriptions des espèces. Latin.
874. Ball. A Study of the genus *Clastoptera*. Proc. Iowa Acad. Sc. 3, 1897, pp. 182—194, tt. 11—14. — Je n'ai pas vu cet article.

Synopsis des variétés de *Philaenus leucophthalmus* L. = *spumarius* Fall.

875. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Genova (2), 2, 1885, p. 418. — Latin.
876. Haupt. Berl. Ent. Zeit. 56, 1911, pp. 178—180. — Allemand.

Subf. Machaerotinae.

877. [Monographie]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1907, pp. 165—200, ff. 1—8. — Synopsis et descriptions détaillées des tribus, des genres et des espèces. Allemand.
878. [Synopsis des genres d'Australie]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, p. 22. — Anglais.

Fam. Membracidae.

879. Goding. Bibliographical and Synonymical Catalogue of the described *Membracidae* of North America. Bull. Illinois State Laborat. Nat. Hist. 3, 1892, pp. 391—482. — Énumération des espèces appartenant à la faune de l'Amérique du Nord dans sa totalité jusqu'à l'isthme de Panama. Anglais.
880. Buckton. A Monograph of Membracidae. London, 4°. 1901—1903 296 pp., 60 tt. — Je n'ai pas vu cet ouvrage. Schouteden (Bericht üb. wissensch. Leist. Entom. 1903, p. 995) s'exprime ainsi: „Das Erscheinen des Buches ist eher zu bedauern! Beschreibungen mit wenigen Ausnahmen ganz ungenügend, sowie auch die Abbildungen auf den zahlreichen Tafeln“. Anglais.
881. Fairmaire. Revue de la tribu des Membracides. — Ann. Soc. Ent. France (2), 4, 1846, pp. 236—320, 479—531, tt. 3—7. — Synopsis des genres, courtes diagnoses des espèces. Français.

Synopsis des sous-familles.

882. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 82—83. — Latin.
883. Fowler. Biol. Centr. Amer. Homopt. 2, 1894, p. 3. — Anglais.
884. Van Duzee. Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc. 9, 1908, p. 31. — Anglais.

Faunes.

885. [Rég. paléarctique]. Conf. Melichar n° 854, pp. 11—17 du tirage séparé. tt. 1. — Bohémien.
886. [Europe]. Conf. Fieber n° 792. Rev. et Mag. Zool. 1876, pp. 11—23. — Français.
887. [Australie]. Goding. Proc. Linn. Soc. New South Wales 1898, pp. 86—88. — Synopsis des genres et des espèces. Anglais.
888. [Australie]. Goding. A Monograph of the Australian *Membracidae*. L. c. 1903, pp. 1—41, t. 1. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Anglais.
889. [Rég. néarctique]. Goding. A synopsis of the subfamilies, and genera of the *Membracidae* of North America. Trans. Amer. Ent. Soc. 19, 1892, pp. 253—260. — Anglais.
890. [Rég. néarctique]. Van Duzee. Studies in North American *Membracidae*. Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc. 9, 1908, pp. 29—129, tt. 1, 2. — Synopsis des sous-familles, des tribus, des genres et des espèces néarctiques. Anglais.

Subf. Tragopinae.

891. [Synopsis des genres]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Homopt. 2, 1895, p. 84. — Anglais.

Subf. **Smiliinae.**

Synopsis des genres.

892. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1867, pp. 551—556. [Addend.] Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 23—24, 26, 28. — Latin.
893. [de l'Amérique centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Homopt. 2, 1895, pp. 87—90. — Anglais.
894. [voisins du g. *Oxygonia* Fairm. et énumération de leurs espèces]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1869, pp. 232—250. — Latin.
895. [Synopsis des espèces du g. *Amastris* Stål]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, p. 25. — Latin.

Subf. **Darninae.**

Synopsis des genres.

896. [du globe terrestre]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1867, pp. 556—560. — Latin.
897. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Homopt. 2, 1894, pp. 49—50. — Anglais.
898. [voisins du g. *Hemiptycha* Germ. et énumération de leurs espèces]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1869, pp. 250—263. — Latin.
899. [Synopsis des sous-genres du g. *Darnis* F.]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, p. 32. — Latin.

Synopsis des espèces des genres:

900. [*Aconophora* Fairm.]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 34—35. — Latin.
901. [*Cymbomorpha* Stål]. Stål. L. c. p. 34.

Subf. **Hoplophorinae.**

Synopsis des genres.

902. [du globe terrestre]. Stål. Berl. Ent. Zeit. 10, 1866, p. 388; Hem. Fabr. 2, 1869, p. 37. — Latin.
903. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Americ. Homopt. 2, 1894, pp. 31—32. — Anglais.
904. [Synopsis des sous-genres du g. *Platycotis* Stål]. Fowler. L. c. p. 41.
905. [Énumération des espèces]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1869, pp. 263—269. — Latin.

Subf. **Membracinae.**

Synopsis des genres.

906. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 2, 1894, pp. 3—4. — Anglais.
907. [voisins du g. *Membracis* F.]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 38—39. — Latin.

908. [Synopsis des sous-genres du g. *Sphongophorus* Fairm.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Homopt. 2, 1894, p. 27. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

909. [*Enchophyllum* subg. *Tropidocera* Stål]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1869, pp. 270—271. — Latin.
910. [*Enchenopa* Am. et Serv. in sp.]. Stål. L. c. pp. 271—273.
911. [*Sphongophorus* Fairm.]. Stål. L. c. pp. 273—276.
912. [*Pterygia* Lap.]. Stål. L. c. pp. 276—279.
913. [*Tropidoscyta* Stål]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, p. 45. — Latin.

Subf. Centrotinae.

Synopsis des genres.

914. [de l'Ancien Monde]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 86—89; Öfv. Sv. Vet. Ak. Förh. 1869, pp. 280—283. — Latin.
915. [d'Amérique]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 47—49. — Latin.
916. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 2, 1896, pp. 146—148. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

917. [*Hypsauchenia* Germ.]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1906, p. 369. — Allemand.
918. [*Leptobelus* Stål]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1869, pp. 284—285. — Latin.
919. [*Monobelus* Stål]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 49—50. — Latin.
920. [*Sextius* Stål]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers. 1906, p. 375. — Anglais.
921. [*Lycoderes* Germ.]. Stål. Hem. Fabr. 2, 1896, pp. 53—54. — Latin.

Subf. Aethalioninae.

922. Signoret. Notice sur le groupe des Eurymélides. Monographie du genre *Aethalion*. Ann. Soc. Ent. France (2), 9, 1851, pp. 669—680. t. 14. — Description des espèces connues. Français.
923. [Synopsis des espèces du g. *Aethalion* Latr.]. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1869, pp. 296—300. — Latin.

Fam. Jassidae.

924. Van Duzee. A Catalogue of the described *Jassoidea* of North America. Trans. Amer. Ent. Soc. 21, 1894, pp. 245—317. — Énumération des espèces de l'Amérique du Nord; les espèces mexicaines et celles qui habitent les Antilles y sont incluses. Anglais.
925. [Synopsis des sous-familles et des tribus]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Supplem. 1907, pp. 23—24. — Anglais.

Subf. **Ulopinae.**

926. [Faune d'Angleterre]. Scott. Ent. Month. Mag. 7, 1871, p. 271. — Anglais.

Subf. **Megophthalminae.**

= *Stenocotinae*.

- 926a. Baker. Studies in Philippine *Jassoidea*. III. The *Stenocotinae* of the Philippines. Philipp. Journ. Science, 10, Sect. D, 1915, pp. 189—200, 4 ff. dans le texte. — Synopsis des tribus et de tous les genres connus. Anglais.
- 926b. [Synopsis des espèces du g. *Signoretia* Stål]. Baker. L. c. pp. 197—199.

Subf. **Scarinae**

= *Ledrinae* = *Stenocotinae* Kirk. prt.

927. [Synopsis des genres de la rég. australienne]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers. Supplem. 1907, p. 25. — Anglais.

Synopsis des espèces du g. *Petalcephala* Stål.

928. Stål. Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh. 1865, pp. 154—159. — Latin.
929. Schumacher. Wien. Ent. Zeit. 31, 1912, p. 247. — Allemand.

Subf. **Proconiinae.**

= *Tettigoniinae*.

Synopsis des genres.

930. Stål. Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 59—61. — Latin.
931. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Supplem. 1907, pp. 86—89. — Anglais.
932. Signoret. Revue iconographique des Tettigonides. Ann. Soc. Ent. France (3), 1, 1853, pp. 13—40, 323—374, 661—688, tt. col. 8—12, 21—22; 2, 1854, pp. 5—28, 341—366, 483—496, 717—732, tt. col. 1—3, 11, 12, 17, 21; 3, 1855, pp. 49—60, 225—240, 507—528, 765—836, tt. col. 6, 12, 21, 23, 24. — Un seul genre admis; courtes descriptions des espèces, très grand nombre d'excellentes figures. Français.
933. Ball. A Revision of *Tettigonidae* of North America, North of Mexico. Proceed. Iowa Acad. Sc. 8, 1901; Reprinted in Ohio State Univ. Bulet. ser. 5, № 21, pp. 1—41, 7 tt. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces néarctiques. Anglais.
934. [Faune de l'État d'Illinois]. Woodworth. Bull. Illinois State Labor. Nat. Hist. 3, 1892, pp. 9—33, tt. 1—3. — Synopsis et description des espèces. Anglais.
935. Schmidt. Genus *Diestostemma* Amm. et Serv., ein Beitrag zur Kenntnis der Jassiden. Stett. Ent. Zeit. 1910, pp. 30—62. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Allemand.

Synopsis des espèces du g. *Tettigoniella* Jac.

936. [de la rég. australienne]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers, 1906, p. 319.— Anglais.
937. [de l'Argentine]. Berg. Hem. argent. 1879, p. 250.— Latin.

Subf. *Bythoscopinae*.

= *Eurymelini* Kirk. = *Agalliini* Kirk.

Synopsis des genres.

938. [du globe terrestre]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 29—31. — Anglais.
939. [de la rég. néarctique]. Ashmead. Entomologica americana 5, 1889, pp. 125—126. Anglais.

Faunes.

940. [Europe]. Fieber. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1868, pp. 449—464. — Synopsis des genres et des espèces; dans les dernières les lacunes sont assez nombreuses. Allemand.
941. [Angleterre]. Scott. Entom. Month. Mag. 10, 1873—1874, pp. 22, 80, 126, 189, 235. — Anglais.
942. [Japon]. Matsumura. Conf. n° 967.

Synopsis des espèces des genres:

943. [*Idiocerus* Lew. de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 31—32. — Anglais.
944. [*Idiocerus* de la rég. néarctique]. Osborn and Ball. Proceed. Davenport Ac. Nat. Sc. 7, 1898, pp. 124—138. — Synopsis suivi d'une description des espèces. Anglais.
945. [*Bythoscopus* de la rég. néarctique]. Van Duzee. Entomol. americana 6, 1890, pp. 221—229. — Synopsis et description des espèces. Anglais.
946. [*Pediopsis* Burm. sens. lat. de la Suède]. Thomson. Öfversigt af de i Sverige funna arter af släktet *Pediopsis*. Opusc. entom. 1869, pp. 316—321. — Latin.
947. [*Pediopsis*=*Macropsis* Lew. Kirk. voisines de *P. scutellata* Boh.]. Edwards. Entom. Month. Mag. (2), 19, 1908, p. 56. — Anglais.
948. [*Pediopsis* = *Macropsis* de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, p. 36. — Anglais.
949. [*Pediopsis* néarctiques]. Van Duzee. Entomolog. amer. 5, 1889, pp. 165—174. — Synopsis et description des espèces. Anglais.
950. [*Pediopsis* néarctiques]. Osborn and Ball. Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. 7, 1898, pp. 111—123. — Synopsis et description des espèces. Anglais.
951. [*Agallia* Curt. néarctiques]. Osborn and Ball. L. c. pp. 45—64, t. 1. — Synopsis et description des espèces. Anglais.

952. [*Eurinoscopus* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, p. 39. — Anglais.
953. [Species du g. *Eurymela* Lep. et Serv.]. Signoret. Notice sur le groupe des Eurymélides. Ann. Soc. Ent. France (2), 8, 1850, pp. 497—514, t. 17 col. — Courtes descriptions des espèces, pas de synopsis. Français.

Subf. **Jassinae.**

954. [Synopsis des genres de la faune Philippine]. Baker. Philipp. Journ. of Science 10, Sec. D, 1915, pp. 51—53. — Anglais.

Trib. **Penthimiaria.**

955. [Synopsis des genres]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 80—81²⁾. — Anglais.
956. [Synopsis des espèces du g. *Vulturnus* Kirk.]. Kirkaldy. L. c. p. 82.

Trib. **Gyponaria.**

957. [Monographie]. Species *Gyponae* generis Homopterorum. Spångberg. Bihang till. K. Sv. Vet. Ak. Handl. 5, № 3, 1878, 76 pp.—Synopsis et description des espèces. Latin.
958. [Synopsis des espèces du g. *Gypona* Germ. de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 2, 1903, pp. 295—296. — Anglais.

Trib. **Koebeliaria.**

959. [Synopsis des espèces du g. *Adelungia* Mel.]. Oshanin. Ann. Mus. Zool. St.-Pétersbourg 12, 1908, pp. 467—468, 4 ff. — Synopsis. Allemand.

Trib. **Coelidiaria**

= *Jassaria*.

Synopsis des genres.

960. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 74—75. — Anglais.
961. Van Duzee. Conf. n° 975.
962. [Monographie du g. *Coelidia*=*Jassus* Stål]. Spångberg. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1878, № 8, 40 pp. — Synopsis et descriptions détaillées. Latin.
963. [Synopsis de espèces du g. *Coelidia*=*Jassus* des îles Philippines] Baker. Philipp. Journ. Sc. 10, Sect. D, 1915, p. 54. — Anglais.

²⁾ La tribu des *Penthimiaria* dans les limites que lui donne Kirkaldy me paraît être un groupe artificiel parce qu'il contient des genres n'ayant aucune affinité entre eux. Ainsi nous y trouvons réunis les genres *Penthimia*, *Euacanthus*, *Errhomenellus*, *Xerophloea*, *Gypona*, *Scaris* etc. D'ailleurs l'auteur lui-même dit: „I can find no good characters to separate this tribe“.

964. [Synopsis des espèces du g. *Tharra* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf. Hoppers Suppl. 1907, pp. 75—76. — Anglais.

Trib. **Acocephalaria**³⁾.

965. Signoret. Essai sur les *Jassides* Stål. Fieb. et plus particulièrement sur les Acocephalides Puton. Ann. Soc. Ent. France (5), 9, 1879, pp. 47—92, 259—280, tt. 1, 2, 7, 8; 10, 1880, pp. 41—70, 189—212, 347, 366, tt. 1, 2, 6, 7. — Synopsis des genres, descriptions de toutes les espèces connues; beaucoup de belles figures, quelques unes coloriées. Français.
966. [Synopsis des genres]. Van Duzee. Conf. n° 975.
967. [Faune du Japon]. Matsumura. Die Acocephalinen und Bythoscopinen Japans. Journ. Sapporo Agric. Coll. 4, 1912, pp. 279—325. — Je n'ai pas vu cet article.

Synopsis des espèces des genres:

968. [*Acocephalus* Germ. néarctiques]. Ball. Rep. Jowa Acad. Sc. 1899, p. 65. — Anglais.
969. [*Strongylocephalus* Flor. d'Angleterre]. Scott. Ent. Mont. Mag. 11, 1874, pp. 120—123. — Synopsis et description des espèces. Anglais.
970. [*Dorycephalus* Kusch. néarctiques]. Ball. Rep. Jowa Acad. Sc. 1899, p. 67. — Anglais.
971. [*Parabolocratus* Fieb. néarctiques]. Ball. L. c. pp. 70—71.
972. [*Uhleriella* Ball]. Ball. Canad. Entom. 34, 1902, p. 55, t. 2. — Anglais.
973. [*Tartessus* Stål]. Spångberg. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1877, pp. 3—10. — Monographie: synopsis et descriptions détaillées. Latin

Trib. **Jassaria**.

974. [Synopsis des genres de la tribu *Phrynomorphini* Kirk. (= *Jassaria* + *Acocephalaria*) des îles Hawaïi]. Kirkaldy. Fauna Hawaïensis 2, prt. 6, 1908, p. 555. — Anglais.
975. Van Duzee. A synoptical arrangement of the genera of the North American *Jassidae*. Trans. Amer. Ent. Soc. 19, 1892, pp. 295—300 — Synopsis des genres néarctiques des tribus: *Coelidiaria*, *Acocephalaria* et *Jassaria*. Anglais.

Faune.

976. [Japon]. Matsumura. Monographie der Jassinen Japans. Termesztudományi Füzetek 25, 1902, pp. 353—404, 29 ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces. Allemand.

³⁾ Il est presque impossible de fixer les limites qui séparent la tribu des *Acocephalaria* de celle des *Jassaria* (= *Thamnotettigaria*); je crois qu'il serait préférable de les réunir. Je conserve ces deux groupes seulement parce qu'ils sont adoptés par presque tous les hémiptérologistes contemporains.

Synopsis des espèces des genres.

977. [*Phlepsius* Fieb. néarctiques]. Van Duzee. Trans. Amer. Ent. Soc. 19, 1892, pp. 63—83, tt. 1, 4. — Synopsis suivi de descriptions des espèces. Anglais.
978. [Horváth. Synopsis generis *Doratura*. Ann. Mus. Nat. Hung. 1, 1903, pp. 451—459, t. 17. — Latin.
979. [*Platymetopius* Burm. d'Europe]. Fieber. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1869, pp. 201—202, ff. 61—65. — Allemand.
980. [*Platymetopius* de Suède]. Thomson. Conf. n° 987.
981. Van Duzee. A revision of the american species of *Platymetopius*. Annals Entom. Soc. America. Columbus. 3, № 3, 1910, pp. 214—231. — Synopsis suivi d'une description des espèces néarctiques. Anglais.
982. [*Deltocephalus* Burm. d'Europe]. Fieber. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1869, pp. 203—222, tt. 5, 6. — Allemand.
983. [*Deltocephalus* de Suède]. Thomson. Conf. n° 987.
984. [*Deltocephalus* d'Angleterre]. Scott. Ent. Month. Mag. 12, 1876, pp. 239 et 271. — Anglais.
985. [*Deltocephalus* d'Autriche]. Then. Mitth. Naturw. Ver. Steiermark 1899, pp. 130—136. — Allemand.
986. [*Deltocephalus* de la rég. néarctique]. Osborn and Ball. Proc. Jowa Ac. Sc. 1897, pp. 195—221. — Synopsis et description des espèces. Anglais.
987. Thomson. Genus *Jassus*. Conspectus specierum Sveciae. Opusc. ent. 1869, pp. 44—77. — Diagnoses des espèces arrangées synoptiquement; contient les genres: *Platymetopius*, *Graphocraerus*, *Deltocephalus*, *Athysanus*, *Thamnotettix*, *Cicadula* et *Jassus*.—Latin.
988. [*Jassus*]. Ferrari. Ann. Mus. Civ. Geneva 18, 1882, pp. 60—68, ff. dans le texte. — Synopsis suivi de description des espèces. Latin.
989. [*Jassus* d'Angleterre = *Allygus* Fieb.]. Scott. Ent. Month. Mag. 12, 1875, p. 169. — Anglais.
990. Ball. The genus *Eutettix* Van Duzee]. Ball. Proc. Davenport Ac. Sc. 12, 1907, pp. 27—94, tt. 1—4. [Réimprimé dans] Ohio State University, Bull. Depart. of Zoology and Entom. № 27. — Synopsis des sous-genres et des espèces néarctiques, descriptions détaillées de ces dernières. Anglais.
991. [*Xestocephalus* V. Duz.]. Melichar. Notes fr. the Leyden Mus. 36, 1914, pp. 139—140. — Allemand.
992. [*Nephotettix* Mats.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 53—54. — Anglais.
993. [*Athysanus* Burm. de Finlande]. Reuter. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 5, 1880, pp. 214—228. — Latin.
994. [*Athysanus* de Suède]. Thomson. Conf. n° 987.
995. [*Athysanus* d'Angleterre]. Scott. Ent. Month. Mag. 12, 1875, pp. 93 et 228. — Anglais.

996. [*Athysanus* d'Allemagne]. Kirschbaum. Die *Athysanus*-Arten der Gegend von Wiesbaden. Wiesbaden, 1858. 4°. 14 pp. — Allemand.
997. Osborn and Ball. A review of the North-American species of *Athysanus* Ohio Natur. 2, 1902, pp. 231—257, tt. 16, 17. [Réimprimé dans] Ohio State Univ. Ser. 6, № 14. Depart. Zool. and Entomology. Bullet. Ser. 6, № 14. — Synopsis et description des espèces néarctiques. Anglais.
998. [*Athysanus* voisins de l'*A. stactogalus* Fieb.]. Lethierry. Ann. Soc. Ent. France (5), 6, 1876, pp. 51—52. — Français.
999. Osborn. The genus *Scaphoideus*. Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19, 1900, pp. 187—239, tt. 9, 10.
1000. Osborn. Remarks on the genus *Scaphoideus*, with a revised key and descriptions of new American species. Ohio Natur. 11, 1911, pp. 249—266. — Je n'ai pas vu ces deux articles.
1001. [*Cochlorhinus* Uh1.]. Ball. Canad. Entom. 34, pp. 53—59, t. 2. — Synopsis suivi de descriptions des espèces. Anglais.
1002. [*Thamnotettix* Zett. d'Europe]. Fieber. Conf. n° 1006. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 59—104.
1003. [*Idem*]. Lethierry. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 105—110. — Français.
1004. [*Thamnotettix* de Suède]. Thomson. Conf. n° 987.
1005. [*Thamnotettix* d'Angleterre]. Scott. Entom. Month. Mag. 12, 1875, pp. 22—25. — Anglais.
1006. Fieber. Description des Cicadines d'Europe. Les genres *Cicadula* et *Thamnotettix*. Traduit par Reiber. Avec additions par L. Lethierry. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 40—52. — Descriptions arrangées synoptiquement. Français.
1007. [*Cicadula* d'Europe]. Lethierry. Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 56—59. — Français.
1008. [*Cicadula* de Suède]. Thomson. Conf. n° 987.
1009. [*Cicadula* d'Angleterre]. Scott. Ent. Month. Mag. 11, 1875, pp. 229—232. — Anglais.
1010. [*Idem*]. Edwards. L. c. (2), 2, 1891, pp. 27—34. — Synopsis et description des espèces. Anglais.
1011. [*Balclutha* Kirk. = *Gnathodus* Fieb. de la rég. néarctique]. Baker. Canad. Ent. 28, 1896, pp. 35—42. — Anglais.
1012. [*Balclutha*=*Gnathodus* du groupe *G. abdominalis*]. Baker. Invert. pacif, 1, 1904, pp. 1—2. — Synopsis; je n'ai pas vu cet article.
1013. [*Nesosteles* Kirk.]. Kirkaldy. Faun. Hawaiiensis 2, prt. 6, 1908, p. 577. — Anglais.

Subf. Typhlocybinae

= *Eupteryginae* Kirk.

Synopsis des genres.

1014. [du globe terrestre]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 358; Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 16—17. — Anglais.

1015. [de la rég. néarctique]. Baker. Psyche 8, 1899, p. 402. — Anglais.

Faunes.

1016. Fieber. Les Cicadines d'Europe du groupe des *Typhlocybini* (Traduit par Reiber). Avec des additions par Lethierry. Rev. d'Ent. 3, 1884, pp. 40—67, 92—132, 150—162. — Description des espèces européennes arrangée synoptiquement. Français.
1017. Lethierry. Catal. des Hém. du départ. du Nord. 2 éd. 1874, pp. 64, 68—85. — Synopsis des genres et des espèces du Nord Est de la France. Français.
1018. Gillette. American Leaf-Hoppers of the subfamily *Typhlocybinae*. Proc. U. S. Nation. Mus. 20, 1898, pp. 709—773, ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces des régions néarctique et néotropical. Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

1019. [*Empoasca* Walsh d'Angleterre]. Edwards. Ent. Month. Mag. (2), 19, 1908, pp. 81—82. — Anglais.
1020. [*Chlorita* Fieb. d'Europe]. Lethierry. Rev. d'Ent. 3, 1884, pp. 63—64. — Français.
1021. [*Zyginella* P. Löw.]. Melichar. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1901, p. 212. — Allemand.

Superf. **Fulgoroideae.**

1022. Spinola. Essai sur les Fulgorelles. Ann. Soc. Ent. France 8, 1839, pp. 135—454, tt. col. 10—17. — Classification générale, synopsis des genres et des espèces de quelques genres. Français.

Synopsis des familles (= sous-familles des auteurs).

1023. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 129—131. — Latin.
1024. Melichar. Homopt. Fauna v. Ceylon 1903, pp. 10—11. — Allemand.
1025. Van Duzee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 1907, pp. 467—468. — Anglais.
1026. [Synopsis des familles et des genres de la rég. néarctique]. Ashmead. Entomol. amer. 5, 1889, pp. 125—126. — Anglais.

Faunes.

1027. [Europe]. Fieber. Conf. n° 792, Rev. et Mag. Zool. 1876, pp. 121—268; 1877, pp. 1—45; 1878, pp. 272—303; 1879, pp. 65—160. — Descriptions des espèces, arrangement selon la méthode synoptique. Français.
1028. Matsumura. Uebersicht der Fulgoriden Japans. Entom. Nachr. 26, 1900, pp. 205—213, 257—270. — Énumération des espèces, description des formes nouvelles. Allemand.

1029. Matsumura. Beitrag zur Kenntnis der Fulgoriden Japans. Ann. Mus. Nat. Hung. 12, 1914, pp. 261—305, ff. 1—16. — Additions et rectification du précédent; contient les fam. *Tropiduchidae*, *Lophopidae*, *Achilidae* et *Derbidae*. Allemand.
1030. Swezey. A preliminary Catalogue of the described species of *Fulgoridae* of North America, N. of Mexico. Springfield, 1904, 8°, 48 pp. — Énumération des espèces néarctiques connues. Anglais.

Fam. Fulgoridae.

Synopsis des genres.

1031. [du globe terrestre]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 131—139. Addenda au précédent. Hem. Fabr. 2, 1869, p. 89. — Latin.
1032. [de la rég. australienne]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers, 1906, p. 388. — Anglais.
1033. [d'Amérique]. Stål. Stett. Ent. Zeit. 1870, pp. 283—294. — Latin.
1034. [voisins du g. *Aphana* et appartenant à la faune éthiop.]. Schmidt Stett Ent. Zeit. 1905, pp. 359—360. — Allemand.

Synopsis des espèces des genres:

1035. [*Laternaria* L.]. Distant. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1883, p. 22. — Anglais.
1036. [*Phrictus* Spin.]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1904, p. 335. — Allemand.
1037. [*Metaphaena* Schmidt]. Schmidt. L. c. 1905, pp. 361—362. — Descriptions détaillées. Allemand.
1038. [*Malfeytia* Schm.]. Schmidt. L. c. pp. 366—367.
1039. [*Anecphora* Karsch]. Schmidt. L. c. p. 368.
1040. [*Holodictya* Gerst.]. Schmidt. L. c. p. 373.
1041. [*Scamandra* Stål]. Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1870, pp. 743—744. — Latin.
1042. [*Amantia* Stål]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1910, pp. 312—313. — Allemand.
1043. [*Desudaba* Walk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 390. — Anglais.
1044. [*Myrilla* Dist.]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1907, p. 114. — Allemand.

Fam. Cixiidae.

1045. Kirkaldy. A conspectus of the Fulgoridae of the Hawaiian Hemiptera. Proc. Hawaiian Ent. Soc. 2, 1910, pp. 75—80. — Je n'ai pas vu cet article; synopsis des genres et des espèces. Anglais.

Subf. Dictyopharinae.

1046. Melichar. Monographie der Dictyophorinen. Abhandl. zool.-bot. Ges. Wien 7, № 1, 221 pp., 5 tt. — Synopsis et description des tribus, des genres et des espèces. Allemand.

1047. Matsumura. Monographie der Dictyophorinen Japans. Journ. Sapporo Nat. Hist. Soc. 3, 1910, pp. 99—113. — Synopsis des genres et des espèces; courtes descriptions de ces dernières. Allemand.

Synopsis des genres:

1048. [du monde]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 149—152. — Latin.
 1049. [de la rég. paléarct.]. Horváth. Ann. Mus. Nat. Hung. 8, 1910, pp. 175—176. — Latin.
 1050. [de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 391. — Anglais.
 1051. [de la rég. néarct.]. Van Duzee. Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia 1907, pp. 468—469. — Anglais.

Faune du Turkestan.

1052. Oshanin — Ошанинъ. Матерьялы для фауны полужесткокрылыхъ Туркестана. Зап. Турк. Отд. Общ. Любит. Естеств. Антр. и Этн. 1, 1879, pp. 127—163. — Synopsis et description des espèces de la faune touranienne. Latin et russe.

Trib. Dictyophararia.

Synopsis des espèces des genres:

1053. [Dorysarthrus Put.]. Oshanin. Ann. Mus. Zool. St. Pétersbourg. 12, 1908, p. 472. — Allemand.
 1054. [Dictyophara Germ. s. lat. de la rég. néarctique]. Van Duzee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1907, p. 469. — Anglais.
 1055. [Nersia Stål d'Amérique]. Stål. Conf. n° 24. Sv. Vet. Akad. Handl. 3, № 6, 1861, pp. 63—65. — Latin.
 1056. [Hasta Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers. 1906, p. 394. — Anglais.
 1057. [Thanatodictya Kirk.]. Kirkaldy. L. c. p. 392.
 1058. Melichar. Genus Kasserota Dist. (Fulgoridae) et affine genus novum hujus ordinis. Acta Soc. Entom. Bohemiae 10, 1913, pp. 151—159. — Synopsis et descriptions des espèces; description du g. monotypique Oenopia Mel. Latin.
 1059. Uhler. Species of the genus Scolops. Trans. Maryl. Acad. Sc. 1900, pp. 401—408. — Je n'ai pas vu cet article.

Trib. Orgeriaria.

1060. Oshanin — Ошанинъ. Insectes Hémiptères 3, livr. 1. Cixiidae: Orgeriaria [dans] Фауна России и сопр. странъ. 1913, 114 pp., 1 t., 7 ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces connues de la faune de Russie. Russe, diagnoses des espèces en latin.

1061. [Synopsis des genres et des espèces de Russie]. Oshanin. Rev. Russe d'Ent. 13, 1913, pp. 135—147. — Traduction latine des synopsis publiés dans l'ouvrage précédent.
1062. Horváth. Revisio systematica generum *Almana* et *Bursinia*. Ann. Mus. Nat. Hung. 8, 1910, pp. 177—184, 6 ff. dans le texte.— Synopsis et description détaillée de toutes les espèces connues. Latin.

Subf. Cixiinae.

Synopsis des genres.

1063. [du monde]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 164—166; [Additions au précédent]. Hem. Fabr. 2, 1869, pp. 93, 94. — Latin.
1064. [de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1903, p. 396; Leaf-Hoppers Suppl. 1907, 106—107. — Anglais.
1065. [de la rég. néarctique]. Van Duzee. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1907, pp. 106—107. — Anglais.
1066. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1904, pp. 80—81. — Anglais.
1067. [Faune d'Angleterre]. Scott. Ent. Month. Mag. 7, 1870, pp. 118, 146 et 190. — Synopsis et description des espèces et des genres. Anglais.
1068. Matsumura. Die Cixiinen Japans. Anot. Zool. Japon. 8, 1914, pp. 393—434, ff. 1—3. — Énumération des espèces connues, courtes descriptions des formes nouvelles. Allemand.

Synopsis des espèces des genres:

1069. [*Oliarus* Stål d'Australie]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 398; Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 107—108. — Anglais.
1070. [*Oliarus* des îles Hawaïennes]. Kirkaldy. Fauna Haw. 3, prt. 2, 1902, p. 120. — Anglais.
1071. [*Oliarus* de la rég. néarct.]. Van Duzee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1907, p. 485. — Anglais.
1072. [*Cixius* Latr. d'Angleterre]. Edwards. Ent. Month. Mag. 25, 1888, p. 101. — Anglais.
1073. [*Cixius* de la rég. néarct.]. Van Duzee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1907, pp. 488—489. — Anglais.
1074. [*Oecleus* Stål]. Stål. Berl. Ent. Zeit. 6, 1862, p. 307. — Latin.

Fam. Delphacidae.

Synopsis des genres.

1075. [du monde]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 175—176. — Latin.
1076. [d'Europe]. Fieber. Grundzüge zur Generischen Theilung der *Delphacini*. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1866, pp. 517—534, t. 8.— Allemand.

1077. [de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 126—127. — Anglais.
1078. [des îles Hawaii]. Kirkaldy. Fauna Hawaiiensis 2, prt. 6, 1908, p. 577. — Anglais.
1079. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1905, p. 130. — Anglais.

Faunes.

1080. [Suède]. Stål. Kort öfversigt af Sveriges *Delphax*-arter. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1854, pp. 189—197. — Courtes descriptions des espèces du g. *Delphax* sensu lat. Latin.
1081. [Angleterre]. Scott. Ent. Month. Mag. 7, 1870, pp. 22, 67, 193. — Synopsis des genres et des espèces. Anglais.
1082. Crawford. A contribution towards a Monograph of the Fam. *Delphacidae* of North and South America. Proc. U. S. Nat. Museum 46, 1914, pp. 557—640, tt. 44—49. — Synopsis et description des genres et des espèces des régions néarctique et néotropicale; beaucoup de figures. Anglais.
1083. Van Duzee. Preliminary Review of the North American Delphacidae. Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc. 5, 1897, pp. 225—261. — Synopsis et descriptions des genres et des espèces néarctiques. Anglais

Synopsis des espèces des genres:

1084. [*Araeopus* Spin. et *Delphacodes* Mel.]. Melichar. Wien. Ent. Zeit. 20, 1901, pp. 55. — Allemand.
1085. [*Perkinsiella* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 405; Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 135—137. — Anglais.
1086. Matsumura. Monographie der Gattung *Tropidocephala* Stål. Ann. Mus. Nat. Hung. 5, 1907, pp. 56—66, tt. 1, 2. — Allemand.
1087. [*Tropidocephala* de la rég. austr.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, p. 142. — Anglais.
1088. [*Hadeodelphax* Kirk.]. Kirkaldy. L. c. p. 140.
1089. [*Chloriona* Fieb.]. Edwards. Ent. Month. Mag. (2), 9, 1898, p. 59. — Anglais.
1090. [*Delphax* F. s. lat. = *Liburnia* Stål de la rég. austr.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 150—151. — Anglais.
1091. [*Dicranotropis* Fieb. de la rég. austr.]. Kirkaldy. L. c. p. 133.
1092. [*Haplodelphax* Kirk.]. Kirkaldy. L. c. p. 145.
1093. [*Phacalastor* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 408. — Anglais.
1094. [*Aloha* Kirk.]. Kirkaldy. Fauna Hawaiiensis 2, prt. 6, 1908, pp. 579—580. — Anglais.
1095. [*Nesopleias* Kirk.]. Kirkaldy. L. c. p. 582.
1096. [*Nesothoe* Kirk.]. Kirkaldy. L. c. pp. 591—592.
1097. [*Nesodryas* Kirk.]. Kirkaldy. L. c. p. 596.

Fam. Achilidae.

Synopsis des genres.

1098. [du monde]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 181—182. — Latin.
1099. [de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 417; Leaf-Hoppers Supl. 1907, pp. 115—117. — Anglais.
1100. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1904, p. 103. — Anglais.
1101. [Faune du Japon]. Matsumura. Conf. n° 1029, pp. 270—287.

Synopsis des espèces des genres:

1102. [*Helicoptera* Am. et Serv. de la rég. néarct.]. Van Duzee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1907, pp. 475—476. — Anglais.
1103. *Catonia* Uhl. de la rég. néarct.]. Van Duzee. L. c. pp. 480—481; Canad. Ent. 1910, pp. 261—262. — Anglais.
1104. [*Phenelia* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, p. 117. — Anglais.
1105. [*Callinesia* Kirk.]. Kirkaldy. L. c. p. 118.
1106. [*Aristyllis* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 419. — Anglais.

Fam. Tropiduchidae

= *Eutropistidae* Kirk.

1107. Melichar. Monographie der Tropiduchinen. Verh. Naturf. Ver. in Brünn. 53, 1914, pp. 1—143, 35 ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions des tribus, des genres et des espèces. Allemand.
1108. [Faune du Japon]. Matsumura. Conf. n° 1029, pp. 261—267.

Synopsis des genres.

1109. [du monde]. Stål. Hem. afr. 4, 1866, pp. 186—188. — Latin.
1110. [de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 413. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

1111. [*Ossa* Motsch. de la rég. austral.]. Kirkaldy. L. c. p. 413.
1112. [*Tangia* Stål]. Stål. Berl. Ent. Zeit. 3, 1859, p. 318. — Latin

Fam. Derbidae.

1113. [Synopsis des genres]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 427; Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 163—165. — Anglais.
1114. [Faune du Japon]. Matsumura. Conf. n° 1029, pp. 288—305.

Synopsis des espèces des genres:

1115. [*Phaciocephalus* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, p. 167. — Anglais.

1116. [*Lamenia* Stål de la rég. néarct.] Van Duzee. Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc. **10**, 1912, pp. 501—504. — Synopsis et descriptions des espèces. — Anglais.
1117. [*Rhotana* Walk. de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Supplement 1907, p. 169. — Anglais.

Fam. Lophopidae.

1118. [Faune du Japon]. Matsumura. Conf. n° 1029, pp. 261—269.

Fam. Eurybrachydidae.

1119. [Synopsis des tribus et liste des genres]. Schmidt. Zool. Anzeig. **33**, 1908, pp. 241—247. — Allemand.

Synopsis des genres:

1120. [de la rég. éthiopienne]. Karsch. Ent. Nachr. **25**, 1899, pp. 1—2. — Allemand.
1121. [de la rég. australienne]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, p. 443. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

1122. [*Amychodes* Karsch]. Karsch. Ent. Nachr. **25**, 1899, p. 6. — Allemand.
1123. [*Aspidonitys* Karsch]. Karsch. L. c. pp. 9—10.
1124. [*Euronotobrachys* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 446. — Anglais.

Fam. Issidae.

1125. Melichar. Monographie der Issiden. Abh. zool.-bot. Ges. Wien **3**, Heft 4, 1906, pp. 1—327, 75 ff. dans le texte. — Synopsis et descriptions des tribus, des genres et des espèces. Allemand.

Synopsis des genres:

1126. [du monde]. Stål. Conf. n° 24. Sv. Vet. Akad. Handl. **3**, № 6, 1861, pp. 66—67; Öfv. Vet. Akad. Förh. 1861, pp. 207—210; Hem. afr. **4**, 1866, pp. 203—210; [Additions au précédent] Öfv. Vet. Akad. Förh. 1870, pp. 760—761 et 762—763. — Latin.
1127. [de la rég. australienne]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 436; Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 102—103. — Anglais.
1128. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. **1**, 1904, pp. 113—114. — Anglais.
- 1128a. [des genres voisins du g. *Augila* Stål]. Baker. Philipp. Journ. Science; **10**, Sect. D, 1915, p. 141. — Anglais.

Trib. Caliscelaria.

1129. Horváth. Species palaearticae generis *Caliscelis* Lap. Ann. Mus. Nat. Hung. **2**, 1904, pp. 378—385. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Latin.

1130. Horváth. Species generis *Ommatidiotus* Spin. Ann. Mus. Nat. Hung. 3, 1905, pp. 378—387. — Synopsis et descriptions détaillées des espèces. Latin.

Trib. Issaria.

Synopsis des espèces des genres:

1131. [*Mycterodus* Spin.]. Stål. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1861, pp. 210—211. — Latin.
1131a. [*Augila* Stål]. Baker. Philipp. Journ. Science, 20, Sect. D, 1915, pp. 141—142. — Anglais.
1132. [*Gelatissus* Kirk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 441. — Anglais.
1133. [*Tonga* Kirk. = *Cyrene* Westw.]. Melichar. Wien. Ent. Zeit. 20, 1901, pp. 171—181. — Synopsis suivi de descriptions des espèces. Allemand.

Fam. Tettigometridae.

1134. Signoret. Revue des groupe des Tettigonométrides. Ann. Soc. Ent. France (4), 6, 1866, pp. 139—160, 1 t. col. — Synopsis des sous-genres du g. *Tettigometra*, description des espèces. Français.
1135. Fieber. Synopse der europ. Arten *Tettigometra*. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, pp. 561—572. — Allemand.

Fam. Flatidae

= *Poekillopteridae* Kirk.

Synopsis des sous-familles.

1136. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 448. — Anglais.
1137. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1900, p. 45. — Anglais.

Subf. Ricaniinae.

1138. Melichar. Monographie der Ricaniiden. Ann. Naturh. Hofm. Wien 13, Heft 2, 1898, pp. 197—359, tt. 9—14. — Synopsis et descriptions des tribus, des genres et des espèces. Allemand.

Synopsis des genres:

1139. [du monde]. Stål. Conf. n° 24. Sv. Vet. Akad. Handl. 3, № 6, 1861, pp. 69—70. — Latin.
1140. [de l'Amérique centrale]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1900, p. 65. — Anglais.

Synopsis des espèces des genres:

1141. [*Ricania* Germ.]. Stål. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1865, pp. 160—161. — Latin.
1142. [*Pochazia* Am. et Serv.]. Stål. L. c. pp. 161—162.

Subf. Acanaloniinae

= *Acanoniida* Stål = *Amphiscepinæ* Kirk.

- 1143. [Monographie]. Melichar. Conf. n° 1147, Ann. Naturh. Hofmus. Wien 16, Heft 1, 1901, pp. 179—194, t. 1. — Synopsis et description des genres et des espèces. Allemand.
- 1144. [Synopsis des genres de la rég. éthiop.]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1912, p. 92. — Allemand.
- 1145. [Synopsis des sous-genres du g. *Acanalonia* Spin.]. Fowler. Biol. Centr. Hom. 1, p. 46. — Anglais.
- 1146. [Synopsis des espèces du g. *Parathiscia* Schmidt]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1912, pp. 92—93. — Allemand.

Subf. Flatinae

= *Poekillopterinae* Kirk.

- 1147. Melichar. Monographie der Acanaloniiden und Flatiden. Ann. Naturh. Hofmus. Wien 16, Heft 1, 1901, pp. 177—258; 17, Heft 1, 1902, pp. 1—253. tt. 1—9.—Synopsis et description des tribus, des genres et des espèces. Allemand.

Synopsis des genres.

- 1148. [du monde]. Stål. Conf. n° 24. Sv. Vet. Akad. Handl. 3, № 6, 1861, pp. 68—69; Hem. afr. 4, 1866, pp. 235—238. — Latin.
- 1149. [de l'Amér. centr.]. Fowler. Biol. Centr. Amer. Hom. 1, 1900, p. 50. — Anglais.
- 1150. [Synopsis des sous-genres du g. *Flata* Fabr.]. Fowler. L.c. p. 51.
- 1151. Jacobi. Ueber die Flatiden-Gattung *Poeciloptera* Latr., insbesondere den Formenkreis von *P. phalenoïdes* L. Sitzb. naturf. Freunde. Berlin 1904, pp. 1—14. — Synopsis et descriptions des sous-espèces et des espèces proches de la *P. phalenoïdes*. Allemand.
- 1151a. Rusiecka. Monographie du genre *Phantia* Fieb. Mitth. Schw. Ent. Ges. 10, 1902, pp. 420—424. — Descriptions très courtes des espèces. Français.

Synopsis des espèces des genres

- 1152. [*Nephesa* Am. et Serv. voisines de *N. rosea* Spin.]. Schmidt. Stett. Ent. Zeit. 1904, p. 205. — Allemand.
- 1153. [*Lawana* Dist. = *Phyma* Mel. voisines de *L. albopunctata* Kirby]. Schmidt. L. c. pp. 195—196.
- 1154. [*Massila* Walk.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers 1906, p. 459. — Anglais.
- 1155. [*Siphanta* Stål de la rég. austral.]. Kirkaldy. Leaf-Hoppers Suppl. 1907, pp. 98—99.

Series *Sternorhyncha*.

Fam. *Psyllidae*.

Catalogues.

1156. Aulmann. *Psyllidarum Catalogus*. Berlin 1913, 92 pp. — Énumération de toutes les espèces connues.
1157. Löw. *Katalog der Psylliden des paläarktischen Faunen-Gebietes*. Wien. Ent. Zeit. 1, 1882, pp. 209—214. — Liste des espèces habitant l'Europe, le bassin de la Méditerranée et le Turkestan. Allemand.
1158. Löw. *Revision der paläarktischen Psylliden in Hinsicht auf Systematik und Synonymie*. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1882, pp. 227—254. — Énumération des espèces paléarctiques arrangées par ordre alphabétique, avec indication de leur synonymie et de leur place systématique; la région paléarctique est adoptée dans les mêmes limites que dans l'ouvrage précédent. Allemand.
1159. Reuter. *Catalogus Psyllodearum in Fennia hactenus lectarum*. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 1, 1876, pp. 69—77. — Liste des espèces.
- Conf. en outre les nn° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 785, 787.

Classification.

1160. Löw. *Zur Systematik der Psylliden*. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1878, pp. 585—610, t. 9. — Synopsis et caractéristiques détaillées des tribus (= sous-familles sensu Löw) et synopsis des genres d'Europe. Allemand.
1161. Šulc. *Наставленіе къ собираиію листовыхъ блохъ [dans]: Наставленія къ собираиію и сохраненію зоологическихъ коллекцій, издаваемыя Зоологич. Музеемъ Академіи Наукъ. 7. Инструкціи для собираиія и сохраненія тлей, червецовъ, листовыхъ блохъ и алейродидъ. С.-Петербургъ. 1910. Рр. 57—90, tt. 8, 9. — Il s'y trouve (pp. 85—89) une traduction en russe des synopsis de Löw mentionnés sous le numéro précédent.*

Synopsis des genres.

1162. [d'Europe]. *Flor. Bull. Soc. Nat. Moscou* 1861, 1, pp. 336—337. — Allemand.
1163. [d'Europe]. *Puton. Ann. Soc. Ent. France* (5), 6, 1876, pp. 287—288. — Français.

Faunes.

1164. Meyer-Dür. *Die Psylliden*. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. 3, 1871, pp. 377—406. — Synopsis des genres et des espèces européennes. Allemand.

1165. Reuter. Till kännedom om Sveriges Psylloder. Entom. Tidskr. 2, 1881, pp. 145—172. — Énumération des espèces de la Suède, avec plusieurs notes systématiques. Suédois.
1166. Scott. Monograph of the British species belonging to the *Hemiptera-Homoptera*, family *Psyllidae*. Trans. Ent. Soc. London 1876, pp. 525—569, tt. 8, 9. — Synopsis des genres et description des espèces de la faune d'Angleterre. Anglais.
1167. Kuwayama. Die Psylliden Japans. Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 2, 1907, pp. 149—189, t. 3; 3, 1910, pp. 53—66, t. 2. — Synopsis et description des tribus, des genres et des espèces de la faune de Japon. Allemand et japonais.
1168. Froggat. Australian *Psyllidae*. Proc. Linn. Soc. New South Wales 1900, pp. 250—302, tt. 11—14; pp. 242—298, tt. 14—16; 1903, pp. 315—337, tt. 4—5. — Description des genres et des espèces d'Australie. Anglais.
1169. Crawford. American *Psyllidae*. Pomona Journ. of Entomol. 2, 1910, pp. 228—237, 347—362, ff. 98, 99; 3, 1911, pp. 422—453, 480—503; 628—632, ff. 152—155, 157—160, 209. — Synopsis des genres, descriptions et synopsis des espèces des régions néotropicale et néarctique. Anglais.
- En outre conf. les nn° 14, 15, 20, 23, 796.

Trib. *Carsidararia*³⁾.

1170. [Synopsis des genres]. Crawford. Pomona Journ. Entom. 3, 1911, pp. 482—483. — Anglais.

Trib. *Aphalararia*.

Synopsis des espèces des genres:—

1171. [*Euphyllura* Foerst. d'Europe]. Flor. Bull. Soc. Nat. Moscou 1861, 1, pp. 417—422. — Synopsis suivi de descriptions des espèces. Allemand.
1172. [*Euphyllura* de la rég. néarctique]. Schwarz. Proc. Amer. Ent. Soc. 6, 1904, 234—235. — Anglais.
1173. [*Rhinocola* Foerst.]. Flor. Bull. Soc. Nat. Moscou 1861, 1, p. 410. — Allemand.
1174. *Aphalara* Foerst. de la rég. néarctique]. Crawford. Pomona Journ. Ent. 3, 1911, pp. 494—495. — Anglais.

³⁾ La sous-famille *Carsidarinae* de Crawford me paraît être un groupe artificiel: il renferme des genres très éloignés appartenant probablement à des tribus diverses. En outre toutes les Psyllides forment une famille tellement compacte qu'il me semble peu naturel de les diviser en sous-familles; c'est pourquoi je préfère ne donner aux sous-familles de Löw que le rang de tribus.

Trib. *Psyllaria*.

1175. Šulc. Příspěvky ku poznání Psyll. [Contributions à la connaissance du g. *Psylla*]. I Rozpr. České Akad. Vědy, Slov. u Umění Tr. 2, 16, 1908, № 33, pp. 1—8, tt. 1—2; II L. c. 19, 1909, № 2, pp. 1—33, tt. 3—13. [Traduction allemande de la première partie de ce travail] Bull. Intern. Acad. Prague 18, 1908, pp. 248—256. — Commencement d'une monographie du g. *Psylla*, ne contient que 13 espèces paléarctiques; descriptions très détaillées; toutes les espèces illustrées de dessins. Bohémien.

Synopsis des espèces des genres:

1176. [*Psyllopsis* L ö w.]. L ö w. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1878, pp. 588—590. — Allemand.
1177. [*Calophya* L ö w. de la rég. néarctique]. Schwarz. Proc. Amer. Ent. Soc. 6, 1904, p. 241. — Anglais.
1178. [*Psylla* Latr. de la rég. paléarctique]. Flor. Bull. Soc. Nat. Moscou 1861, pp. 337—358. — Allemand.
1197. [Idem]. Šulc. Věstník České Společn. Nauk v Praze. 1900, pp. 17—37. — Bohémien.
1180. [*Psylla* qui vivent sur le *Pyrus communis*]. L ö w. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1886, p. 156. — Allemand.
1181. [*Amblyrhina* L ö w.]. L ö w. Rev. d'Ent. 7, 1888, p. 382. — Français.
1182. [*Floria* L ö w.]. L ö w. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1878, pp. 591—594. — Allemand.

Trib. *Triozeria*.

1183. [Faune de l'Amérique du Nord]. Crawford. Pomona Journ. Ent. 3, 1911, pp. 422—453, avec ff. dans le texte. — Synopsis et description des genres et des espèces. Anglais.
1184. Šulc. Monographia generis *Trioza* Förster. Species regionis palaearcticae. Sitzungsab. Böhm. Ges. Wiss. Prag. 1910, 34 pp., tt. 1—10; 1911, 34 pp., tt. 11—20; 1912, 63 pp., tt. 21—35; 1913, 48 pp., tt. 36—48. — Description très détaillée des espèces; chaque espèce illustrée par un grand nombre de figures. Allemand.

Liste alphabétique

des

noms des contrées et des divisions zoogéographiques.

Cette liste est destinée à rendre l'emploi du „Vade mecum“ plus facile pour les personnes s'occupant d'Hémiptères d'une faune donnée. Peut être aurait-il été préférable de n'y donner la répartition des articles cités qu'entre les grandes coupes zoogéographiques designées sous le nom de régions; mais cette tâche est audessus de mes forces, parce que beaucoup de synopsis contiennent des formes habitant des continents (Amérique, Asie) ou bien des contrées (Chine, Mexique) qui appartiennent a deux régions distinctes. J'ai été donc obligé à adopter la répartition entre les contrées nommées dans les articles cités. Le travaux qui contiennent des formes dont l'aire est très vaste, ou bien celles dont la distribution géographique m'est inconnue ne se trouvent pas dans cette liste.

- | | |
|---|---|
| Afrique 139, 161, 163, 164, 174, 176,
177, 179, 223, 246, 256, 272, 293,
301, 302, 304, 307, 555, 564, 688,
817, 872. | 322, 482, 487, 507, 521, 539, 544
552, 556, 558, 561, 914. |
| Algérie 145. | Angleterre 6, 50—52, 300, 426, 637, 740,
773, 773a, 794—797, 870, 926, 941,
969, 984, 989, 995, 1005, 1009, 1010,
1019, 1067, 1072, 1081, 1089, 1166. |
| Allemagne 56, 97, 638, 654, 655, 707,
708, 739, 772, 787, 799, 996. | Argentine 25—27, 937. |
| Amérique 92, 96, 111, 119, 120, 162, 166,
181, 224, 247, 251, 252, 483, 488,
508, 522, 540, 545, 553, 557, 559,
602, 620, 674, 915, 1033, 1055. | Asie 139, 161, 163, 164, 174, 176, 177,
179, 223, 246, 256, 272, 293, 301,
302, 304, 307, 555, 805, 819, 878,
867, 888, 1068, 1069. |
| Amérique centrale 63, 199, 309, 324—
329, 331—333, 336, 336, 450, 460—
464, 468—470, 474, 478, 479, 493,
499—502, 504, 512—514, 528, 529,
533, 535—537, 542, 546, 550, 554,
567, 568, 570—575, 581, 582, 584,
594, 606, 610, 611, 629—633, 635,
639, 641, 710, 717—719, 722, 723,
725, 736, 746, 768, 806, 869, 893,
897, 903, 906, 916, 958, 1035, 1066,
1079, 1100, 1128, 1140, 1145, 1149,
1150. | Astrachan 107, 141. |
| Amérique du Nord 32, 309, 857, 879,
924, 1183. | Australie 139, 161, 163, 164, 174, 176,
177, 179, 223, 246, 256, 272, 301,
302, 304, 307, 555, 805, 819, 878,
887, 888, 1068, 1169. |
| Ancien Monde 95, 110, 118, 163, 248, | Autriche 446, 985. |
| | Belgique 55. |
| | Brésil 24. |
| | Canada 23. |
| | Caucase 61, 815. |
| | Ceibes 19. |
| | Ceylan 17, 804, 811. |
| | Chili 64, 65, 225. |
| | Chine 667, 671. |

Danemark 49.

États-Unis 62, 216, 310, 311, 320, 489,
490, 713, 747, 759, 821, 822, 858, 934.

Europe 31, 45, 90, 96, 145, 146, 157, 159,
249, 250, 283, 342, 348, 354, 424,
425, 442, 481, 577, 596, 607, 609,
614, 621, 622, 627, 636, 640, 650,
778, 786, 790, 791, 792, 798, 812—
814, 871, 886, 940, 979, 982, 1002,
1003, 1006, 1007, 1016, 1019, 1020.
1027, 1076, 1135, 1160—1164, 1171,
1173, 1176.

Fidji 22.

Finlande 46—48, 319, 484, 589, 615,
653, 696, 703, 706, 716, 733, 771,
793, 993, 1159.

France 15, 53, 57, 66, 69, 201, 208, 254,
289, 312, 339, 344, 363, 427, 432,
485, 590, 781, 1017.

Hawaii 20, 21, 372, 375, 379, 494, 599,
605, 693, 699, 734, 974, 1013, 1045,
1070, 1078.

Hollande 54.

Hongrie 345, 358.

Inde anglaise 17.

Inde néerlandaise 70, 99, 109, 143, 233,
242.

Italie 58—60, 346, 752, 800.

Japon 802, 816, 855, 856, 942, 967,
976, 1028, 1029, 1047, 1068, 1101,
1108, 1114, 1118, 1167.

Java 784.

Livonie 14.

Madagascar 334, 495, 817.

Philippines 18, 926b, 963, 1131a.

Région australienne 77, 672, 805, 853,
927, 936, 943, 948, 1032, 1043,
1050, 1056, 1057, 1064, 1077, 1085,
1087, 1088, 1090—1097, 1099, 1104—
1106, 1110, 1111, 1115, 1117, 1121,
1127, 1132, 1154, 1155.

Région éthiopienne 16, 86, 91, 98, 108
142, 185—187, 191, 211, 214, 241,
299, 397, 440, 465, 516, 548, 564,
595, 1034, 1120, 1122—1124, 1144,
1146.

Région néarctique 33, 71, 81, 84, 100,
101, 121, 125, 127, 158, 160, 169,
189, 190, 193, 198, 205, 206, 212,
213, 215—217, 219—221, 228, 309,
373, 473, 657, 660, 666, 673, 705,
727, 735, 745, 774, 820, 889, 890,
933, 939, 944, 945, 949—951, 961,
966, 968, 970, 971, 975, 977, 981,
986, 990, 997, 999, 1000, 1011,
1012, 1015, 1018, 1026, 1030, 1051,
1054, 1065, 1071, 1073, 1082, 1083,
1102, 1103, 1116, 1169, 1172, 1174,
1177.

Région néotropicale 823, 1018, 1082,
1169.

Région orientale 77, 335, 672, 818.

Région paléarctique 3—5, 85, 87, 103,
124, 127—130, 133—135, 144, 147—
156, 170—172, 175, 188, 192, 194—
197, 200—204, 209, 210, 222, 227,
256a, 283—290, 297—300, 318, 337,
338, 361, 364, 366—368, 370, 371,
378, 382—384, 389, 390, 392, 404—
407, 409—413, 415, 417—421, 423,
438, 439, 445, 447, 452—459, 466,
467, 491, 498, 523, 527, 531, 565,
566, 598, 603, 604, 607, 647, 652,
658, 659, 661, 664, 665, 668, 669,
675—678, 689, 691, 692, 694, 695,
697, 698, 727, 728, 730, 731, 737,
745, 751, 758, 783, 810, 818, 854,
875, 876, 885, 947, 959, 978, 988,
1021, 1049, 1051, 1053, 1062, 1084,
1129—1131, 1157, 1158, 1175, 1178—
1182, 1184.

Russie 5, 67, 76, 124, 131, 151, 165,
256a, 288, 294, 295, 313, 318, 330,
347, 348, 365, 414, 457, 492, 532,
801, 1060, 1061.

Suède 66, 253, 319, 343, 356, 357, 484,
589, 615, 653, 703, 715, 732, 779,
780, 793, 946, 980, 983, 987, 994,
1004, 1008, 1080, 1165.

Suisse 655a.

Transvaal 803.

Turkistan 656, 1052.

Uruguay 27.

Zone arctique 13.

Liste alphabétique

des
noms systématiques.

- Acalypta** 453, 454.
Acalypta cervina 454.
Acanalonia 1145.
Acanaloniinae 1143—1146.
Acanoniida v. *Acanoloniidae*.
Acanthaspinae v. *Reduviinae*.
Acanthaspis 530.
Acanthia 730—736.
Acanthia saltatoria 733.
Acanthiidae 727—737.
Acanthiidae v. *Cimicidae*.
Acanthoceraria 270—271.
Acanthosoma 226, 227.
Acanthosoma v. *Elasmostethus*.
Acanthosominae 223—228.
Achilidae 1029, 1098—1106.
Acholla 582.
Acocephalaria 965—975.
Acocephalus 968.
Aconophora 900.
Adelphocoris 667.
Adelungia 959.
Aelia 200—203.
Aelia acuminata 202.
Aelia rostrata 203.
Æptaria 176, 178.
Aethalion 923.
Aethalioninae 922, 923.
Agallia 951.
Agalliini v. *Bythoscopinae*.
Agatharchus 195.
Agonoscelis 214.
Agraphopus 313.
Allocotus v. *Caridophthalmus*.
Allygus v. *Jassus*.
Almana 1062.
Aloha 1094.
Alydaria 303, 304.
Alydinae 296.
Amantia 1042.
Amastris 895.
Amblyrrhina 1181.
Amblystira 463.
Ambrysus 750, 753.
Amorbaria 258.
Amphibicorisae 706.
Amphiscepinæ v. *Acanaloniinae*.
Amychodes 1122.
Anasa 276.
Anecphora 1039.
Aneurus 334—336.
Anisops 742, 746.
Anisoscelaria 265—267.
Anthemina 196.
Anthocoraria 634—641.
Anthocoridae 29, 623—627.
Anthocoris 636—639.
Aphalara 1174.
Aphalararia 1171—1174.
Aphana 1034.
Aphanaria 415—417.
Apnaninae 398, 399.
Aphanus 416.
Aphelocheirus 751.
Aphleboderrhis 327.
Aphrophora 871.
Aphrophorinae 853, 868—876.
Aphylinae 72.
Apiomerinae 551—554.
Apiomerus 554.
Apterola 366.
Aptus v. *Nabis*.
Aradidae 318, 320, 337, 338.
Aradoideae 46, 315—320.
Aradus 337, 338.
Aradus betulæ 337.

Aradus lugubris 338.
Araeopus 1084.
Araspus 690.
Archimerus 270.
Arilus 581.
Aristippus 580.
Aristyllis 1106.
Arminae v. *Asopinae*.
Artagerrus 326.
Asopinae 70, 91, 93—103.
Aspidonitys 1123.
Asthenidea 631.
Atheas 469.
Athysanus 987, 993—998.
Athysanus stactogalus 998.
Auchenorhyncha 785—806.
Augila 1128a, 1131b.

Bactrodes 502.
Bactrodinae 502.
Balclutha 1011, 1012.
Banasa 217.
Barbiger v. *Agatharchus*.
Belostoma 764.
Belostomatidae 760—765.
Beosaria v. *Aphanaria*.
Berytidae 245, 340—348.
Berytus 346—348.
Berytus clavipes 347.
Berytus montivagus 348.
Blissiriae 380—382.
Bothrostethus 295.
Brachyrrhynchinae v. *Dysodiidae*.
Brachyrrhynchus v. *Mezira*.
Brachytaria 260.
Brochymaea 169.
Bryocoraria 688.
Buenoa 742, 747.
Bursinia 1062.
Byrsinus 85.
Bythoscopinae 938—953, 967.
Bythoscopus 945.

Caliscelaria 1129, 1130.
Caliscelis 1129.
Calisius 322.
Callinesia 1105.
Calliphara 116.
Calocoris 669.
Calophya 1177.

Camptobrochis 673.
Campylostira 452.
Cantacaderaria 449, 450.
Capsaria 658—673.
Capsidae 644—657.
Carbula 211.
Cardiastethus 632.
Caridophthalmus 167.
Carinetaria 843.
Carpocoris 196.
Carsidararia 1170.
Carystus 873.
Castolus 571.
Catonia 1103.
Centrocarenus v. *Centrocoris*.
Centrocoris 286, 287.
Centrotinae 914—921.
Ceratocombidae 605, 700—703.
Cercopidae 802, 851—858.
Cercopinae 853, 859—867.
Chariesteraria 273.
Chiloxanthus 737.
Chloriona 1089.
Chlorita 1020.
Chlorochroa 193.
Chlorocoris 181, 213.
Chlorocystaria 847.
Cicada 832, 833.
Cicada hiliaris 833.
Cicadaria 829.
Cicadaria v. *Auchenorhyncha*.
Cicadatraria 835.
Cicadidae 792, 802, 808—823.
Cicadinae 824—834.
Cicadoideae 807.
Cicadula 987, 1006—1010.
Cimex 621, 622.
Cimicidae 618—622.
Cimicidae v. *Capsidae* et *Pentatomidae*.
Cimicinae v. *Asopinae*.
Cimicoideae 613—615.
Cinyphus 329.
Cixiidae 1045.
Cixiinae 1063—1074.
Cixius 1072, 1073.
Clastoptera 874.
Clerada 401.
Cleradaria 400, 401.
Cletomorpha 282.
Cletus 282.

Clinocoridae v. *Cimicidae*.

Clinocoris v. *Cimex*.

Cloresmaria 262.

Cochlorhinus 1001.

Coelidia 962, 963.

Coelidiaria 960—964, 975.

Coleotichus 113.

Colobasiastes 352.

Colobasiastes fulvicollis 352.

Colobathristidae 245, 349—352.

Colpuraria 263, 264.

Conorhinus 525.

Copium v. *Holymenia*.

Coptosoma 76, 77.

Coptosoma cinctum 77.

Coptosomatidae v. *Plataspidae*.

Coranus 577.

Corearia 283—287.

Coreidae 29, 245—254.

Coreinae 256, 256 a.

Coreoideae 46.

Coreus 285.

Coriscina v. *Nabinae*.

Corixa 775, 777—781.

Corixidae 704—707, 769—784.

Corixoideae 738, 740.

Corizaria 307—313.

Corizinae 305, 306.

Corizus 308—311.

Corythucha 460.

Cosmopepla 206, 207.

Cosmopsaltria 813.

Cosmoscarta 859.

Cremonorhinaria v. *Plagiognatharia*.

Crinocerus 271.

Crophius 396.

Cryptocerata 738—740.

Cryptocricinae 750.

Cyclochilaria 828.

Cydnidae 70, 79—87.

Cylaparia 680—683.

Cylapinae 679.

Cyllocoraria 691—693.

Cymaria 377, 378.

Cymbomorpha 901.

Cyminae 374, 375.

Cymus 378.

Cyrene v. *Tonga*.

Cyrtochilus v. *Rhombocoris*.

Darninae 896—901.

Darnis 899.

Delegorguella 178.

Delphacidae 1075—1097.

Delphacodes 1084.

Delphax 1080, 1090.

Deltocephalus 982—987.

Dendrocoris 184, 219—221.

Derbidae 1029, 1113—1117.

Desudaba 1043.

Diaditus 514.

Dicranotropis 1091.

Dictyonota 455, 456.

Dictyophara 1054.

Dictyophararia 1053—1059.

Dictyopharinae 1046—1052.

Dicypharia 689, 690.

Diestostemma 935.

Dindymus 437.

Dinia 408.

Dinidorinae 70, 230—233.

Dionconotaria 676.

Dionconotus 676.

Diplonychus v. *Hydrocyrius*.

Discocephala 137.

Discocephalinae 136, 137, 173.

Dismegistus 86.

Dokuma 834.

Doratura 978.

Dorycephalus 970.

Dorysarthrus 1053.

Dryadocoris v. *Holcostethus*.

Dundubiaria 830.

Durganda 524.

Dysdercus 440.

Dysodiidae 318, 321—336.

Dysodius 328.

Ectatops 435.

Ectemnonotum 862.

Ectrichodiinae 543—549

Ectrychotes 547.

Elasmostethus 228.

Elina 456.

Elvisuraria 112—113.

Emblethis 419—421.

Emblethis verbasci 421.

Emesarla 497—501.

Emesinae 486—490,

Empoasca 1019.

Enchenopa 910.
Enchophyllum 909.
Engistus 384.
Enoplops v. *Coreus*.
Eremocoris 423.
Eucorysses 117.
Eugubinus 496.
Euloba 323.
Eulyes 560.
Eumecopus 168.
Euphyllura 1171, 1172.
Eupteryginae v. *Typhlocybinae*.
Eurinoscopus 952.
Euronotobrachys 1124.
Eurybrachydidae 1119—1124.
Eurycera 466, 467.
Eurydema oleraceum 222.
Eurygaster 134—135.
Eurygastraria 132—135.
Eurymela 953.
Eurymelini v. *Bythoscopinae*.
Eurystylus 670.
Eusarcoris 208, 209.
Eusarcoris inconspicuus 209.
Euschistus 198.
Eusthenaria 240.
Eutettix 990.
Eutropistidae v. *Tropiduchidae*.
Exaeretaria v. *Plagiognatharia*.
Excentricus 697.
Fidicinaria 836.
Flata 1150.
Flatidae 1136, 1137.
Flatinae 1147, 1155.
Floria 1182.
Fulgoridae 1031—1044.
Fulgoroideae 792, 1022—1030.
Fulviaria 684—687.
Fulvius 685, 686.
Gaeanaria 838.
Gaeaninae 835—839.
Galeatus 457, 458.
Gargaphia 462.
Gelatissus 1132.
Geocorinae 385—390.
Geocoris 387—389.
Germalus 386.
Gerridae 711—721.

Gerris 715—718.
Gerroideae 46, 708, 709, 740.
Ghilianella 500.
Glymmatophora 548.
Gnathobleda 513.
Gnathodus v. *Balclutha*.
Gonianotaria 418—421.
Gonoceraria 281, 282.
Gorpis 600.
Graphocraerus 987.
Graphosoma 156, 157.
Graphosomaria 146, 153—157.
Graphosominae 70, 91, 106, 138—143.
Graptocleptes 572.
Grypocoris 668.
Gynopygoplax 861.
Gypona 957, 958.
Gyponaria 957, 958.
Hadeodelphax 1088.
Hadrocnemis 412.
Halobates 712, 714.
Halobatodes v. *Metrocoris*.
Halyarla 164—172.
Halycorypha 186.
Halydicoris 185.
Halyomorpha 191.
Hammatocerinae 550.
Haplodelphax 1092.
Haploprocta 283, 284.
Harpactorinae 555—585.
Hasta 1056.
Hebridae 608—613, 706, 709.
Hebriformes 740.
Hebrus 609, 610.
Helicoptera 1102.
Helopeltis 688.
Hemidictyaria 850.
Hemiptera 1—27.
Hemiptycha 898.
Henestarinae 383, 384.
Henestaris 383.
Henicocephalidae 472—474.
Henicocephalus 473, 474.
Hesus 325.
Heterogaster 392.
Heterogastrinae 391, 392.
Heteroptera 28—65.
Heza 575, 576.
Holcostethus 187.

Holodictya 1040.
 Holoptilinae 518, 519.
 Holotrichius 527.
 Holymenia 266.
 Homaemus 121.
 Homalocoris 550.
 Homoeoceraria 261.
 Homoptera 4, 6, 785—806.
 Hoplistoscelis 602.
 Hoplophorinae 902—905.
 Huechysaria 842.
 Hyalopeplus 662, 663.
 Hyantiararia 840.
 Hydararia 291.
 Hydrobiotica 613, 704—707.
Hydrocorisiae 706.
 Hydrocyrius 765.
 Hydrometra 710.
 Hydrometridae 710.
Hydrometridae v. Gerridae.
 Hypsauchenia 917.
Hypseloecaria v. Laboparia.
 Hypselonotaria 275—280.
 Hypselonotus 277.

Idiocerus 943, 944.
 Ischnodemus 381, 382.
 Ischnopeza 418.
 Ischnorhyncharia 376.
 Issaria 1131—1133.
 Issidae 1125—1128a.

Jalla 103.
 Jassaria 974—1013.
Jassaria v. Coelidiaria.
 Jassidae 802, 924, 925.
 Jassinae 954.
Jassoidea v. Jassidae.
 Jassus 987—989.
Jassus v. Coelidia.

Kasserota 1058.
 Koebeliaria 959.

Laboparia 694.
 Lamenia 1116.
 Larginae 433.
Larymna v. Ectrychotes.
 Lasiochilus 629.
 Laternaria 1035.

Lawana 1153.
 Lawana albopunctata 1153.
Ledrinae v. Scarinae.
 Leistarcharia 495, 496.
 Leogorrens 533.
 Leprosoma 148, 152
 Leptobelus 918.
 Leptobyrsa 461.
 Leptocorisaria 301.
 Leptodictya 468.
 Leptoglossus 267.
 Leptopodidae 726.
 Leptoscelaria 268, 269.
 Leptoscelis 268.
 Leptostyla 464.
 Lethaearia 422—427.
Liburnia v. Delphax.
 Limnocoris 754.
 Limnometra 718.
Limnotrechus v. Gerris.
Liotropis v. Dendrocoris.
 Lisarda 517.
 Lophopidae 1029, 1118.
 Lopus 675.
 Lutevopsis 499.
Lybantaria v. Colpuraria.
 Lycoderes 921.
 Lyctocoraria 628—633.
 Lygaearia 360—368.
 Lygaeidae 29, 353—358.
 Lygaeinae 359.
 Lygaeoideae 46, 339.
 Lygaeosoma 367.
 Lygaeus 361, 365.
Lygaeus v. Spilostethus.
 Lygus 671, 672.

Machaerotinae 877, 878.
Macrocephalidae v. Phymatidae
 Macrocephalus 479.
Macrolopharia v. Dicypharia.
 Macrophthalmus 536.
 Macropygium 166.
 Macrotrachelia 635.
 Macrotylus nigricornis 698.
 Malfeytia 1038.
 Margasus 578.
 Margus 275.
 Martarega 742.
 Massila 1154.

Meccus 537.
Mecocephala 180.
Megadoeum 244.
Megastethodon 863.
Megophthalminae 926a—926b.
Melampsaltaria 849.
Melanotelus 368.
Membracidae 792, 802, 854, 879—890.
Membracinae 906—913.
Membracis 907.
Menaccarus 175.
Merochorinae 255.
Merragata 611, 612.
Mesonitys 549.
Mesoveliidae 613, 706, 709.
Metaphaena 1037.
Metrarga 379.
Metrarginae 379.
Metrocoris 714, 721.
Mezira 330, 331.
Micrellytraria 302.
Microlestria 529.
Micronecta 776, 782—784.
Micropus v. *Ischnodemus*.
Microphysidae 623, 642.
Microvelia 725.
Mictaria 257.
Mictaria v. *Acanthoceraria*.
Milyas 568.
Mimulocoris 197.
Miraria 677, 678.
Miridae v. *Capsidae*.
Moganniaria 839.
Monobelus 919.
Mononychidae 766—767.
Mustha 170—172.
Mycterodus 1131.
Myocoris 562.
Myodocharia 402.
Myodocharidae v. *Lygaeidae*.
Myodocharinae v. *Aphaninae*.
Myrilla 1044.
Myrmecophyaria v. *Laboparia*.
Myrochaearia 177, 178.

Nabidae 586—590.
Nabinae 597—607.
Nabinae v. *Prostemminae*.
Nabis 598, 599, 601—607.
Nabis ferus 604.

Nabis lativentris 607.
Naeogetidae v. *Hebridae*.
Nagusta 583.
Nalata 528.
Nasocoraria v. *Plagiognatharia*.
Naucoridae 748—754.
Naucoris 752.
Neididae v. *Berytidae*.
Neottiglossa 204, 205.
Nepa 756.
Nephesa 1152.
Nephesa rosea 1152.
Nephrotettix 992.
Nepidae 755—759.
Nersia 1055.
Nerthridae v. *Mononychidae*.
Nesodryas 1097.
Nesopleias 1095.
Nesoteles 1013.
Nesothoe 1096.
Neurostenus 333.
Nezara 215, 216.
Nosita 495.
Notocyrtus 569, 570.
Notonecta 741, 743, 745.
Notonectidae 741—747.
Notonectoideae 738—740.
Nychia 742.
Nysius 370—373.

Ochteridae 768.
Ochteroideae 738—740.
Ochterus 768.
Odmalea 218.
Odontopus 436.
Odontoscelaria 123—125.
Odontoscelis 124, 125.
Odontotarsaria 126—131.
Odontotarsus 128, 131.
Oechalia 102.
Oecleus 1074.
Oenopia 1058.
Oliarus 1069—1071.
Ommatidiotus 1130.
Oncocephalus 509.
Oncomeraria 238.
Oncotylaria v. *Plagiognatharia*.
Ophthalmicus v. *Geocoris*.
Opsicoetus v. *Reduvius*.
Orgeriaria 1060—1062.

Orsillaria 369—373.
Orthostira v. *Acalypta*.
Orthotylus 693.
Osa 111.
Oxycareninae 394—397.
Oxycarenus 397.
Oxygonia 894.

***Pachycephalini* v. *Colpuraria*.**

Pachycoris 122.
Pachycoris torridus 122.
Pachygronthinae 393.
Pachymerus v. *Aphanus*.
Pachynominae 591.
Pagasa 594.
Palomena 192.
Parabolocratus 971.
Paramecocoris v. *Delegorguella*.
Parastaria v. *Risibia*.
Parathiscia 1146.
Parnisaria 846.
Paryphes 280.
Pediopsis 946—950.
Pelagonidae v. *Ochteridae*.
Pelagonus v. *Ochterus*.
Pendulinaria 274.
Pentatoma v. *Chlorochroa*.
Pentatomaria 179—222.
Pentatomidae 88—92.
Pentatominae 161—163.
Pentatomoidae 29, 46, 68—71.
Penthimiaria 955—956.
Peribalus 188, 189.
Perillus 100.
Peritrechus 404, 413, 414.
Peritropis 687.
Perkinsiella 1085.
Petaloccephala 928, 929.
Petalochirus 516.
Petascelaria 259.
Phacalastor 1093.
Phaciocephalus 1115.
Phatnoma 450.
Phenelia 1104.
Philaenus 875, 876.
Philaenus leucophthalmus 875, 876.
Philaenus spumarius v. *Ph. leuco-*
phthalmus.
Phimodera 127, 129, 130.
Phlepsius 977.

Phloea 235.
Phloeinae 234, 235.
Phorticus 595.
Phrictus 1036.
Phrynorphini v. *Jassaria*.
Phthia 269.
Phylaria v. *Piagiognatharia*.
Phyllocephalinae 236, 237.
Phyllocraspedum v. *Euloba*.
Phyllomorpharia 292.
Phyllontochila 465.
Phyma v. *Lawana*.
Phymata 478.
Phymatidae 475—479.
Physomeraria 272.
Phytocoridae v. *Capsidae*.
Phytocoris 664—666.
Phytophtires 6.
Pictinus 332.
Piesma 447.
Piesmidae 447.
Piezostethus 630.
Pilophorus 692.
Piocoris 390.
Pionosomus 406.
Piratinae 538—542.
Pithanus 661.
Plagiognatharia 695—698.
Plataspidae 70, 73—78.
Plataspis 78.
Platycotis 904.
Platymetopius 979—981, 987.
Plea v. *Ploa*.
Plinthisus 409, 410.
Ploa 742, 744.
Plociomeraria v. *Myodocharia*.
Ploeogaster 579.
Ploiaria 498.
Ploiaria v. *Ploiariola*.
Ploiariaria v. *Stenolemaria*.
Ploiariodes 494.
Ploiariola 491, 492.
Ploiariopsis 501.
Ploteres v. *Gerroideae*.
Pnirontis 511, 512.
Pochazia 1142.
Podisus 101.
Podoparia 158—160.
Podops 160.
Poeciloptera 1151.

Poecilopectera Phalenoides 1151.
Poekillopteridae v. Flatidae.
Poekillopterinae v. Flatinae.
 Polycetenidae 616, 617.
 Polyneuraria 825.
 Polyneuria 66, 67.
 Poophilus 872.
 Potamobates 719.
 Pothea 546.
 Proconiinae 930—937.
 Proderus 405.
 Prostemma guttula 596.
 Prostemmaeinae 595—596.
 Proxius 324.
 Proxys 199.
 Psallus 696.
 Pseudophloeinae 293—295.
 Pseudophlocus 294.
 Psylla 1175, 1178—1180.
 Psyllaria 1175—1182.
 Psyllidae 1—6, 14, 15, 20, 23, 796,
 1156—1169.
 Psylloideae 4.
 Psyllopsis 1176.
 Pterygia 912.
 Ptilocerus 519.
 Pydolampis 510.
 Pyrrhocoridae 245, 428—432.
 Pyrrhocorinae 434—440.
 Pyrrhocoris 438, 439.
Ranatra 757—759.
 Rasahus 542.
 Reduviidae 480—485.
Reduviina v. Harpactorinae.
 Reduviinae 520—537.
 Reduvidae 46.
Reduviolinae v. Nabinae.
Reduviolus v. Nabis.
 Reduvius 523, 526, 531, 532.
Reduvius v. Rhinocoris.
 Repipta 573.
 Restheniaria 674, 675.
 Rhagovelia 723, 724.
 Rhaphidosoma 564.
 Rheumatobates 720.
 Rhinocola 1173.
 Rhinocoris 561.
 Rhinocylapus 681.
 Rhinomiris 682.

Rhombocoris 194.
 Rhotana 1117.
 Rhynchocoris 183.
Rhynchota v. Hemiptera.
Rhyngota v. Hemiptera.
 Rhyparochromaria 403—414.
 Rhyparochromus 407.
 Rhyparochromus chiragra 407.
 Ricania 1141.
 Ricaniinae 1138—1142.
 Risibia 210.
 Rocconota 574.
Saica 504.
 Saicinae 503, 504.
Salda v. Acanthia.
Saldidae v. Acanthiidae.
 Salyavatinae 515—517.
 Sandaliorhyncha 613.
 Scamandra 1041.
 Scaphoideus 999, 1000.
 Scarinae 927—929.
 Sciocoraria 173—175.
 Scolopostethus 424—427.
 Scolops 1059.
Seraulia v. Dictyonota.
 Scutelleraria 115—117.
 Scutellerinae 70, 91, 104—111.
 Sehirus 82, 87.
 Sepinaria 238.
 Serapita 865.
 Serenthiaria 471.
 Serinetaria 314.
 Sextius 920.
 Sialoscarta 860.
Sigara v. Micronecta.
 Signoretia 926b.
 Simeliria 864.
 Sinea 563, 584, 585.
 Siphanta 1155.
 Sirthenea 541.
 Smilliinae 892—895.
 Solenonotus 633.
 Spathocera 288—290.
 Spathoceraria 288—290.
 Sphaerocoraria 114.
 Sphongophorus 908, 911.
 Spilostethus 362, 364.
 Spiniger 534, 535.
 Stenocephalaria 297—300.

Stenocephalus 297—300.

Stenocotinae v. *Megophthalminae* et
Scarinae.

Stenodema 677.

Stenolemaria 491—494.

Stenopodinae 506—514.

Stenoprasia 279.

Stephanitis 459.

Sternorhyncha v. *Psyllidae*.

Stictopleurus 312.

Strachia 182.

Strongylocephalus 969.

Stygnocoris 411.

Sulamita 699.

Sulamitaria 699.

Sundarus 278.

Suracatra 866, 867.

Suracatra tricolor 867.

T*acuaria* 826.

Tangia 1112.

Taphuraria 845.

Tarisa 144, 145.

Tarisaria 144, 145.

Tartessus 973.

Teleonemia 470.

Teratophyllidae 623, 643.

Tesseratominae 70, 91, 238—244.

Tetroxia 530.

Tettigadesaria 841.

Tettigometra 1134, 1135.

Tettrigometridae 1134, 1135.

Tettigomyiaria 848.

Tettigoniella 936, 937.

Tettigoniinae v. *Proconiinae*.

Tetyra 120.

Tetyraria 118—122.

Thamnotettigaria v. *Jassaria*.

Thamnotettix 987, 1002—1006.

Thanatodictya 1057.

Tharra 964.

Theognis v. *Leptoglossus*.

Tholagmus 155.

Thopharia 827.

Thyanta 212.

Thyreocoris 84.

Tibicinaria 844.

Tibicininae 840—850.

Tingitaria 451—470.

Tingitidae 448.

Tingitoideae 46, 441—446.

Tonga 1133.

Tragopinae 891.

Tribelocephalinae 505.

Trichopepla 190.

Trichotelocera 613, 700—703.

Trigonosoma 149—151.

Trigonosomaria 146—152.

Trigonotylus 678.

Trioza 1184.

Triozaaria 1183, 1184.

Triphleps 640, 641.

Tropidocephala 1086, 1087.

Tropidocera 909.

Tropidoscyta 913.

Tropiduchidae 1029, 1107—1112.

Typhlocybinae 1014—1021.

U*hleriella* 972.

Ulopiniae 926.

Urolabidinae v. *Urostylinae*.

Urostylinae 68, 229.

V*achiria* 565, 566.

Vannius 683.

Velia 722.

Veliidae 722—725.

Ventocoraria v. *Trigonosomaria*.

Verlusia 283.

Vulturnus 956.

W*estermannia* 493.

X*estocephalus* 991.

Z*ammararia* 837.

Zelus 567.

Zosmenus v. *Piesma*.

Zyginella 1021.

Table des matières.

	Pp.	№№		Pp.	№№
Préface	1	—	Trib. Podoparia	27	158—160
Table alphabétique des revues scientifiques ci- tées	6	—	Subf. Pentatominae . .	27	161—163
Table des groupes taxo- nomiques des Hémi- ptères jusqu'aux sous- familles inclusivement	10	—	Trib. Halyaria	28	164—172
Ordo Hemiptera	13	1—27	Trib. Sciocoraria	28	173—175
Subordo Heteroptera . .	15	28—65	Trib. Aëptaria	28	176
Series Polyneuria . . .	20	66—67	Trib. Mirochaearia . . .	28	177—178
Superf. Pentatomoideae.	20	68—71	Trib. Pentatomaria . . .	29	179—222
Fam. Aphyllidae	21	72	Subf. Acanthosominae .	31	223—228
Fam. Plataspidae	21	73—78	Subf. Urostylinæ . . .	31	229
Fam. Cydnidae	21	79—87	Subf. Dinidorinae . . .	31	230—233
Fam. Pentatomidae . . .	22	88—92	Subf. Phlocinae	31	234—235
Subf. Asopinae	23	93—103	Subf. Phyllocephalinae .	32	236—237
Subf. Scutellerinae . . .	24	104—111	Subf. Tesseratominae . .	32	238—244
Trib. Elvisuraria	24	111—113	Fam. Coreidae	32	245—254
Trib. Sphaerocoraria . .	24	114	Subf. Merocorinae . . .	33	255
Trib. Scutelleraria . . .	24	115—117	Subf. Coreinae	33	256—256a
Trib. Tetyraria	24	118—122	Trib. Mictaria	33	257
Trib. Odontoscelaria . .	25	123—125	Trib. Amorbaria	33	258
Trib. Odontotarsaria . .	25	126—131	Trib. Petascelaria . . .	33	259
Trib. Eurygastraria . . .	25	132—135	Trib. Brachytaria	33	260
Subf. Discocephalinae .	26	136—137	Trib. Homoeoceraria . .	33	261
Subf. Graphosominae . .	26	138—143	Trib. Cloresmaria	33	262
Trib. Tarsaria	26	144—145	Trib. Colpuraria	34	263—264
Trib. Trigonosomaria . .	26	146—152	Trib. Anisoscelaria . . .	34	265—267
Trib. Graphosomaria . .	27	153—157	Trib. Leptoscelaria . . .	34	268—269
			Trib. Acanthoceraria . .	34	270—271
			Trib. Physomeraria . . .	34	272
			Trib. Chariestaria	34	273
			Trib. Pendulinaria . . .	34	274

	Pp.	№№		Pp.	№№
Trib. Hypselonotaria . . .	34	275—280	Trib. Aphanaria	43	415—417
Trib. Gonoceraria . . .	35	281—282	Trib. Gonianotaria . . .	44	418—421
Trib. Corearia	35	283—287	Trib. Lethaearia	44	422—427
Trib. Spathoceraria . . .	35	288—290	Fam. Pyrrhocoridae . . .	44	428—432
Trib. Hydararia	35	291	Subf. Larginae	45	433
Trib. Phyllomorpharia . .	35	292	Subf. Pyrrhocorinae . . .	45	434—440
Subf. Pseudophloeinae . .	36	293—295	Superf. Tingitoideae . . .	45	441—446
Subf. Alydinae	36	296	Fam. Piesmididae	45	447
Trib. Stenocephalaria . . .	36	297—300	Fam. Tingitidae	46	448
Trib. Leptocorisaria . . .	36	301	Trib. Catacaderaria . . .	46	449—450
Trib. Microlytraria	36	302	Trib. Tingitaria	46	451—470
Trib. Alydaria	36	303—304	Trib. Serenthiaria	47	471
Subf. Corizinae	36	305—306	Fam. Henicocephalidae . .	47	472—474
Trib. Corizaria	37	307—313	Fam. Phymatidae	47	475—479
Trib. Serinetharia	37	314	Fam. Reduviidae	47	480—485
Superf. Aradoideae	37	315—320	Subf. Emesidae	48	486—490
Fam. Dysodiidae	38	321—336	Trib. Stenolemaria	48	491—494
Fam. Aradidae	38	337—338	Trib. Leistarcharia	48	495—496
Superf. Lygaeoideae	39	339	Trib. Emesaria	48	497—501
Fam. Berytidae	39	340—348	Subf. Bactrodinae	49	502
Fam. Colobathristidae . . .	39	349—352	Subf. Saicinae	49	503—504
Fam. Lygaeidae	39	353—358	Subf. Tribelocephalinae . .	49	505
Subf. Lygaeinae	40	359	Subf. Stenopodinae	49	506—514
Trib. Lygaearia	40	360—368	Subf. Salyavatinae	49	515—517
Trib. Orsillaria	40	369—373	Subf. Holoptilinae	50	518—519
Subf. Cyminae	41	374—375	Subf. Reduviinae	50	520—537
Trib. Ischnorhyncharia . .	41	376	Subf. Piratinae	51	538—542
Trib. Cymaria	41	377—378	Subf. Ectrichodiinae . . .	51	543—549
Subf. Metrarginae	41	379	Subf. Hammatocerinae . . .	51	550
Subf. Blissinae	41	380—382	Subf. Apiomerinae	52	551—554
Subf. Henestarinae	41	383—384	Subf. Harpactorinae	52	555—585
Subf. Geocorinae	41	385—390	Fam. Nabidae	53	586—590
Subf. Heterogastrinae . . .	42	391—392	Subf. Pachynominae	54	591
Subf. Pachygronthinae . . .	42	393	Subf. Prostemmae	54	592—596
Subf. Oxycareninae	42	394—397	Subf. Nabinae	54	597—607
Subf. Aphaninae	42	398—399	Fam. Hebridae	55	608—612
Trib. Cleradaria	43	400—401	Superf. Cimicoideae	55	613—615
Trib. Myodocharia	43	402	Fam. Polycetenidae	55	616—617
Trib. Rhyparochromaria . .	43	403—414	Fam. Cimicidae	56	618—622

	Pp.	№№		Pp.	№№
Fam. Anthocoridae . . .	56	623—627	Superf. Cicadoideae . . .	70	807
Trib. Lyctocoraria . . .	56	628—633	Fam. Cicadidae	70	808—823
Trib. Anthocoraria . . .	57	634—641	Subf. Cicadinae	72	824—834
Fam. Microphysidae . . .	57	642	Subf. Gaeaninae	72	835—839
Fam. Termatophylidae . .	57	643	Subf. Tibicininae	72	840—850
Fam. Capsidae	57	644—657	Fam. Cercopidae	73	851—858
Trib. Capsaria	59	658—673	Subf. Cercopinae	73	859—867
Trib. Restheniaria	59	674—675	Subf. Aphrophorinae . .	74	868—876
Trib. Dionconotaria . . .	60	676	Subf. Machaerotinae . .	74	877—878
Trib. Miraria	60	677—678	Fam. Membracidae . . .	75	879—890
Subf. Cylapinae	60	679	Subf. Tragopinae	75	891
Trib. Cylaparia	60	680—683	Subf. Smiliinae	76	892—895
Trib. Fulviana	60	684—687	Subf. Darninae	76	896—901
Trib. Bryocoraria	60	688	Subf. Hoplophorinae . .	76	902—905
Trib. Dicypharia	60	689—690	Subf. Membracinae . . .	76	906—913
Trib. Cyllocoraria	61	691—693	Subf. Centrotinae	77	914—921
Trib. Laboparia	61	694	Subf. Aethalioninae . . .	77	922—923
Trib. Plagiognatharia . .	61	695—698	Fam. Jassidae	77	924—925
Trib. Sulamitaria	61	699	Subf. Ulopinae	78	926
Series Trichotolocera . .	61	700—703	Subf. Megophthalminae .	78	926a—926b
Series Hydrobotica . . .	62	704—707	Subf. Scarinae	78	927—929
Superf. Gerroideae	62	708—709	Subf. Proconiinae	78	930—937
Fam. Hydrometridae . . .	62	710	Subf. Bythoscopiniae . .	79	938—953
Fam. Gerridae	62	711—721	Subf. Jassinae	80	954
Fam. Veliidae	63	722—725	Trib. Penthimiaria	80	955—956
Fam. Leptopodidae	63	726	Trib. Gyponaria	80	957—958
Fam. Acanthiidae	63	727—737	Trib. Koebeliaria	80	959
Superff. Notonectoideae +			Trib. Coelidiaria	80	960—964
+ Ochteroideae + Co-			Trib. Acocephalaria . . .	81	965—973
rixoideae	64	738—740	Trib. Jassaria	81	974—1013
Fam. Notonectidae	64	741—747	Subf. Typhlocybinae . . .	83	1014—1021
Fam. Naucoridae	65	748—754	Superf. Fulgoroideae . . .	84	1022—1030
Fam. Nepidae	65	755—759	Fam. Fulgoridae	85	1031—1044
Fam. Belostomatidae . . .	66	760—765	Fam. Cixiidae	85	1045
Fam. Mononychidae	66	766—767	Subf. Dictyopharinae . . .	85	1046—1052
Fam. Ochteridae	66	768	Trib. Dictyophararia . . .	86	1053—1059
Fam. Corixidae	66	769—784	Trib. Orgeriaria	86	1060—1062
Subordo Homoptera	68	—	Subf. Cixiinae	87	1063—1074
Series Auchenorrhyncha .	68	785—806	Fam. Delphacidae	87	1075—1097

	Pp.	№№		Pp.	№№
Fam. Achilidae	89	1098—1106	Séries Sternorhyncha . .	92	—
Fam. Tropiduchidae . .	89	1107—1112	Fam. Psyllidae	92	1156—1169
Fam. Derbidae	89	1113—1117	Trib. Carsidararia . . .	94	1170
Fam. Lophopidae . . .	90	1118	Trib. Aphalararia . . .	94	1171—1174
Fam. Eurybrachydidae .	90	1119—1124	Trib. Psyllaria	94	1175—1182
Fam. Issidae	90	1125—1128a	Trib. Triozaria	95	1183—1184
Trib. Caliscelaria . . .	90	1129—1130	Liste alphabétique des		
Trib. Issaria	91	1131—1133	noms des contrées et		
Fam. Tettigometridae .	91	1134—1135	des divisions zoogéo-		
Fam. Flatidae	91	1136—1137	graphiques	96	—
Subf. Ricaniinae	91	1138—1142	Liste alphabétique des		
Subf. Acanaloniinae . .	92	1143—1146	noms systématiques .	98	—
Subf. Flatinae	92	1147—1155			

Errata et corrigenda.

Page:	Ligne:	Au lieu de:	Lisez:
8	26	Sidney	Sydney
11 (2)	40	Ploeinae	Pleinae
12 (2)	38	Chlodk.	Cholodk.
16	36	11910	1910
27	24	Auglais	Allemand.
27	26	(à ajouter)	Anglais.
42	5	Trop.	Trop
51	29	sc	se
60	11	Lattn	Latin
64	41	Ploa	Plea
99	35	Brochymaea	Brochymena
104	4	Osa 111	Ossa 1111.
104	41a	(à ajouter)	Phantia 1151a
104 (2)	33	Plea v. Ploa	Plea 742, 744.
104 (2)	36	Ploa 742, 744	Ploa v. Plea.
105	1	Phalenoides	phalenoides
I (2)	12	Phlocinae	Phloeinae
II (2)	10	Catacaderaria	Cantacaderaria
IV (2)	1	92	93
IV (2)	2	92	93.

№

A insérer:

- 20 71a. Van Duzee. Annotated list of the Pentatomidae recorded from America North of Mexico, with descriptions of some new species. Trans. Amer. Ent. Soc. 30, 1904, pp. 1—80. — Liste des espèces de la faune néarctique; données sur leur distribution géographiques ainsi que plusieurs synopsis; ces derniers sont cités ci-dessous. Anglais.
- 79 937a. [Synopsis des espèces du g. *Makilingia* Bak.]. Baker. Philipp. Journ. Science 9, 1914, Sect. D, pp. 410—411. — Anglais.
- 94 1163a. [des îles Philippines]. Crawford. Philipp. Journ. Science 10, 1915, Sect. D, pp. 257—258. — Anglais.

Печатано по постановленію Совѣта Русскаго Энтомологическаго Общества.
Сентябрь 1916. Septembre 1916.

L'auteur prie de faire les corrections suivantes dans la description de *Mylabris gemmula* D o h r n (p. 3).

Au lieu de:

Corps et élytres très densément couverts de duvet gris-jaunâtre, très fin et très court, à peine visible, comme parsemé de poudre. — Corps obscur-violet. Élytres jaunes, partie des élytres plus obscures couvertes de duvet plus dense que les parties jaunes.

Lisez:

Corps et élytres, sauf le dessin jaune ou rougeâtre sur les élytres très densément couverts de duvet gris-jaunâtre fin, comme parsemé de poudre. Corps et élytres obscurs violets, le dernières ornées de deux bandes longitudinales, l'une sur le bord latéral, l'autre près de la suture.

ÉDITIONS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE

à Petrograd.

1) Horae Societatis Entomologicae Rossicae.

Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.
I	2	50	XI	6	—	XXI	8	—	XXXI	10	—
II	2	50	XII	6	50	XXII	6	50	XXXII	5	50
III	3	50	XIII	9	—	XXIII	8	—	XXXIII	6	50
IV	2	25	XIV	8	—	XXIV	7	—	XXXIV	6	—
V	3	—	XV	11	—	XXV	6	—	XXXV	6	—
VI	7	—	XVI	8	—	XXVI	6	—	XXXVI	5	50
VII	5	—	XVII	9	—	XXVII	9	—	XXXVII	5	50
VIII	6	—	XVIII	6	—	XXVIII	6	50	XXXVIII	8	—
IX	7	—	XIX	7	—	XXIX	6	—	XXXIX	12	—
X	2	50	XX	8	—	XXX	10	—	XL	4	50
									XLI	3	45

2) Les annales russes („Troudy“) de la Société.

Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.
III	2	—	VI	3	50	X	4	—
IV	2	50	VII	2	50	XI	4	—
V	2	—	VIII	4	60	XIII	3	—

3) *Revue Russe d'Entomologie*, fondée par D. Glazunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shanskij, N. Shiriajev et T. Tshitsherin, Vol. I—VI (1901—1906). Prix 3 r. le volume. Vol. VII—XV (1907—1915). Prix 4 r. le volume.

4) B. N. Dybowsky. *Beiträge zur näheren Kenntniss der in dem Baikal-See vorkommenden Gammariden*. Supplément au X volume des „Horae“. 1874. Prix 7 r. 50 cop.

5) *Genres et espèces d'insectes publiés dans différents ouvrages par V. Motschoulsky*. Supplément au VI volume des „Horae“, 1868. Prix 75 cop.

6) *Index des communications faites dans les séances de la Société Entomologique de Russie pendant 35 ans de son existence (1859—1894)*. Par V. Mazaraki. Prix 40 cop.

7) *Exploration scientifique du gouvernement de St-Petersbourg*. Volume 1-er. 1864. Prix 2 r. 50 cop.

8) W. N. Kawrigin. *Verzeichnis der im St. Petersburger Gouvernement gefundenen Schmetterlinge*. (Catalogus Lepidopterorum gubernii Petropolitani). 1864. Prix 40 cop.

9) *Tables générales des publications de la Société Entomologique de Russie ainsi que des articles, des synopses, des formes nouvelles y contenues*. 1859—1908. Dressées par B. Oshanin. 1910. Prix 1 r. 50 cop.

Codes des règles internationaux sur la nomenclature systématique. Traduit par B. Oshanin. 1911. Prix 40 cop. (Pour les membres de la Société 30 cop.).

Ces éditions sont en vente:

à Petrograd au Bureau de la Société (Uspenskij pereulok, № 3).

Цѣна 35 коп.

Ргіх 35 сор.

ТРУДЫ
РУССКАГО
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО Общества

ВЪ
ПЕТРОГРАДЪ.

— □ —
H O R A E
SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE
ROSSICAE
VARIIS
SERMONIBUS IN ROSSIA USITATIS EDITAE.

Подъ редакціей В. В. Редикорцева.

Т. XLII. № 2.

B. Oshanin (Petrograd).

**Vade mecum destiné à faciliter la détermination des
Hémiptères.**

Catalogue systématique des faunes, des monographies et des
synopsis traitant les Hétéroptères, les Cicadines et les Psyllides.

В. Ошанинъ (Петроградъ).

**Указатель литературы, необходимой при опредѣленіи
Полужесткокрылыхъ.**

Систематическій каталогъ фаунъ, монографій и синопсисовъ
группъ: Heteroptera, Homoptera-Auchenorrhyncha и Psyllidae.

— □ —
ПЕТРОГРАДЪ.
1916.

Въ Обществѣ находятся въ настоящее время для продажи слѣдующія изданія:

Труды Русскаго Энтомологическаго Общества: Т. II, съ 1 портр. и 17 табл. ц. 2 р. 50 к. Т. III, ц. 2 р. Т. IV, съ 2 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. V, съ карт. ц. 2 р. Т. VI, съ картою и 1 табл., ц. 3 р. 50 к. Т. VII, съ 2 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. VIII, съ 8 табл., ц. 4 р. 60 к. Т. X, съ 3 табл., ц. 4 р. Т. XI, съ 10 табл., ц. 4 р. Т. XIII, съ 2 табл., ц. 3 р.

Horae Societatis Entomologicae Rossicae: Т. I, съ 4 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. II, съ 1 портр. и 17 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. III, съ 6 табл., ц. 3 р. 50 к. Т. IV, съ 2 табл., ц. 2 р. 25 к. Т. V, съ 2 табл., ц. 3 р. Т. VI, съ 11 табл., ц. 7 р. Т. VII, съ 3 табл., ц. 5 р. Т. VIII, съ 7 табл., ц. 6 р. Т. IX, съ 9 табл., ц. 7 р. Т. X, съ 2 табл., ц. 2 р. 50 к. Т. XI, съ 5 табл., ц. 6 р. Т. XII, съ 8 табл., ц. 6 р. 50 к. Т. XIII, съ 6 табл., ц. 9 р. Т. XIV, съ 4 табл., ц. 8 р. Т. XV, съ 20 табл., ц. 11 р. Т. XVI, съ 15 табл., ц. 8 р. Т. XVII, съ 9 табл., ц. 9 р. Т. XVIII, съ 2 табл., ц. 6 р. Т. XIX, съ 12 табл., ц. 7 р. Т. XX, съ 21 табл., ц. 8 р. Т. XXI, съ 9 табл., ц. 8 р. Т. XXII, съ 15 табл., ц. 6 р. 50 к. Т. XXIII, съ 21 табл., ц. 8 р. Т. XXIV, съ 1 картою и 3 табл., ц. 7 р. Т. XXV, съ 3 табл., ц. 5 р. 50 к. Т. XXVI, съ 3 табл., ц. 6 р. Т. XXVII, съ портретомъ и 7 табл., ц. 9 р. Т. XXVIII, съ 5 табл., ц. 6 р. 50 к. Т. XXIX, съ 3 табл., ц. 6 р. Т. XXX, съ 2 портретами и 10 табл., ц. 10 р. Т. XXXI, съ 2 портр. и 13 табл., ц. 10 р. Т. XXXII, ц. 5 р. 50 к. Т. XXXIII, ц. 6 р. 50 к. Т. XXXIV, съ 1 табл., ц. 6 р. Т. XXXV, съ 3 табл., ц. 6 р. Т. XXXVI, съ 4 табл., ц. 5 р. 50 к. Т. XXXVII, съ 3 табл., ц. 5 р. 50 к. Т. XXXIX, съ 2 портр. и 26 табл., ц. 12 р. Т. XL, съ 3 табл., ц. 4 р. 50 к. Т. XLI, ц. 3 р. 45 к.

Русское Энтомологическое Обзорѣніе (Revue Russe d'Entomologie): Т. I—VI, (1901—1906) по 3 р. за томъ; Т. VII—XV (1907—1915) по 4 р.

Записки Русскаго Энтомологическаго Общества: I. 1861. Ц. 20 к.

Приложение къ X тому „Horae“: B. N. Dybowsky, Beiträge zur näheren Kenntnis der in dem Baikal-See vorkommenden Gammariden. 1874. 4^o. Съ 3 раскраш. и 11 черн. табл. Ц. 7 р. 50 к.

Genres et espèces d'insectes publiés dans différents ouvrages par V. Motschoulsky. Ц. 75 к.

Указатель сообщеній, сдѣланныхъ на общихъ собраніяхъ Русскаго Энтомологическаго Общества за 35 лѣтъ его существованія (1859—1894 гг.). Составилъ В. Мазаракій. Ц. 40 к.

Естественноисторическія изслѣдованія С.-Петербургской губерніи, производимыя членами Русскаго Энтомологическаго Общества въ С.-Петербургѣ. Т. I. 1864. Съ 20 табл. Ц. 2 р. 50 к.

Verzeichnis der im St. Petersburger Gouvernement gefundenen Schmetterlinge (Catalogus Lepidopterorum gubernii Petropolitani). Zusammengestellt von W. N. Kawrigin. 1894. Ц. 40 к.

Tables générales des publications de la Société Entomologique de Russie ainsi que des articles, des synopsis et des formes nouvelles y contenues. 1859—1908. Dressées par B. Oshanin. 1910. 1 р. 50 к.

Кодексы международныхъ правилъ систематической номенклатуры. Перевелъ В. Ѳ. Ошанинъ. 1911. Ц. 40 к. (для членовъ Общ. 30 к.).

Отдѣльные томы „Трудовъ“ и „Horae“, Dybowsky, Мазаракій, „Естеств. истор. изсл.“, Oshanin „Tabl. génér.“ члены Общества получаютъ за три четверти объявленной цѣны. Томы II, V, X, XI и XII „Трудовъ“, томы I, XXXIV, XXXV, XXXVI и XXXVII „Horae“, а также томъ VIII „Обзорѣнія“ выдаются за полную цѣну и лишь при покупкѣ полной серіи журнала.

ÉDITIONS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE

à Pétrograd.

1) Horae Societatis Entomologicae Rossicae.

Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.
II	2	50	XI	6	—	XX	8	—	XXIX	6	—
III	3	50	XII	6	50	XXI	8	—	XXX	10	—
IV	2	25	XIII	9	—	XXII	6	50	XXXI	10	—
V	3	—	XIV	8	—	XXIII	8	—	XXXII	5	50
VI	7	—	XV	11	—	XXIV	7	—	XXXIII	6	50
VII	5	—	XVI	8	—	XXV	6	—	XXXIX	12	—
VIII	6	—	XVII	9	—	XXVI	6	—	XL	4	50
IX	7	—	XVIII	6	—	XXVII	9	—	XLI	3	45
X	2	50	XIX	7	—	XXVIII	6	50			

2) Les annales russes („Troudy“) de la Société.

Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.
III	2	—	VI	3	50	VIII	4	60
IV	2	50	VII	2	50	XIII	3	—

3) *Revue Russe d'Entomologie*, fondée par D. Glazunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shanskij, N. Shiriajev et T. Tshitsherin. Vol. I—VI (1901—1906). Prix 3 r. le volume. Vol. VII et IX—XV (1907—1915). Prix 4 r. le volume.

4) B. N. Dybowsky. *Beiträge zur näheren Kenntnis der in dem Baikal-See vorkommenden Gammariden*. Supplément au X volume des „Horae“. 1874. Prix 7 r. 50 cop.

5) *Genres et espèces d'insectes publiés dans différents ouvrages* par V. Motschoulsky. Supplément au VI volume des „Horae“. 1868. Prix 75 cop.

6) *Index des communications faites dans les séances de la Société Entomologique de Russie pendant 35 ans de son existence (1859—1894)*. Par V. Mazaraki. Prix 40 cop.

7) *Exploration scientifique du gouvernement de St-Petersbourg*. Volume 1-er. 1864. Prix 2 r. 50 cop.

8) W. N. Kawrigin. *Verzeichnis der im St. Petersburger Gouvernement gefundenen Schmetterlinge*. (Catalogus Lepidopterorum gubernii Petropolitani). 1864. Prix 40 cop.

9) *Tables générales des publications de la Société Entomologique de Russie ainsi que des articles, des synopses, des formes nouvelles y contenues*. 1859—1908. Dressées par B. Oshanin. 1910. Prix 1 r. 50 cop.

Codes des règles internationaux sur la nomenclature systématique. Traduit par B. Oshanin. 1911. Prix 40 cop. (Pour les membres de la Société 30 cop.).

Ces éditions sont en vente:

à Pétrograd au Bureau de la Société (Uspenskij pereulok, № 3).

Рѣх 50 сор.


Цѣна 50 коп.

Horae

MAR 7

OCT 25

SEP 4



AMNH LIBRARY



100052773